

Citharexylon

1. cinereum C. ramis teretibus, calycibus dentatis
2. caudatum C. ramis teretibus, racemis nutantibus, calycibus truncatis
3. erubum C. ramis teretibus, racemis erectis terminalibus, calycibus dentatis
4. quadrangularae C. ramis tetragonis, racemis simplicibus
5. melanocephalum C. ramis tetragonis, racemis terminalibus compositis, floribus
6. ^{tetragonis} ~~vellosum~~ C. ramis tetragonis, racemis axillaribus nutantibus, calycibus
dentatis, foliis ellipticis subtus villosis ~~sericeis~~ ^{subsericatis}

melanocephalum species Cypripedium sericeum Michx.

Rocky Mountain

Etharexylum melanocardium

Arbor. Manogr: hist. pag 133. fide herbarii Managravi

melanocardium Citharexylon ramis tetragonis, racemis terminalibus compo-
siti, Sw. prodr. pag. 91.
e Montserrat in Ryan &

Rami obscure tetragonis, glabri, striati.

Folia petiolata, opposita, spithamea, lanceolato-elliptica, basi attenuata,
acuta ^{acuta} ~~obtusifolia~~ vel obtusa, integerrima, glabra, nitida,
venosa, subtus pallida, costa purpurea fere.

Petioles sesqui pollicares, purpureascentes

Racemus terminalis, compositus, spithameus, striatus Pedunculus
striatus, angulatus, inferne e capsula baccharum dentatus, superne dispersus
in pedunculis subrectis, tri pollicantibus: pedicelli brevissimi

Calyx glaber, obsolete dentatus

Craspedolepis Citharexylon

8078

Habitat herb. Mus.

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, alterna, bipollicaria, lanceolata vel lanceolato-oblonga, utraque acuta, subcoriacea, integerrima, interdum extropium obsolete serrata. Pedunculi axillares, plures, petiolo breviores. Calycis quinquefidi.

grandiflorum Citharixylon

Habitat in Domingo herb. La Martini

Rami tetragonis, glabri. Folia petiolata, sesqui pollicaria, oblonga, parum
acuminata, obtusiuscula, venosa, glabra, supra nitida. Racemi terminales
sesqui pollicares, secundi. Calyx 5 dentes obtusi, obsoleti. Corolla unguiculata
glabra

emarginatum *Citha rexylon*

Habitat in Penn herb. - usq.

Totum glabrum. Rami teretes, punctati. Folia petiolata, tripollicaria, oblonga, obtusissima
saepe emarginata cum mucrone, basi acuta, obscura simpliciter serrata, glaberrima, supra
nitida. Petiolus unguicularis. Racemi terminales, erecti, simpliciter simplici, tripollicares. Calyx
truncati, indegremi. Erectus magnitudine *Papav.*

Eriocaulon Pitharexylon ramis teretibus, calycibus dentatis L. in Jacq. h. 1. 105.

v. 118

Pitharexylon arbor caunifolia americana, foliorum venis luteis
albidis artibus Plukh. alm. 100. t. 162. fig. 1.

Tajminum arborescens racemosum, foliis laevi Plum. w. 157.
fig. 1.

Habitat in America meridionali;

Folia petiolata opposita acuminata vertice interdum
alterna ut plurimum semipedalia. Racemi termi-
nales penduli 10 pollicares. Calyx 5 dentatus Jacq.

Plum. 157. fig. 2. K. Guss. quid rectius.

erectum Pith. ramis verticibus, ramis erectis terminalibus, calycibus
dentatis. Sw. prodr. pag. 91.

Berberis fructu, arbor maxima Sloan. bot. 99. t. 206. fig. 3. 4

Pithecellobium: Brown. Jam. t. 20. fig. 2.

Habitat in America

Si mea Swartzii ramis terminalibus ramis

est omnino eadem ac caudatum Sw. fl. Am

non vidi forte non a caudato diversa nec bene convenit cum synonymis
Sloan. fig. uti et Brown. ad caudatum potius spectant

Caudatum & ramis teretibus, calycibus truncatis Lin. S. V.

~~Pithecellobium fruticosum, foliis subellipticis pediculis pedatis ca-
lycibus truncatis, spicis terminalibus longioribus Brotton pan
265. & 20. p. 2.~~

Habitatio Jamaica.

ramis teretibus, racemis nutantibus calycibus truncatis
Sw. obj. p. 234

Rami cortice cinereo subtetragoni glabri folia petiolata
subtus pallidiora
elliptica serrata, palmata glaberrima supra nitida.
Pediculi terminalis interdum etiam in axillis superioribus
saepe ramis ut roque ad basin. flores parvi.

Quadrangulare & ramis tetragonis L.

Jacq. Bot. 422.

Habitat in America meridionali

Ramis tetragoni oppositi. Folia reticulata elliptico lanceolata
venis supra nitida. Racemi ^{subnatis} verticillati ciliati
spati calycis subquadridentati.

an mea eadem cum caudato.

non vidi

vellosum. Ramis tetragonis, racemis axillaribus subsistentibus, calycibus den-
tatis, foliis ellipticis pubescentibus, pectus lenicis.

Citharexylum villosum Jacq. coll. pag. 74 72.

Habitat in Domingo 5

Arboreola 10 pedalis. Truncus et rami senescentes, juniores tetragoni
novelli villosi. Folia opposita breviter petiolata lanceolata vel obovata
acuta firma, apicem versus remote serrata, nervis integerrima supra
pubescentia, dorso villosissima et mollia, 3 polliciana forcula utraque
glandulosa ad apicem petioli. Racemi terminales semipedales. Flores
numerosi villosi. Calyx truncatus. Corolla alba. Jacq.

Citharexylum serratum Sw. prodr. pag. 91

Citharexylum villosum foliis villosis Hort. Kew. 2. p. 349

Domingensis Petubia Jacq. herb. pl. Amer. pag.

Habitat in Domingo 5 e capu foliorum circiter ^{transverse} centro ^{et} elliptico

arbutiula erecta. Rami pinnati tetragoni ^{superius} foliati. Folia ovata-oblonga ^{subreticulata}

sulco utraque
sulco longitudinali

acuminata, glabra, integerrima, ^{superius} densa ^{pubescentia} venosa, opposita, semipedalia;
nervulo superiore ad angulum obtusum inflexo. Panicula axillaris, tri-
polliearis, stipula subulata in dissepimentis puffulata. Flores exigui
plurimi albi saepe rari. Calyx corollaque tripartiti ^{longe}

melanoiciardi, Citharexylum ramis tetragonis, racemis terminalibus compositis
floribus tetrandris W. prodr. pag. 91
Citharexylon 2. Brown Jan. 265

paniculatus C. floribus paniculatis Gort. de sem. et fruct. Cent 4.
Tab 56. fig. 8

michi exstat.

pubescentum Q. ramis tetragonis, racemis axillaribus nutantibus, calycibus
dentatis, foliis ellipticis pubescentibus venosis Swartz prodr. pag 91

non vid.

~~Japanica~~ 9

Thurs