

Citrus

Semineosa Citrus pediculis alatis obovatis latitudine folii, foliis ovatis crenatis emarginatis.

Limonis tuberosus f. Lemon Martin Kumph. Umb. 2. p. 103. t. 26. fig. 1.

Limon praevar Malaccense, Lemon de Caffe Reyl.

Habitat in Syris Zeylone Kingt

~~Racemosa~~ ^{patenterisimi} Rami crues inferne vertici, superne angulati, glabri. Folia petiolata
breviter tuberculata, glaberrima bipollicaria et paucum ultra, articulus inferior obova
tuberculatus latitudine et longitudine sequenti, superior ovatus superne
crenatus, emarginatus. Racemi lat. clavis, pollicibus solitarii, s. flori
Petala breviter tuberculata.

Chilensis C. folio sessilibus acuminatis Molin-hist. Nat. Chil. p. 147
Habitat in Chili

non vidi

medica Citrus pediculis linearibus Len. l. V.

malus medica Bauh. pin. 435.

Limon β Limon vulgari Ferr. hesp. 193.

Malus limonia acida Bauh. pin. 436

Habitat in Asia, India, Africa, Persia &

Dependentur in herbano

Prunosa

Q. foliis subsopulebis. utroque in ipso fructu oblongo rugoso
tuberculato Gmel. N. 3. p. 100. V. 2. et 23.

Habitat

non vidi

aurantium P. petioli alatis foliis acuminatis Lin. s. V.

aurantia mala Cam. epit. 190

Malus aurantia major Bauh. pin 436.

Linnaeus P. Malus aurantia cortice eduli Bauh. pin 436

Habitat in India &

Præm: Superne angulati, uti omnia, glabri. Folia sparsa. Petala
elliptica acuta ut serrata forma obsoleta venosa. petioli
cuneati apice subordati.

Decumanus C. petiolis alatis, foliis obtusis emarginatis Lin. l. v. pag. 697. *

Thunb. fl. jap. p. 293 *

Limonoddecumanus Rumph. amb. 2. p. 96. t. 24.

Petrus aurantium β. Lin. spec.

malus aurantia fructu rotundo maximo pallefente caput humanum
excedente Sloan her. 1. p. 41. t. 12. fig. 2. 3.

Habitat in Andas

in herbario non adeit

japonica Citr. petioli alatis, foliis acutis caule fruticoso. Thunb. fl. jap. p. 292

*

Fun Han Kromp. am. Ca. p. 001

Habitat in Japonia 5

Caules compressi angulatus erectus; vix pedalis. Rami fronsi compresso
angulati. Spinae solitariae in axillis foliorum, erectae. Folia sparsa
ovata integerrima, concaviuscula, subtus pallidiora, pollucida
viri. Flores axillares saepe solitarii, rarius bini, pedunculati
nudantes. Perianthium minimum quinque dentatum. Petala
oblonga, semunquam ciliata. Baccam magnitudine Cerasi.

non vidi

fragrantissimus petiolata petiolis alatis obtusatis. Latitudine folio-

vatis crenatis emarginatis aequalibus

Limbo maris obtusiter.

Habitat in India orientali & hinc hinc in

foliis glaber. Rami angulati folia petiolata sparsa

firma pallide viridi ovata vel subrotunda ovata

obtusissima crenata. Petiolus alatus obtusatus lati-

tudine et longitudine folia aequans. Spina brevis rigida

ad basin petiolis. Pedunculi axillares brevissimi 1-4 flori

pedicelli breves petala cincta tuberculis glandulosis

Trifolium Citrus folios Vernatis den spec. p. 1101. & Thunb fl. jap. p. 2947

Sp. f. hantai kampf. am. exot. bot. t. 202

Habitat in Japonia