

Pterostylon Glaucina

Cal. 4phyllus. Cor. 4petala. Pericarpium superum subpedicellat um 2-3 loculare semina
bina

Decandrum Pteroxylon floribus decandro conymbofi
Koenigii Bergera Lun mant 463.

Habitat in India Orientali ^{cinensi}

Rami teretes, superne pubescentes. Folia petiolata alterna semipedalia pennata cum
impari. Foliola 9 juga, petiolata alterna remota lanceolata, rhomboides, alter latere
ⁱⁿ ~~in~~ veniore semiangustiora, semi rhomboides altero ^{latere} ~~in~~ ^{exteriori} ~~interiori~~ lanceolata basi obliqua
exteriorum versus obscure remote serrata, acuminata, obtusa emarginata utrin
basi et superne ^{que proglabra, supra punctata, pectusa, pilliciana.} Petiolus villosus. ^{est a Koenigii, qui} Conymbus semi
minoris ^{del conymbofi} nalis foliis multo brevior foliolum imbricatum ad bractea pedicelli adpressa lanceola
nervis et quibus ^{to caducis}

basi et superne
minoris
nervis et quibus

fructus alterius determinatur

an Amygdospecies
Cusomeptitetur in systemate?

an cum Pteroxyle conjugenda

glabro
perforatum

Plaupea
~~Pteron~~ petiolis pedunculisque glabris racemis nudis
Clavina ex Carata Burm. ind. pag. 07. Tab. 29. fig. 2.

Habitat in India orientali

Tadris Bergera Honigii.

Rami teretes, vides, fusio punctatis fimi.

udsque
quadriuga

Colica petiolata, alterna, distantia, spithamea, pennata cum

~~unipari~~ ^{unipari} pani. Colicula petiolata, alterna, remota, polliciana

^{terminalis} et ^{interiore} versus ^{basim} senfim minora, ovata, obtusi scula, altis late

re angustiora, marginibus crenulata, glabra, punctis nume

rosi perforata, nervoso-venosa. venella glandulosa crenulata

re interiore
extima ovato
cuneolata
attenuata

Pedunculi axillares, foliis panum breviora, superne floriferi

Pedicelli alterni, remoti, subramosi. Flores glabri

Flores racemosi Calyx perianthium minimum monophyllum laciniis ovatis

Cor. glabri

Corolla tetrapetala petalis oblongis

Stamina filamenta octo brevissima anthera longitudine

germen lineare oblongum. Stylus 1. Stigma obtusum

genus adhuc recognoscendum

Ruspata P. caule simplicii, foliis dentato-pinnatis linearibus; calycibus hirsutis
Lin. l. V.

Pedunculans caule simplicii, calycibus villosis, foliis linearibus dentatis
renatis Lin. fl. lap. 245. t. 4. fig. 3.

Habitat in alpebus Laponicis &

Caules ascendentes, digitales vel palmares, teretes purpureo-roseo
inferne fere glabri superne una cum calycibus lana albedo
vestiti. Folia radicalia basi squamis ovato-lanceolatis aridis
vestiti. Folia radicalia petiolata glabra pinnata pinnis mi
nutis linearibus serrulatis alternis, pollicaria. caulina plurima
superne 1-2 inferne parte caulis latiora pinnatifida
alterna Costa plana lata basi femiamplexicaule pinnulo
serrulata. Floralia simplicia parum latiora corolla parum bre
viora profunde serrata. Flores infimi breves pedicellati
quasi pollicari. Calycis tubulosi pallide virides lacinis integris
lobella pallide purpurea galea obtusa

pubescens Calypene
Herostylon petiolis pedunculisque villosi, racemis & bracteatis.

Habitat in India occidentali 5

Facies et folia procedenti: Rami vero vix punctati, flores minores & bracteaeque lanceolatis ad basin pedicellorum. pedicelli
vel quadriflori florati foliis obtusi ^{forte} ~~paucis amplexati~~.

Herostylon 2. foliis lanceolatis longis, pinnatis, cuneatis, cuneatis, calycibus
lanceolatis obtusis
Estrum Herostylon

11 Spherocephalum L. foliis lanceolatis angustis capitulis flexis capitulis solitariis
terminalibus ramis glabris
Etiam capitatum La Mart.

~~Abundat in Cap. b. spei 7~~

~~affinis capitato ramis inferne teretes glabri, sparsi, vespis superne
angulati vespis apicem villosi. folia lanceolata brevia
vix urguiculana, sessilia, frequentia subumbriantia, subtus
calloso punctata, supra coria. Capitula terminalia solitaria
brevia pedunculata globosa ~~hispida~~ villosa flores parvi subregulari
parana corolla longiora~~