

Arundula Borst.

luc. p. 121

Plome


1. heptaphylla L. floribus gynandris, foliis subsederatis, caule aculeato
2. pentaphylla L. floribus gynandris, foliis quinatis infra cauleni quinatis floralibus
ternatis, caule inermi
3. triphylla L. floribus gynandris, foliis ternatis, caule inermi
4. juncea L. floribus gynandris octandris, corymbis lateralibus elongatis, piliqua
linea tomentosa, caule fruticosa
5. polygama L. floribus superioribus tetrandris masculis, foliis ternatis: foliolis septem
Helina margine subaculeati
6. cheledonii L. floribus polyandris foliis scaberrimis cuneatis superioribus quinatis
superioribus ternatis, floribus inferioribus axillaribus racemosis
axillaribus que (Helina eadem planta)
7. u. osandri L. floribus icostandris, foliis quinatis
8. viscosa L. floribus dodecandris, foliis quinatis ternatis que. (Comnesp.
herb. vix nisi eadem)
9. dodecandra L. floribus dodecandris, foliis ternatis ellipticis
10. micropphylla L. floribus dodecandris foliis ternatis obovatis, caule suffu
tucoso

11. *filifolia* C. floribus hexandris, foliis septenatis ternatisque filiformibus
12. *venella* C. floribus hexandris, foliis ternatis filiformibus
13. *gigantea* C. floribus hexandris, foliis septenatis cuneatis, caule inermi
14. *aculeata* C. floribus hexandris, foliis integerrimis, stipulis pinnatis
15. *pinosa* C. floribus hexandris, foliis septenatis quinatisque, caule stipulis pinnatis
16. *ferrata* C. floribus hexandris, foliis ternatis: foliolis linearibus - lanceolatis
17. *ornithopodioides* C. floribus hexandris, foliis ternatis: foliolis ovalibus - lanceolatis
18. *hoenigi* C. floribus hexandris, foliis ternatis simplicibusque oblongis
19. *prostra* C. floribus obtusis simplicibusque, foliolis linearibus oblongis margine scabris, caulibus prostratis glabris
20. *violacea* C. floribus hexandris, foliis ternatis simplicibusque linearibus lanceolatis, filiquis ternatis subulatis
21. *ambigua* C. floribus hexandris, foliis ternatis simplicibusque lanceolatis obtusis, filiquis fusiformibus in loco scabris
22. *brachycarpa* C. floribus hexandris, foliis omnibus ternatis obovatis, filiquis oblongis scabris, seminebus glabris

24. *monophylla* P. floribus hexandris, foliis simplicibus ovato-lanceolatis
petiolatis caule erecto
25. *capensis* P. floribus hexandris, foliis simplicibus sessilibus lineari-lanceola-
tis, caule angulato erecto
26. *procumbens* P. floribus hexandris, foliis simplicibus lanceolatis petiola-
tis, caulibus procumbentibus.

Rondula Forst.

7
forte *Eleome* species ut credit Forst: *Seposui* quibus in herbario
inter *Tetradynomas*



1819 brachycarpa Oleome floribus hexandris, foliis omnibus ternatis obovatis, siliquis oblongis, seminibus glabris.

Oleome ornithogonoides Tosht.

Habitat in Arabia

Tota planta ad lentem dispersa punctis elevatis, subrisosa

Caulis erectus, scaberrimus, ramosus, scabriusculus, semipedalis.

Rami alterni, subrisosi

Folia petiolata: foliola sessilia, vix semiumguiculata, lateralium
minora, obovata, subrisosa

Inflorescentia axillares; uniflori, glab. subcapillares; unguiculares

Siliqua in calyce sessile, vix unguiculata, obtusiuscula, stylo

terminata. Semina numerosa, fusca, glabra, levia

(Mensus scabra et viscosa quam ambra)

arabica Eleome floribus hexandris foliis ternatis simplicibusque linearibus
lanceolatis, siliquis fusiformibus scabris, seminibus hirsutis
Eleome arabica: floribus hexandris foliis ternatis lanceolatis obtusis;
siliquis fusiformibus siccis scabris Lin. S. V. pag. 606.
Silviana tab. deser. pag. 78. Fig. Tab. 16. fig. 6.
Habitat quoque in regno Tunetano

Oleome

1576 prostrata

Oleome floribus hexandris, foliis ternatis: foliolo linear-oblongo margine
patris, caulibus prostratis glabris
Habitat in India orientali

Caulis plures subramosus, vel simplicissimus, ^{in thamois} procumbens, teretes, subtilis
fere striati, ~~superne~~ ^{superne} adpressi ~~sternulo~~ ^{sternulo} uno vel altero mi-
nuto.

Folia petiolata, ternata, ^{subtilia} ~~suprema~~ rarissime simplicia: foliola
vix unguiculata, ^{subtilia} oblonga, ~~superne~~ ^{superne} angustiora et
parum longiora, adpressa ~~petio~~ ^{petio} adpressi rarissimi albidis rigidis
ad marginem parum majoribus, oculo armato videndis

Peduncululi axillares, solitarii, uniflori.

Siliqua in calyce sessilis, teretes, unguiculata, stylo persistente ac-
uminata, glabra.

Semina parva, tuberculis minutis ceterata, glabra

Oleone guianensi

Aubl. Tab. mala

Habitat in Guiana Richard C

Caulis herbaceus, erectus, teres, striatus, glaber, ramosus: rami superiores, subsimpli-
ces, alterni, altitudine caulis, patentes, angulati. Folia opposita, inferne
ternata, superiora solidaria, saepe foliola duo axillaria, vix pollicaria, latera-
lia parva minima, glabra, filiformia (Aubl ramulos ramorum pro petiolo
erronee delineavit) Peduncululi axillares, solitarii, capillares, uniglori.
Siliqua semipollicaria, lineari, glabra, teretiuscula, mucronata, semina
subrotunda, compressiuscula, glabra, nigra. Flores parvi.

Vespicana Cleome foliis simplicibus ovatis fiabris, siliquis inflatis

Habitat in Persia herb. de Les Jert

Caulis herbaceus, fistulosus, simplex, erectus, superne angulatus, glandulose
pubescens. Folia petiolata, alterna, semipollucaria: foliula oblonga; omnia
oculo armato punctis elevatis fiabra, trinervia, obtusa. Petioli longitudine
foliorum. Pedunculi ex omnibus axillis, solitarii, petiolo longiores. Siliqua
oblonga, pendula, breviter pedicellata, pollicares, stylo terminata. Stami-
na receptaculo inserta, numerum non vidi.

Clome

Habitat in Penn. Herb. Fusio:

Folia 6-7 neta. 15 neta Vernata. Emittit Veres, suspidus

Eleone

Habitat in Pen herb. Hus.

Edia 5-6 nata. fructus oblongus, unguiculatus, glaber

brachycarpa Cleome floribus gynandri hexandri, foliis ternatis quinatisque, legumi-
nibus oblongis, caule foliisque villosis.

Habitat in Peru herb. Tuss.

Caulis ramosus, fructus, uti petioli, vena foliorum et pedunculis villis glandulosis
adpressis. foliola petiolata, elliptico-lanceolata, bis 3 pollicaria, attenuata, in-
degenima, ore latis ciliata. Petali fructum, striata. Pedunculi variosa
ter, semipedales: pedicelli approximati, pollicares, filiformes. Calycis folio-
la subulata. Pedicellus fructus reflexus, sesqui pollicaris. Siliqua semipolli-
cans oblongo-mucronata.

hispida *Oleone* foliis septenatis ternatisque, siliquis hispidis

Habitat in Peru herb. Guaf.

Arborescens. Rami angulati, striati, scabri, villosi glandulosi. Folia inferiora septena, floralia ternata: foliola quinque pollicaria elliptico-lanceolata, petiolata, valde attenuata, serrulata, serratis minutis mucronatis, simpliciter venosa, utrinque acuta, subtus scabriuscula, subtus punctis minutis elevatis in costa, margine scaber rima, suprema sessilia pilis glandulosis adpersa, ceterum sessile, inferiorum 5 pollicaria, superiorum pollicaria. Petioli inferiores quinque pollicares, ut rami glandulosi villosi. Pedunculi solitarii patentes, pollicares. Calycis foliola lineari-lanceolata, scaberrima. Filamenta ~~4~~ non gynandra. Pedicellus filique 3-4 pollicari, siliqua bipollicari, cylindrica, pilis rigidis apice glandulosis tota vestita.

Ornithogalodes - Cleome.

herb. Quos.

Caulis erectus, scaber et punctis farinosi, teres. Folia petiolata, ternata: foliola oblonga, obtusa, intermedium non semipollicaris, subsessilia, arenaria, enervi, supra laeva, subtus scabriuscula. Racemi ex axillis supremis et apice, pyramidei. Folia floralia simplicia, oblonga, remota. Pedicelli alterni: fructiferi patentes. Siliqua torosa, pendula, teres, pollicaris, acuta, Crassitie filiformis. Siliqua torosa, pendula, teres, pollicaris, acuta, Crassitie filiformis, et punctis pulverulentis scabri. Siliqua parvi, hexandri

Canadensis Pl.

Triphyllum filiqua crassiflora Barret. bot. 433.

Habitat in Canada dedit Kusper

heptaphylla P. foliis ~~septematis~~, caule aculeato

novi

heptaphylla C floribus gynandris, foliis subseptenatis, caule aculeato

Len 1. V.

Pentaphyllum peregrinum filicifolium bivalve majus Monj

hist. 2. p. 280.

Sinapistrum digitatum heptaphyllum, flore carneo, majus

penofum Sloan hist. 1. p. 194.

B. Sinapistrum indicum majus quinque folium apprenum

Proj suppl. 410.

Habitat. in Indis

Tota pubescens, aculei compressi spiculi

guyanaea C. floribus hexandris, foliis pinnatis, caule crasso Syst. Nat. 3. p.
232 + Mart. 430. L. Nat. 4. p. 232. Fairqu. obs. 4. p. 1. t. 76

Habitat in America t

Caulis fruticosus, raris ramis. Rami e caelo foliorum cicatriciati uti
tota planta pubescenti viscosus. Solea in ramis junioribus. foliola
cuneata integerrima exterioribus sensim minoribus. Racemi pedales
et bi pedales flores longepetalata. Petala viscata nigra, oblonga
obtusata concava erecta, connatis. Siliqua tereti tumida Fairqu.

Spinosa C floribus hexandris, foliis septenatis quinatisque, caule

Spinosa Lin. Spec. pl. p. 939. 4

Taschaya Mart. Bot. Bras. 33. t. 34.

Habitat in America meridionali

Caulis erectus & culta tripedalis erecta vixi striatus pubescens.

Folia petiolata inferiora septena superiora quina.
foliolo petiolata ^{hypoglycymia} ^{foliolaria} ^{minora} lanciolato oblonga utraque acuta

~~se~~ extropium attenuata integerrima oculo armato pilis
rarioribus minutis. floralia simplicia ovata acuta
sepalia interdum inferiora petiolata aculeis utraque
flabescent ad latus singuli petioli post eorum capum
persistentes indurata petala obovata lamina longitudine
unquid ulanem stamina longitudine corolla pedicellis
germinis petalis duplo longiore.

21-22 Filifolia Cleome floribus hexandris, foliis septenatis ternatisque filiformibus
Cleome angustifolia; floribus hexandris, Corolla ad latus superioris
posita, filamentibus surgentibus foliis digitalis linearibus Coffm. Desf.
pag. 120. no 71.

[Ltr. B. pag.
49.]

Caulis erectus; ^{segetis} herbaceus, pedalis, ramosus, fructus, versus summitatem
et em punctatus; punctis elevatis, minutis sparsis.

Folia petiolata, inferne septena, superne ternata, filiformia,
pollinaria

Petioles foliis brevior

Stipites digitales, pedicellato versus apicem parum incurvato
et angustiori.

Convenit cum Cleome tenella, figura foliorum, differt vero numero
horum, altitudine, debilitate, filiqua pedicellata, apice attenuato
pendulo. Caule punctato

Venella \odot foliis ternatis filiformibus linearibus. Lin. Suppl. p. 3004
L. N. p. 606. Retz obj. fasc. 4 n. 91

Habitat in India orientali \odot

Planta ^{naumanni} frutescens ramosa erecta, glabra ramis filiformi
bus foliolo ^{semiterminata} trifolia petiolo longiora. 6 lobi parvi
flavi petala ovata ungue brevissimo filiqua pollicares
pubescentia fructu utraque acuti.

Sinapis nem. indicum triphyllum Varrus p. 101 foliis
e maseopitana Pluk. phyt. 1. 224. fig. 3

Digitata

P. folus inferonibus Digitatis: juvenonibus Vernati *Toufr*

Deser. p. 120

Habitat in Arabia

mihi ignota

aculeata C floribus hexandris, foliis ternatis integerrimis, stipulis
pinnatifidis Lin. Nat. 3. p. 2324 S. V. p. 605

Habitat in America C

Caulis erectus ramis pedalis flatus pilis minutis
oculo armato videndis adpressis. Coleola petiolata
elliptica utroque acuta glabripula nervosa bipol
licana lateralibus minoribus basi superioris obliqua parum
breviora floribus simplicibus petiolata, canaliculata
petiolo foliis longioribus pubescentibus. flores pauci
lilique breviter torulosa triperma unguicularis apice
pubulata. aculeus utroque ad basin funiculi petioli

ferrata \odot floribus hexandris, foliis ternatis: foliolis lineari canis
caulis ferratis. Cen. S. V. p

Habitat in America meridionali \odot + Domingo

Caulis erectus, bipedalis. Racemi laxi, ternales. Corolla alba, stami
na tetradynamia. Siliqua teris, tripollicari Gaigu

Caulis glaber. Folia petiolata: foliola pubes, plicis, intermedia,
sesquipedalium, lanceolata, acuta, serrulata glabrum. Stamina 6?

Pedunculi distantes. Siliqua cylindrica, sesquipedalium, utri
que attenuata herb Desfont ?

ornithopoides

~~nithopoides~~

floribus hexandris, foliis ternatis: foliolis ovali lanceo-
latis An. 1. V

Sinapisimum orientale triphyllum, ornithopodii filiquis Burb.
Cent. 1. p. 6. 7. 9. fig. 24. Dell. Cl. 1. 359. 7. 266. fig. 345.

Habitat Circa Peram in agri O

+ Pleome floribus hexandris, genitalibus declinatis, filiquis verti-
bus torosis Hort. Cliff. 341 #

non vidi

arabica Q. floribus hexameris, foliis ternatis lanceolatis obtusis, siliquis
fusiformibus viscosis scabris Lin. dec. 3. t. 1. p. 606
Sinapis trifoliatum angustifolium, siliqua latiore Shaw. afr.
550. f. 550

Habitatio arabia

Caulis scaber erectus ramosus viscosus. petioli longitudine
foliorum pedo foliola crispiscula sespiteria unguiculata
Siliqua nutantis pedunculata. Semine hispita a vris
causa differt in primis siliquis. Siliqua bipollicares
scabra

Nonigni *C. floribus hexandris, foliis ternatis simplicibusque oblongis obtusis*
Habitat in India
ramosus rami pubescentes. Petala pallide flava. Pedunculis
capillaris. foliola obtusissima basi acuta

Specimen manuum

utans Thoninia S. V. 73. Suppl. p. 89.

Habitat in Zeylona h.

procumbens C floribus hexandri, foliis simplicibus lanceolatis petio
latis, caulis procumbentibus L. p. 666 - Jacq. herb. 189. Tab.

120

Habitat in Domingo in prati
Caulis plures herbacei ramosi glabri procumbentes. Folia acuta inter
gemina glabra. Pedunculi axillares solitarii. Flores parviflori
Petala ovalia utrinque acuta. glandulae duo nectiferae.
Siliqua longa seser, stylo acuminata Jacq.

Caulis basi lignosi, ramosi uti tota planta glabri. Folia petiolo
+ u, unguiculata non, lineari lanceolata. Pedunculi in axillis
supremis, solitarii, uniflori, folio breviores, capillares, fructiferi
foliis longioribus. Siliqua teretis, glabra, stylo terminata. Stami
na herb. Vent.

capensis C. floribus hexandris, foliis simplicibus sessilibus lineari-linearibus
catis, caule angulato Lin. Spec. pl. p. 940*

Habitat ad Cap. b. praesertim India

Caulis simplex fructus facie Epilobii. Folia genata, lineari-
lanceolata, fructu glabra. Corymbus ut in Epilobio
fruticosa, glabra. Rami cum Aneto tuberculati. Folia

sessilia simplicia, lineari-lanceolata, parum cuneata,
acuta, pollicaria, glabra. Corymbus terminalis. Pedicelli
gemini angulati. Siliqua pollicaris, laxis, glaber. herb

frut.

Folia sessilia, lineari-lanceolata, pollicaria, uterque
glabra acuta. Rami laterales et terminalis. Siliqua bi-
pollicaris compressa, stylo terminali. Homina herb. Vent. confer.
hoc cum Chierantho fructo

beiflorum Mucanum Lin. *Suppl.* ~~Pl.~~ *P.L.V. p. 53.*

guianensis Pl. foliis sesquipedibus linearibus, floribus solitariis axillaribus
Aubl. fl. Guian. 2. p. 675. t. 273.

Habitat in Guiana ☉

Caulis vix pedalis, erectus herb. perh.

~~in h. ignot.~~

unglandulosa Cleome foliis Ternatis foliolis lanceolatis, floribus unguiculatis
f. Casp. 9c. vol. 4. pag. 3. Tab. 306.
Habitat in Nova Hispania. 7
Stamina 14-16.

non vidi

viscosa C floribus dodecandris, foliis quinatis ternatisque fl. zeyl.
241 & Mart. 430. L. V.

Ana-veela Rheed. mal. q. p. 41. t. 23.

Sinapitrum zeylanicum triphyllum et pentaphyllum visco-
sum, flore flavo Mart. Cent. 29. t. 25.

Habitat in Zeylona malabarâ C

Caulis interdum vix spithameus, ramifus pubescenti viscosus
uti filiqua. Siliola in sero quina ^{sa} interdum ternata
superiora ternata. filiqua teretes ap. attenuato
ternata, petala flava

fl. ylo terminata

Dodecandra C floribus dodecandris, foliis ternatis Lin. V. p. 605 &
Pl. Zeyl. 2424

Sinapisimum triphyllum pumilum glabrum, flosculis purpureo,
siliqua membranacea Burm. Zeyl. 216. t. 100. fig. 1.

Habitatio Indiarum C

Caulis viscoso pubescens ~~steris~~ uti siliquis, ~~fructibus~~ ramosis, erectis.
Folia longe petiolata, ^{foliis petiolata} lobis glabra integerrima
fere sesqui pollicaria intus mediove majori
obtusiusculata superiora costa et margine pilosa
Pedunculi axillares solitarii: Petala alba emarginata.
Calyx purpureascenti, ^{et ylo.} siliqua erecta, superior
mei sesqui pollicari crassa acutiusculata. Flores su-
periori fere masculi

Diversa a dodecandra Linn.

microphylla Q. floribus dodecandris, foliis ternatis obovatis, caule suffruticoso
Habitat in India
Caulis ramosus uti tota planta pubescenti viscidis. Foliole
parva sespelia crispifolia. Petala pallide flava.

Cosandra C. floribus icostandris, foliis quinatis Lin fl. Zeyl.

n. 2404

Sinapis num zeylanicum pentaphyllum viscosum, flore flavo

Wurm. Zeyl. 215. T. 99.

Habitat in Zeylona O

Caules erecti viscido-pilosis. Folia omnia quinata. Siliqua
integerrima. Corolla lutea. Stamina breviter squamati
quatuor. Siliqua brevi pubulata, crassifolia villosa
Lin.

non vidi

Compositae. Staminebus copandis foliis ternatis

Habitat in Insula Francia.

Caulis herbaceus erectus striatus uti petioli pedunculis et siliquis
pubescenti villosi. Folia petiolata. Foliole brevissime
omnia ^{ternata} petiolata, lanciolato oblonga utrinque acuta integerrima
pilis raris utrinque margine copiosius minutis
sesqui pollicaria. Siliqua teretis utrinque acuta, striata
tripollicaris. Petala pallida flava cuneata stam
ina longitudine corollae ^{humini rugosa}

a Viciola
non differt

Bases omnino copandae diversa foliis omnibus ternatis
saltem in supremis, pars enim superior caulis
desideratur ~~vel forte non~~ a Viciola diversa cultum
differt enim ~~etiam~~ in floribus majoribus forte cultum
siliquis multo triplo longioribus teretibus angustioribus
striatis ^{humilibus non floribus} an pars superior C. Viciolae culta
similis est siliquis flori vero majori et non credo
diversa

felena C. floribus polyandris, axillaribus solitariis pedunculatis, foliis
ternatis cuneiformibus frugosis, siliquis lenicibus compressis
Linn. Suppl. p. 306 & P. V. p. 605.

Habitat in Zeylona

Caules ^{pluribus} prostratis vel ^{erectis} solitariis erectis ramis
ubi tota planta ad presu frugis albidis ^{ba adp. adpresis}
basi dilatatis. Folia longe petiolata ^{interque infera}
interdum septena, plerumque quina superiora ternata
floralia simplicia se foliola sesilia si abermma ^{sub}
vendi canescentia ^{quibus} subtensa interdum acutiora
Calyx 3 f. 5 partitus ^{brevissima} petala obovata sesilia purpurea
siliqua striata apice se tripollicaris glabri
flores inferos axillares superiores racemosi

to dubito valde num Chelidonia et felena diversa
sunt conveniunt enim ^{ten} ex parte quoad descriptionem
et specimen ex India allata cum ambo conveniunt
folia enim inferiora quinquata superiora ternata flores inferi
minibus his differentibus ^{superioris racemosi} sortis ex duobus speci
minibus his differentibus ^{duo speciei} contetit

Chelidoni C. floribus polyandris: folioli quinis s. septenis lanceiformibus
fiabris, radicis terminalibus, filiquis feli formibus hinc super
p. 300. & l. v. p. 605.
Habitat prope Tanzihaur.

floribus polyandris foliis ^{scaberimus} inferioribus
superioribus ternatis ^{scabris} floribus inferioribus aut Manibus

cum felena fere eadem et sic differentia mutatur

pentaptylla O floribus gynandris, foliis quinatis, caule caermi Lin. l.

S. p. Gaicq. bot. t. 24.

quinquefolium Lepini folio Bauh pin. 326.

Capa-vecla Rheo mat. g. p. 43. t. 24.

Cleome floribus gynandris, foliis digitatis Lin fl. reyl.

2394
Habitat in India O

Caulis erectus fuscatus pilosus, prostratus superne, ramosis.
Folia petiolata. Foliola subsessilia obovata, pinnis acuminatis
obtusis subpinnatis venosa lateralibus sensim minoribus
intermedium pollicaris, margine pilis brevibus subulatis,
glabra. Pedunculi laterales et terminales elongati. Flores
flores terni subsessilia fructura foliorum caulis modo
minorum pedunculi alterni 2-3. Petala obovata unguibus
capellanibus. Siliqua bipollicaris et ultra pilosa sic
brassicula teretes utraque attenuata

Triphylla C. floribus gynandris; foliis ternatis, caule inermi. Lin

Spec. pl. p. 9384

Sinapis num indicum *Triphyllum*, flore carneo non spinosum

Herm. Lugdb. 564. 7. 565.

Habitat in India C. glabro

Caulis erectus, striatus. Folia brevissime petiolata omnia
ternata glabra integerrima. Foliola lanceolata brevissime
petiolata pollicaria lateralibus minoribus pedunculati
axillares plerumque latius. Pili teretes utraque acuta
glabro: Flores gynandri

an mea Linnaei figura enim Herman. non satis quadrat

Juncus C. aphylla, floribus gynandris octandris, corymbis lateralibus geni-
tatis elongatis, siliqua lineari tomentosa, caule fruticosa Lin.
Suppl. p. 300. & V. p. 605.

Eleme juncus Sparm. in Act. Luff. nov. 3. p. 192.

Habitat in Cap. b. p. 5

caespes ^{parvus} rami parvi teretes glabrescenti ramis. flores oblique
pendentes aphylli. folia vix ulla nisi squamula
lo parva. Flores ex apice ramorum compacto
pedicelli unguiculari vix pubescenti subrotundo
vix calycis foliola calycis oblonga. pedicellus
germinis bipollicari

polygama C. floribus superioribus tetrandris masculis, foliis ternatis: folioli
sessilibus margine subaculeatis. Lin. Spec. pl. p. 939 &
Sinapetrum indicum Triphyllum, flore carneo, non spinosum
Roan. her. t. 1. p. 194. v. 124. fig. 1.

Habitat in Jamaica dicit Richard

Caules erectus, teres sculis, paucis ramosis. Folia longius
petiolata, folioli ovato-lanceolatis, margine aculeis
vix compressis scabris, sessilibus. Racemi longi: flore
infero fertili, reliquis minutis tetrandris masculis. Siliqua
intra calycem sessilis Lin.

~~non vidi.~~

rosea Pleome. floribus hexandri, foliis ternatis quernatisque integerrimis glabris
Habitat ad Rio Janeiro herb. Guaf.

Cauli herbaevis, arcuatus, monopur, Anatus, glaber, uti tota planta. Folia petiolata
ternato vel quernato digitata: foliata ^{int. 3, media} fere quipolliciana, lateralibus minoribus, lan-
ceolatis-oblongis, utrinque acuta, coria, margine fimbria, vix tamen serrata.
Bractea ovata. Pedunculis capillaribus. Calycis laciniis linearibus. Petala unguiculata,
rosea, oblonga. Stamina petali longiora. non gynandra.