

Cliffortia

x foliis simplicibus

1. odorata C. foliis ovatis serratis costatis subtus vellosis
2. ilicifolia C. foliis subcordato-rotundis dentatis
3. musci folia C. foliis lanceolatis integerrimis trinerviis
4. tri cuspidata C. foliis glabris lanceolatis tridentato-cuspidatis
5. fernyinea C. foliis lanceolatis setaceo-serratis.
6. graminea C. foliis ensiformibus superne pinnulato-serratis, petioli
dilatatis stipuliformibus linearibus cuneatis brevissimis
7. strobilifera C. foliis linearibus lanceolatis integerrimis, petioli dilatatis
stipuliformibus oblongis brevissimis
8. cuneata C. foliis cuneiformibus apice serratis
9. polygonifolia C. foliis linearibus pilosis
10. filifolia C. foliis filiformibus triquetris glabris integerrimis.

44 foliis compositis

11. crenata C. foliis binatis orbiculatis crenatis glaucis denticulatis
12. pulchella C. foliis binatis orbiculatis nervosis nitidis obscure denticulatis
13. cinerea C. foliis oppositis ^{oppositis} canaliculatis triquetris canescentibus
14. obcordata C. foliis ternatis ~~subrotundis~~ ^{obcordatis} inter medio obcordatam
15. ternata C. foliis ternatis: ~~foliolis~~ ^{foliolis} inter medio ~~trifido~~ ^{trifido} ~~integris~~
16. trifoliata C. foliis ternatis: ~~foliolis~~ ^{foliolis} inter medio ~~trifido~~ ^{trifido} ~~integris~~
17. foliata C. foliis ternatis linearibus sulcatis glabris
18. farmentosa C. foliis ternatis linearibus villosis
19. juniperina C. foliis ternatis triquetris subulatis compositis
20. enicifolia C. foliis fasciculatis verticibus sulcatis glabris
21. tetrafolia C. foliis fasciculatis verticibus subulatis uniuersi
glabris

berberidifolia Cliffordia

Habitat in C. b. sp. herb. kamanthui

Rami glabri, teretes, cortice rufo-ferrugineo: ramuli villosi. Folia in ramulis aggregata, sessilibus, oblonga, vix pollicaria, obtusa, serrata, dense stipitata terminata, glabra supra nitida, aversa, subtus venosa. Petala alba, villosa.

2 *leucifolia* Q. foliis subcordatis dentatis Len. S. V. p. Mont. 494

Abutilon aegyptiacum folio acuto ilicis caulem amplexo nigro Willd.

Elth. 3 6. 7. 31. 44. 35.

Clethra foliis dentatis Hort. Cleth. 463. V. 30.

Habitat ad Cap. b. p. 5. Subrotunda cordata alterna
mai Ramis glabris. Folia semina plexicaulia glabra, aerea subtus
multi nervosa ^{linguiculata} ~~3. 6~~ dentata dentibus ^{marginatis} ~~3. 6~~ ^{termina}
tis. ^{bas. cum foliis adnata} ~~3. 6~~ ^{termina} ~~3. 6~~ ^{termina}
glori axillari ^{pluribus} ~~3. 6~~ ^{termina} ~~3. 6~~ ^{termina}

Campora capensis Enynii minoris folio Raji. hort. 3. app. 243

3 *rufifolia* C. foliis lanceolatis integerrimis Lin. S. V. p. 893 + Hort. Cliff. 463
Tab. 31.

Stem *Otheopneustes* conifer, fructu parvo praefixo intra folia rufi,
seminibus cylindricis Pluken alm. 159. t. 297. fig. 2.

Habitat ad C. b. perit.

foemina *Emilia* ramosissima ^{caespiti} teres, glaberrima purpureo-fero villosa care
scentis prostratis capum foliorum squamis imbricatis confertissimis squa
rosi. Folia sessilia conferta, glaberrima, supra nitida arena
subtus quaeque nervia ^{nervia intermedia} in pinam depressa, unguiculata
Flores in capitulo terminali ramulorum collecti magnitudine
pisi extra lecto bracteis subrotundis concavis vix semiunguiculati
bus triidentato dente intermedio lateralibus triplo longior, spinosa
pinguis, pubulata, multinerviis margini tomentosis internodiis
lineari oblongis integerrimis carinatis longitudine florum carinatis
extra tomentosis. Stylus calyce duplo longior Sepala brevis
ovata acuta utrinque ad latus folii calycis lacinis lineari brevis
medio parum dilatata acuta

4 Inaeupedata P. foliis ~~foliatis~~ glabris lanceolatis tridentatis cuspidatis
reflexis

Habitat ad Cap. b. per 5

Herba glabra ramosa cortice purpureo-ferruginea. petioli
persistentes breves in sebas duas folia dimidia bre-
viora deficiente inter has folium lineari lanceolatum
basi acutum apice tridentatum in fissuris brevibus
araneis ut unguiculare, remote. flores in axil-
lis

5 ferruginea C. foliis lanceolatis peltatis serratis Linn. Suppl. pag. 429 + p. v

pag.
Habitat ad Cap. b. p. v

mas. Caulis polygoni aviculari, filiformis saepe prostratus, laxis ramis.
Rami breviores ferruginei herbacei. Stipulae albinae subpetiolatae,
ferruginea acuta nuda, serrata: serraturis peltatis inermibus
Stipula bipartita, ferruginea, scanosa. Stipulae axillares, peltatis
laxifidis Linn.

6 graminea C. foliis ensiformibus serrulatis, petiolis dilatatis Vermunatis
anfris binis stipuliformibus Lin. Suppl. p. 429 + P.V. p. 893.

Habitat ad Cap. 6 spec. var. f. 5

Caules plures simul, bipedales via ramis striatis foliis tereti, glabris per
perspicentes. Folioa approximata, erecta ensiformia bipollicaria
attenuata glabra, subtus nervosa, suprema spinulosa remote
subtilis sine serrata. Petioli ~~per~~ ^{tensim planum} ~~lati~~ folio mediant articulo con
juncti pollicares, inferne angustati, folio latiore; ap
marginibus in lacinas subulatas fere unguiculatas elongatis

Floris non vidi.

7 *Problepsera* C. foliis ternatis linearibus acutis herbis Lin. l. V. pag. 2934
Cedrus conifera, juniperi foliis racemosa, conis candidantibus parvis

Pluken. alm. 91. t. 275. fig. 2.

Habitat ad Cap. b. Spei.

foemina Caulis e stipulis persistentibus squamosis glaber uti. tota
planta ramosi. squamis alternis membranaceis oblongis pinnu-
is ^{stipulis} ^{obtusis} ^{longis} ^{reticuli}
urquiculanibus marginibus in setam elongatis, inter stipulas
et ramum folia 1. 4. 5. linearia lanceolata extibus pubescentibus
ternata supra laevia nitida subtus medio pollicaria vel
sesquipollicaria, carina in pinnulam subperangentem depressa
tra. flores in axillis foliorum sessiles

foliis linear-lanceolatis integerrimis stipulis dilatatis
bifariatis stipulis formibus

8 Cuneata C. foliis cuneiformibus apice serratis Hort. Kew. 3. p. 413.

Habitat ad Cap. b. p. 5

Rami glabri folia inferne versus sensim attenuata, solitaria
alterna bipollicaria nervosa venosa glabra in stipula
brevissima utroque in petiole depresso sessilia

1 odorata C. foliis ovatis serratis costatis subtus villosis Lin. Suppl. p. 431. 4
L. V. pag. 893.

Habitat ad Cap. b. pret

refert mentham. In dextera est Trijedalo, parum ramosis. Ramis simpli-
ces ^{lib} pubescentes. Folia alterna subpetiolata, cordata elliptica, obtusa
subtus villosa venosa nervis rigida. Stipula sub folio membranacea
semibifida acuta manifeste. Flores axillares foliorum lin

24 *teretifolia* P. foliis fasciculatis teretibus subulatis incurvis glabris integris

Lin. Suppl. p. 430. R.V. p. 294

Habitat ad Cap. b. p. 1

Fundiculus ramulos ramis teretibus glabris. folia plura congesta, sericea
unguiculata parum incurva supra planiuscula subtis congesta mucronata
mutuotermia

naudi differentia hujus et praecedenti haud sufficienter

Filifolia C. foliis filiformibus Inquetis glabris integerrimis Len. Suppl. pag
892 430 - P.V. pag. 893.

Habitat ad Cap. b. p. 5

Rami teretes filiformes flex. utiq. folia frequentia unguiculata
micronata. stipula bifida laciniis subulata rigido

20 *encifolia* C. foliis fasciculatis teratibus sulcatis glabri Lin. Suppl. p. 430.

S. V. p. 294

Habitat ad Cap. b. p. 15

Rami teretes filiformes glabri. folia 3-5 a tuberculo villosa
non semunquiculata obtusiuscula subtus linea exarata
stipula squama oblonga cava.

14. Vernata C. foliis Vernatis: foliis integris pilosis Lin. Suppl. pag. 430^{t. V}

pag. 294

Habitat ad Cap. b. p. i. t.

Rovignati ^{Emet et foliis parvis, ovato lanceolatis, pilosis, diversis pinnis a reliquis}
Cliffortii Lin. ^{margine dorsoque opa. Centro formula}

~~nomadi~~

19 Juniperus C. foliis ternatis Inguetms subulatis confertis Lin. Suppl. pag 490

S. V. pag. 894

Habitat ad Cap. b.pei t

Indet Juniper facie, erectis tripedali ramis pinnis

folia fasciculata, acerosa, ^{pinnis recurvis} lineano, canaliculata, mu-
crositate ^{bracteae b. n. b. f. d. capinus divergentibus} ~~bracteae b. n. b. f. d. capinus divergentibus~~

~~et ut manifesta. Flores axillares sessiles~~

~~an mea b. n. b. f. d. capinus divergentibus~~

4 polygonifolia P. foliis linearibus pilosis Hort Cliff 501. tab. 32. f. v

^{reg}
Habitat ad Cap. b. mei 5

11 crenata P. foliis binatis orbiculatis crenulatis Lin. Suppl. p. 430 * S. V. pag

093.

Habitat ad Pop. b. p. 1/2

Trinax majusculi erecta ut glaber. rami teretes articulati articuli
unquiculis sive apice panum lateribus. Folia duo femina
plecticaulis articuli dimidio longiora altero latere obliqua
tennis fere denticulata ^{glabra} stipula parva facie foliorum ad latera
oppositum. Flores axillares solitarii

foliis crenatis glaucis denticulatis

13 Cinerea C. foliis geminis coriatis Inquetis canescentibus
Habitat in Cap. b. sp. Thunb. absque floribus
a reliquis facie recedit. Surtex rami alternis verticibus
purpureis samulis cineriscentibus. Folia brevia
^{connata, basi connata} ~~ut~~ ^{ut} pinnis quinque, crispifolia enervia supra
canaliculata subtus carinata apice patula & Stylula
nullo. rudimenta samulorum in axillis plurimi

vesicula globosa inane in apice samulorum forte videtur
inhiberi. Cupressum

12 pulchella P. foliis binatis orbiculatis geminatis integerrimis Len

Suppl. p 430 + S. V pag 093.

Habitat ad P. bipari 5

Stem ramif. Ramuli sparsi tenues alternatim apice dentis
delatati in denticulum ovatum. Similis ^{hispida nitida} crenata a 17 folia duplo
minora et nervi plurimi radiatibus ornata, non glaucis.
Folia margini tenuesque crenulata oculo armato convectis
in cartile quam formant flores conservant ut Hedysarum
pulchellum

foliis nervis netidi obscure crenulatis

14 obcordata C. foliis ternatis: foliolis subrotundis: intermediis obcordato Len

Suppl. p. 429. t. V. pag. 294

Habitat ad Cap. b. pret

ramuli ^{alternation}
^{denticulati}
ramuli alternis. Tolia ^{simplex}
subferruginea, integerrima, facie Replis extus officine venosa. Stipula
la magis minus brevissima membranacea. Tolia ^{la} interdum duo

10 Sarcocolla C foliis ternatis lineariibus villosis Lin. Mant. 299. t. V

pag. 893.

Habitat in Cap. b. p. maritimis t

Stem quadrifidus ramis caule glabro tereti. Rami
alterni pubescentes. Folia alterna cum rudimentis ramulorum
ex omnibus axillis, superiore confertiora angustissima apice
parum reflexa inermia basi pubescentia propositum superne
ad basin Petiolus membranaceus dilatatus. Stipula brevissima
stipulari emarginata nudis. Flores axillares sessiles solita-
rii Calycis foliola ovata concava

17 falcata C. foliis ternatis linearibus falcatis glabris Lin. Suppl. p. 431. x

N. pag. 894.

Habitat ad Cap. b. p. i. 5

rami filiformes villosuli.

Tridet pedalis, erectus, ramis, fructus. Folia ternate
fapius tria e singula gemma. Coleola acutiuscula
incurva* affinis armentosa sed glabra

Supra concava a.
subtus e margine
rara reflexo
cava seminaquiriti
lana