

Clinopodium

1. vulgare C. verticillis subrotundis hispido, foliis ovatis obtusis subferratis villosis
2. incanum C. verticillis explanatis, foliis ovatis subferratis incanis acutis
3. rugosum C. capitulis axillaribus pedunculatis explanatis radiatis
foliis rugosis
4. capitatum C. capitulis axillaribus pedunculatis oppositis, foliis ovatis
planis inaequaliter serratis
5. pedunculatum C. capitulis axillaribus pedunculatis alternis, foliis
ovato-cordatis ~~venatis~~ inaequaliter obtuse serratis
6. chamodrys C.

incanum
rugosum

Q. sume super Montef
spatium Coueno

Lysiphanthes ctenopodia?

Habitat in Carolina herb. Desfont

Caules herbarici, erecti, in comi. Folia peltata, semipollucaria, lanceolata,
nervosa, canescentia, integerrima. Capitulum terminalis, subsessile.
Bractea et calycis nervosi, lanceolata in cuspidem attenuata.

capitatum *Clenopodium* diffuse procumbens, foliis ovatis crenatis capituli pedunculatis axillaribus alternis Act.-foc.-h.

n. P. 1. pag. 110

Habitat in am. merid.

mich. cynotr.

vulgare C. capitulis subrotundis hispida, bracteis setaceis Lin Spicipl p 822 v
H. L. Dan.

Clinopodium Lam. epit. 563.

Clinopodium origano simile Bauh. pin. 224

13. Clinopodium foliis ovatis rugosi, verticillis omnibus diftantibus Mill. ic. 63
f. 95.

Habitat in rupibus, fruticibus Euro, Canadae Aegypti &

Canadense collis duplo minoribus. Aegyptiacum collis incarnatis nec purpureis

Pauli erecti saepe sesquipedales simplicis, vel ramosi hirti debiles.

Folia petiolata ovata obtuse leviter serrata nervosa villosa
semperlobata ^{sub 20} ^{unispicosa} flores superne verticillati folia breviora

verticillis subrotundis hispida, foliis ovatis serratis subserratis

micranum C. foliis subhis tomentosis, verticillis explanatis, bracteis lanceolatis
Lin. l. v

Plenopodium serpentana dictam, latiori folio, capitulis grandioribus
Plukh. mant. 51. t. 344. fig. 7.

Plenopodium majus virginianum non ramosum, verticillis majoribus,
floribus brevioribus carnis Monf. hist. 3. p. 374. f. 11. t. P. fig.

^{4.}
Plenopodium, mentha folio, micranum et odoratum Dill. Elth. 17. t. 74
fig. 85.

Habitat in America boreali.

Rami pubescenti saepe canescentes, folia petiolata, ovata
acuta serrulata aliquot remota utraque vel subhis tantum leviter
vellosa tomentosa, micranum ^{avenia nervosa} pollicaria et ultra pedunculis axillaris
oppositi ramosissimi folia breviora bracteis linearibus. Bracteis ^{etatis}
a basi pedicellorum ^{floris in corymbis densis} folia sub basi pedunculorum
juniorum lanceolata

tomentosis ovatis serratis