

Clitoria

1. ternatea C. foliis pennatis glabris, floribus subsessilibus solitariis
2. multiflora C. foliis pennatis, foliolis oblongis subtus sericeis, racemis axillaribus
multifloris
3. brasiliana C. foliis ternatis, calycibus solitariis campanulatis
4. virginiana C. foliis ternatis, calycibus geminis campanulatis
5. mariana C. foliis ternatis, calycibus cylindricis.
6. galactica C. foliis ternatis, racemo erecto, floribus pendulis

loc. cinco herb. Guss. stipulariae herb. Beauv.

multis v. d. d. Rubens

heterophylla

• foliola lanceolata saepe, polline arena et oblongo unguiculis
herb. Guss. Musae

us. C. oser herb. Musae

superatus cum glycine bituminosa

Plumariana

Legumina recta, spitha mox, utrinque margine elevato, glabra
stilo pollicari hamoso terminata herb. Surin
paucis omnes leguminibus stilo longo mucronatis

brasileira Clitoria

Coerulea Clitoria ^{foliis ternatis,}
pedunculis axillaribus pluribus quinque bracteatis unifloris, calycibus
campanulatis bracteis ovatis brevioribus

Habitat in America meridionali In v. Rohr

Caulis solubilis, teretes, filiformis; glabris, vel interdum articulis inferne
vellosis.

Folia petiolata alterna, remota, ternata. Foliola petiolata, pollicaria,
lateralia parum minoria et latere altero parum angustiora, ovata, obtu-
siusculo, mucronata, glabra, tenuisissime venoso-reticulata

Petioles omnes pubescentes, communis apice et basi fissi. Stipula lanicola
to membranacea, attenuata.

Pedunculi axillares, pubescentes terni, uniflori, sesquipedaliter, folio
longiores, pubescentes. Bracteis quinque, 3 in medio pedunculo, duo opposita,
ovata, attenuata, tertia ^{parum altior} cordata, acuta duplo major, 4ta et 5ta sub calyce
ovato oblonga, opposita, unguiculatae, acuta; omnes glabra, multistri-
ta.

Calyx campanulatus, bracteis duplo brevior, quinque dentatus: dentibus quatuor
minoribus, aequalibus, quinto superior, lanicolatus, attenuatus.

Corolla magna, Vexillum ^{Coerulea} Coeruleum extus vellosum

reticulata Clitoria pedunculis unifloris, calycibus campanulatis, folioliis ovatis
glabris acuminatis

Habitat in Domingo. herb. Desfont.

Caulis volubilis, glaber, uti tota planta, angulatus. Sola Vernata: foliis
ovato-oblonga, subrotunda, sesquipollicaria tenuissime venoso-reti-
culata: lateralia magis oblonga, intermedium subrotundum. Stipulae
subovatae, striatae, semiunguiculatae. Stipulae propriae lineares. Pedun-
culus petioli brevior, sesquipollicaris, biflorus: flores ^{magni} pedicellati. Brac-
tea ovata, striata, acuta, calycis longior. Calycis dentes parvi. Venti-
lum extus villosum.

angustifolia Clitoria foliis ternatis linearibus glabris, pedunculis bifloris calycibus tam
parvis latiss.

Habitat in America? herb. Desfont.

Caulis volubilis filiformis; ore lentis villosulus. Folia petiolata; foliola bipar-
licaria angusta, venosa, utraque glabra, acuta, mucronata. Stipulae oblon-
ga, obtusa, parva, striata. Pedunculi petiolo parum longiores, bi-3flori.
Bractea ovata, striata, acuminata. Calycis laciniis subulato, calyce
ipso et bracteis longior. Vexillum caetero villosum. Legumen linearis, tri-
pollicare, glabrum, rectum, utraque marginatum, stylo subulato, ungui-
culari terminatum.

ampla Clitoria foliolis ovato-oblongis glabris, pedunculis subtrifloris, calycibus campanulatis.

Phaseolus amplo flore peltato Plum.

At habitat in America merid. herb. Surinam.

Caulis volubilis, teres, glaber. Folia petiolata, ternata. Foliola petiolata, 2-3 pollicaria, oblonga, venosa, membranacea, interdum parum acuminata. Stipula oblonga, parva, glabra membranacea. Petioli 3 pollicares. Pedunculi pollicares subtriflori. Bractea oblonga, obtusa, striata, unguiculari. Corolla maxima; vexillum pubescens

plumonana Clitoria

Phaseolus floris vexillo amplissimo filiquis rectis et angulosis Plum.

Habitat in Cambis herb. Sur: apud Ansp.

Rami angulati purpurei, glabri. Petioli longi, seta ad singulum foliolum
laterale et duo ad intermedium. Foliola ovato-oblonga bipetiolariis,
acuminata, venis sine venosa, intermedium rhombicum, reliquis parum
major

Eadem cum Phaseolo amplo flore stellato Plum.

emarginata Clitoria

Habitat in America Herb. Jusf.

Caulis perenne villosus, subtriqueter. Folia brevissime petiolata: foliola ternata
seta ad singulum foliolum, lanceolato-oblonga, emarginata. Calyx tubulo-
sus.

Salvator a tebi data

heterophylla Clitonia foliolis panduriformibus subrotundisve, pedunculis unifloris

Habitat in Insula francis Herb. Gussonei

Caulis filiformis, solubilis, glabris, teretes. Folia pennata cum impari
tri-quadrifida: foliola petiolata, ^{opposita} plerumque subrotunda, alia linearia
vel lineari-oblonga ^{in medio} saepe ~~angustata~~ coarctata, semipollicaria
terminale parum magis, opposit^{ae} venosa, glabra, subtus reticulata
stipulis setosis parvis. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori.
Bractea ^{caulis} duo parva ad basin calycis et duo subulata superne in
pedicellis. Calyx ^{campanulatus} quinque nervis: laciniis lanceolatis. Corolla coroni-
cea magnitudine Clit. ternatae. Legumina linearia, bipollicaria

Stipularia Plitoni foliolo oblongo subtus villosi, caule fruticoso hirsuto, pedunculis
multifloris axillaribus terminalibusque
Plitonia multiflora Sw. Arn.

Habitat in Puerto Rico Baudin, in insula Domingo Desportes ex herb. Mus.
Caulis teres, a pilis ruffis hirsutus. Folia pithamisa et alba, pinnate
floralia ternata, 8-10 pugo caim impari, foliola opposita, petiolata
ovata-oblonga, vel oblonga, obtusissima, mucronata, supra glabra,
subtus subcanescentia, venis finis venosa, bipolliciana interna et ex
terna minor. Stipula lanceolata, attenuata, semiunguiculari, et
nervosa, pilosa, petiole duo ~~ad~~ singulum par foliorum, setacea,
et semiunguiculari. Pedunculi axillares, terminales folio ter
nato ad basin, folio longioribus, pilosi. Flores remoti, cymati
~~muti~~ ^{muti} ~~et~~ ^{et} ~~quasi~~ ^{quasi} ~~que~~ ^{que} ~~et~~ ^{et} ~~bractea~~ ^{bractea} lanceolata ad basin pedicellorum, pub
ultra basin flori bipollicares, bractea subcalyce lanceolata attenua
ta. Calyx tubulosus villosus. laciniis in setam attenuata. Corolla
purpurea

eadem cum Plitonia ^{caerulea} ~~purpurea~~ a La Dru. Donata

phryne *Clitoria foliolis oblongis villosis tomentosis subsensitivis, racemis axillaribus*

habitat in Insula Bourbonis. herb. Guss.

Caulis volubilis, glaber: rami incani. Folio ternata: foliola pollicaria emarginata, ^{in punctata, latioribus apicalibus} racemi longitudine stipula minuto, setacea. Racemi longitudine fere petioli. Flores distantes, 8-9. geminati. Bractea subulata ad basin calycis. Legumina bipollicaria, linearia, parum incurva mucronata, juniora incana, adultiora glabra.

Obi an species glycinis et inter meos sam descripta est eadem cum gly

. cano sensu

tetragona *Clitoria foliolis ovatis lanceolatis, subtus villosis*, leguminibus tetragonis, stygi-
lis ovatis.

Habitat in Dominjo Desportes

Caulis Volubilis, teres, striatus, pilosus. Folia longa petiolata, ter-
nata: foliola petiolata oblonga, vel oblongata oblonga, bi-
pollicaria, supra glabra, subtus villosa pallidiora, venosa, acu-
tiora vel obtusa cum mucronulo. Stipula ovata, striata, villosa
feta linearis ad inferiorem petiolonum partem ^{et duo supra ne in}
intermedio. Pedunculi axillares, petiolo parum ^{et longiore} crassiores. Flores
versus apicem ³⁻⁴ peduncululi, conferti. Bractea duo lanceolata,
pubescentulari, pilosa, striata. ^{villo} Calyx tubulosus, villosus
striatus: lacinia lanceolata attenuata. Corolla maxima, alba
intus purpurea, vexillum intortum. Legumen bipollicare, rectum
tetragonum, crassitie pennae anserinae, glabrum, stylo semipolli-
care terminatum. Semina globosa, nigra, puncto resinosis ^{flori} adpressa

Rhombilobium Genus proprium Pursh

tenuiflora Plitoria

Habitat in insula Bourbonia Commerçon ex herb. Luo

Similis Plit. Phayae. ^{latentibus subaequalibus} Foliole oblonga, juniora utrinque villosa subtus.
Venica, adultiora supra glabra, subtus villosa absque punctis. Pa
nerviuli capillares. Flores quadruplo minoris quam Pl. Phayae
an glycine? omnis
calycis cinerei 5 fidi; dentes subulata

tomentosa Clitoria: caule foliis oblongis subtus calycibusque tomentosis, racemis
axillaribus terminalibusque

Clitoria falcata Lamour?

Clitoria multiflora Sw?

Habitat in Puerto Rico ~~Abundant~~ in Domingo Desportes.

Caulis, uti petioli, pedunculi et calyces a villis flavescensibus tomen-
tosus, teres. Folia petiolata, impari pinnata, 10, 12, fruticosa.
foliola petiolata, bipollicaria, ^{intervenit m. longiora} supra glabra, subtus flavescens-
virescentia. Stipula subulata, semiunquiculatae, nervosa, sulcata.
Sed a duo ad singulum par foliolorum.

nigra Clitena. folioli oblongo-lanceolatis supra glabris, pedunculis unifloris.

Habitat in Puerto Rico Baudin ex herb. Turcici 5

Caulis fruticosus, erectus? Teres, superne angulatus,culo armato villis adpres-
sis confertus. Folia breviter petiolata. Foliola bipollicaria vel parum
ultra, venosa, emarginata, subtus ad centem villosula. Petiolus unguis ad
longo. Stipula ovata, nervosa. Pedunculus longitudine petioli. Bractea sub
calyce duo, oblongo, glabra. Calyx tubulosus. Lacinia ovata. Corolla mag-
na.

grandiflora ~~Pl.~~ glabra, foliis ovatis, stipulis lanceolatis

Habitat in Louisiana Fontenelle herb. Guis.

Soilis prior ~~et~~ ~~est~~ ~~vir~~ tamen sanctas. tota glabra et stipula lanceolata.

pedunculis unifloris foliola ovato-oblonga. Bractea lanceolata

tomentosa. Clit. caule folioli oblongis subtus calycibusque tomentosis.
an & citius ~~folioli~~ ^{folioli} ~~caulis~~ ^{caulis} ~~magis~~.
Habitat in Puerto Rico in herb. Guip.

Caulis, uti petioli, pedunculi et calyces tomentosis, villosi, flavescentibus tomentosis,
terres. Folia ^{petiolata} petiolata. Foliola petiolata, bipollicaria, supra glabra,
subtus flavescenti sericeis. Pedunculi axillares foliis longiores. Flores hu-
jus generis maximi, semipollicares, duo vel tres, conferti. Bractea
oblonga, striata, villosa, calycis tubulosi: laciniis lanceolatis, alte-
rnatis. Vexillum nervosum, extus oculo armato villosum.

tenuiflora ~~Clitoria~~

Habitat in insula Bourbonia Commerciorum ex herbario Gussonei

Similis ^{Phryne} ~~precedenti~~. Foliola supra glabra, subtus villosa, oblonga lateribus
subaequalibus, Petioli filiformes, pollicares. Pedunculi axillares, bi sive tri
pollicares, rigidi, crassitie rarnonum, glabri. Pedicelli 8 parvi plures, gemi
no vel ternis soepe ex eodem puncto, ope lentis pubescentes, isti pedunculati
superne et calycis. Bractea ovata ad basin pedicellorum et duo sub
calyce, parvae, deciduae. Flores quadruplo minores quam in Cl. Phryne
Calyx unguiculatus, lobis rotundatis

virginiana C. foliis ternatis, calycibus geminis campanulatis Lin. 1. V

Platanus trifolius; flore minore coeruleo Dill. Elth. 90 t. 26. fig. 17.

Habitat in Virginia jamaica

polluciana

Caulis volubilis. foliola ovata glabra vel ovato-lanceolata bipolluciana, venis reticulata, mucronata. seta gemina inter foliola et in petiolo folii terminali. Stipula lanceolata parva pedunculi axillares 2. 3 flori. bractea duo ovato striata ad basin calycis. laciniis calycis subulata longa. vexillum magnum. Legum lineare compressum glabrum.

Plum. tab 90 fig. 1. foliola ovata - lanceolata herb. Guss

an hic falcata de Martii

Caulis pubescens. foliola ternata^{to} oblonga, glabra, venosa, bipolluciana. Stipula minuta. Pedunculi multiflori. Bractea duo ovata ablonga. Calycis campanulati, breves. Labium superius rotundatum indivisum inferius trifidum; lacinia intermedia subulata. lateralia lanceolata. Corolla magna. Vexillum extus pubescens herb Guss
hoc est Platanus magno flore siliquis minoribus falcatis Plum

Spontanea herb Guss.

Capitata Clitoria ramis petiolis bracteisque pubescentibus foliis
oblongo-ovatis acuminatis utraque glabris, pedunculi apice
capitato-bracteati floribus approximatis alternis, Legumen
Lycoperso Act. J. h. n. Par. 1. pag. 118.
Habitat in Amer. merid.

mula cynota

Vernatea C. foliis pinnatis. Lin. Fl. Regl. 2 834

Schouya Cufpi Rheed. mat. P. p. 69. t. 30

Phaseolus indicus, glycyrrhiza foliis, flore amplo Coenulae Comm. hort.
1. p. 47. t. 24.

Flor. Platonidis ternatesium 13. regn. cent. 76. t. 31.

Flor. Coenulae Rumph. Amb. S. p. 56. t. 31.

Habitat in India 7

Caulis volubilis teres altitudine humana. Folia pinnata cum
impen^{trigona} foliolis petiolatis oblongis glabris. stipulae febulato
angustiferae Flores axillares solitarii subsessiles magni
Peduncululi brevissimi in medio pyramide duobus lanceolatis. Calyx
tubulosus superne dilatatus: basi bracteis duabus ovatis sessilibus
lanceolatis calycis lanceolatis. corolla coerulea sexillum me

oio florum

Lathyrus spectabilis Forsk.

Orobis volubilis Forsk.

varia florum albis herb. maj

descript. calycis & leguminis

multiflora C. foliis pinnatis, foliolis oblongis subterseis, racemis
axillaribus multifloris Sw. prodr. p. 106.
Habitat in Domingo 5

non vidi

brasiliensis C. foliis ternatis, calycibus solitariis campanulatis Lin. L. V

^{P.} Planta leguminosa brasiliensis, phaeoli flore, flore purpureo maximo
Breyer. Cent. 70. P. 32.

Habitat in Brasilia

variat foliis angustissimis linearis lanceolatis bipollicibus herb. (var.)

descripta inter americana sub nom. coenula

micrantha Cl. foliis lanceolatis, pedunculis bifloris, flore altero
fructu Scopul. Dal. inf. 2. p. 1. t. 1.
Habitat.

non vidi.

mariana C. foliis ternatis calycibus cylindricis Lin. S. V.
Clitoria mariana Trifolium subtile glaucum Pet. Jac. 243.
Habitat in America septentrionali
foliola ovata. Bractea ovata per se haud

mariana

galactia C. foliis Vernatis, racemo erecto, floribus pendulis Lin. Spec. pl. pag
10264

Phacelus minor Catesbeo, flore purpureo Swan hist. 1. p. 102. t. 114.
fig. 4.

Galactia foliis ovatis glabris pennatis Vernatis, specie oblongis Brown. Jan
290. t. 32. fig. 2.

Habitat in Tamarica

Perianthium quadridentatum: laciniis superioribus et inferioribus majoribus,
obtusum. Bracteis duabus, minimis deciduis. Corolla pentapetala
la: Petalis omnibus oblongis angustis; vexillo patens latiore
imbricante. Stigma obtusum. Legumen teres. Legumen teres
Semina subrotunda. Racemi floribus geminis plumbis ve.
Lin. l. c.

Raulis glaber teres. foliola oblonga, oblonga, obtusa submarginata,
tenuissima venosa, pollicariis, basi parva, subter oculis
matis velutula. Racemi axillares: pedicelli gemini. Calycis laciniis
lanceolata attenuata herb. Linon.

ayui lupienpi Pl. foliolo subcordato-oblongis pinnis lateralibus
folio longioribus patulis Scopol. Del. Inf. 2. p. 47-2.
Habitat.

nonardi