

Clusia

1. rosea C. foliis arenis, corollis hexapetalis
2. alba C. foliis arenis, corollis pentapetalis
3. flava C. foliis arenis, corollis tetrapetalis
4. venosa C. foliis venosis, corollis tetrapetalis
5. pedicellata C. foliis ovalibus, cymis axillaribus, corollis tetrapetalis

Quaeoria hinc pertinet herb. Guai et Mich.
~~Quaeoria hinc pertinet herb. Guai et Mich.~~

Plusia

Plusia venosa, foliis venosis Lin. S. Veg. pag. 911.

Coarpoiba Marceyr. hist. pag. 131. fida herbarii Manigravii

Lepidus Olypa

Forster

Habitat herb. maf.

Primi Verletis, rugosi, ciliati. Folia petiolata, opposita, oblongo-ovata, acuta,
subcoriacea, avenia, obscure remote nervosa, glaberrima, integerrima.

pinnifolia Cratoqueo

pedunculata Clusia Torster

Habitat. herb. Musci

Rami teretes, glabri. . . Folia petiolata, bi- / 3 pollic. anis, elliptico-ovata, glabra,
transversim venis sine ~~ve~~ venosa, subcoriacea, acuminis obtuso-terminata
Petiolus carinatus, unguiculatus. Pedunculus terminalis, petiolo longior, mutans
angulatus.

octopetala *Plusia folus aseniis, flombus octopetali*

Habitat in Brasilia herb. Turf. 3

Rami Veretes, glabri. Folia petiolata, opposita, tri-pollicaria, cuneata, coriacea,
venisforme oblique approximate, obscure nervosa, integerrima. Calyx imbrica-
tus: foliolis subrotundis, c. 5. Petala 8. 9. cuneata.

rosea C. foliis avenis, corollis hexapetalis L.

Frax.

Cerebra media arbor saxis adnascens, obtundo pinguifolio, fructu
va pomiformi Plukin. alm. 92. 157. fig. 2. Cat. sp. carol. 2.
p. 99. t. 99.

Habitat in Carolina

Arbor 20-30 pedali. Folia obtusa emarginata crassa pallide viridia
opposita nervi numerosi imbrici, palmaria Covia nitida. Pedun-
culi terminales trifidi singulis ramis triflori floribus pedicella-
tis. Stigmata sepe 7-9.

alba Q. foliis avenis, corollis pentapetalis P.V

Caëqu h. 34

N. 166.

Clusia flore albo, fructu corcineo Plum gen. 22. ii. 87. fig. 1.

Habitat in America?

Arbor 30 pedali vastissima arboribus ^{ribus} innascens. Folia obovata, integerrima obtusa nitida, coriacea firma, avenis ^{ribus} oblique striata, breviter petiolata, opposita, ad apicem ramulorum sola. Pedunculi breves crassi, squam. triflori, plerumque terminales. Petala alba. Fructus corcinei. Semina alba pulpa corcinea Caëqu

flava & foliis avenis, corollis tetrapetalis Linn. S. V. Gaerq. h. 7.

34. t. 167.

Terebinthus folio singulari non alato rotundo succulento,
flore tetrapetalo pallide luteo, fructu majore monopyrano

Roan h. 1. p. 91. t. 200 fig. 1.

Habitat in Jamaica &

non vidi

venosa P foliis venosi L-V

Taiqu-hut

Clusia, flore roseo, minor, fructu flavo-purpureo. Plum. gen. 27.
ci. 07. fig. 2.

Habitat in America meridionali &
arbor ercta comosa 30 pedalis. Folia, quamipolluciana. Petala 40
alba

non vidi

pedicellata P. foliis ovalibus venosis, floribus tetrapetalis, cymis axilla-
ribus.

Clupea pedicellata, foliis oppositis obovatis, integerrimis venosis,
cymis axillaribus, floribus tetrapetalis Forst. prodr. pag. 74.

Habitat in nova Caledonia 3

Folia bi f. tripolliciana petiolata, glaberrima nervosa vena
la nervi pauci remoti.

an Pittospori species