

Clusia

1. alaternoides C. foliis lineari-cuneatis mucronatis margine membranaceis pedunculis solitariis foliis longioribus.
2. polygonoides C. foliis linearibus subattenuatis, pedunculis axillaribus plerumque foliis brevioribus
3. ^{erocodera} ~~subsericea~~ pulchella C. foliis ellipticis, floribus lateralibus glabris ramisque glabris, Capsulis punctatis
4. lanceolata C. foliis lanceolatis ellipticis, floribus lateralibus ramisque villosis, capsulis impunctatis
5. hirta C. foliis ^{obtusatis} cuneatis glabris, floribus lateralibus glomeratis.
6. tomentosa C. foliis ellipticis utrinque tomentosis
7. ^{acuminata} ~~herbacea~~ C. foliis ~~ovatis~~ herbaceis, foliis ovatis glabris obtusis cum acuminibus, floribus axillaribus solitariis
8. reclusa C. foliis ovalibus ~~retusis~~ subtus reticulatis villosis, floribus axillaribus ^{axillaribus}
9. ~~stipularis C. foliis ovalibus subtus reticulatis villosis, floribus lateralibus bracteatis~~

monocotyledonae. Cacti foliis oblongis glabris nervosis, flentibus axillaribus congestis.
Lour. fl. Coch. pag. 630.

Glabra. Cochina. 5

Arbutula 4. Pediculis. Tolia integerrima, glabra oblique nervosa
parva inaequalia aeterna. Hermodactylus. Flores par
vi albi. Nervosum glandulosum luteum. Stylus columnari
apice trifidus. filamenta 5. 9. 3.

alaternoides C. foliis subsessilibus linear-lanceolatis, floribus solitariis erectis
lin. S.V

alaternoides africana, Neleptii legitimi imperati folio Comm
hod. r. p. 3. v. 2.

Thymalus arboreus, oethiopicus mercurii germanici foliis, floribus
pallido Plukenet 230. fig. 1.

Chamaelea foliis oblongis nervosis, floribus ~~et~~ foliorum alis
Burm. afr. 116. v. 43. fig. 1.

Chamaelea foliis ~~erectis~~ ~~oblongis~~, ~~floribus et alis~~ in ~~proxima~~
Burm. afr. 118. v. 43. fig. 3 B

Habitat ad Cap. b. p. 1. 7

Rami variter sparsi glabri ramis folia sessilia opposita
mata, patentia pollicaria, in ramulis interdum magna
tundine thymi vesperis basi angustata, avenia enervia
glaberrima, margine membranacea mucronata. pediculi
cubi axillares capillares uniflori folio parum
longiores

lineari cuneatis mucronatis margine membranaceis.
pedunculis solitariis

2 polygonoides C. foliis canecolatis, floribus axillaribus plurimis Lin
S. pei. pl. pag. 1475. 4

Cisti helianthemifolia planta Pluken 4. 23. fig. 7.

Chamaele foliis latis oblongis ymbui ex alii Murm.
abr. 110. 8. 43. fig. 3.

Habitat ad Cap. b. pei 5

Rami elongati, simpliciter breves. folia petiolo brevissimis
polliciana crassipetula avenia obtusiuscula ¹ extrop
angustata parum angustiora, minime mucronata pedun-
culi axillares plures foliis brevioribus

foliis linearibus mucronatis, pedunculis axillaribus
pluribus foliis brevioribus

ericoides C. foliis subpetiolatis caniscolatis glabris, floribus binis axillaribus erectis
Thunb. prodr. pag. 53
Habitat in Cap. b. Spei

novi

rufescens: C. foliis subpetiolatis lanceolatis villosis, floribus axillaribus cernuis Thunb. prodr. pag. 53
Habitat in Cap. b. spi

non ord.

Daphnoides \varnothing foliis sublineariibus basi angustioribus obtusis, junioribus
utrinque tomentosis, floribus solitariis erectis La Martk

Chamaeloa foliis ex uno centro plerumque oblongis villosis Warm afr.
120. tab. 44. fig. 2.

Habitat in Cap. b. sp. 4

bipedalis ramulosissima. folia subsessilia approximata, floris pedun-
culatis axillaribus La Martk

Leterophylla C. foliis inferioribus ovatis superioribus lanceolatis glabris, Thunb

prodr. pag 53.

Habitat in Cap. b. spici

non vidi

s. hirta Clusia foliis cuneiformibus glabris, floribus lateralibus glomeratis hirsutis
Clusia hirta ^{prosp. 601} foliis ovatis nudis integris, floribus lateralibus glomeratis
hirsutis Lin. I. V. 897. b. pres.

Clusia de Bulow. Hab. Cap.

Trunk ramis simplicibus; ramis terribus, glabris, e basi foliorum tuberculata
Foliis, plerumque alternis, interdum 3 nis.

Folia petiolata, vix unguiculata, integerrima, venoso-reticulata,
oblonga, basin versus parum angustata.

Flori ad versus apicem ramorum et ramulorum, subsessiles, glomera
tis, ^{et} ~~et~~ ^{prosp. 601} ~~prosp. 601~~ ^{extus}

Calycis hirsutus, cinereus, folioliis pili brevibus; foliolo latitudine, conica

Petala ^{va. quinque,} oblonga, minuta, glabra.

Filamenta quinque, parum infra medium styli inserta.

Stylus trifidus, hirsutis cinereis involutus.

6 Tomentosa \odot foliis ellipticis utraque tomentosi Lin Mart 299. # 1. V

pag. 097

Habitat in cap. b. p. nei montibus arenosis 5

Stem tripedali ramosissimus, exstitus a cicatricibus foliorum
tuberculatis. Rami vix ter pubescentes superne tomentosi
ubi folia et calyces. Folia conferta sessilibus, elliptica, acin-
tiuscula, magnitudine thymi integerrima. Flores latera-
les, solitarii, sessile foliis longioribus. Calyx ^{longioribus} sedus laciniis
oblongis vix exsertentibus majoribus. Petala calyce parum
longiora

7 acuminata C. herbaica, foliis ovatis glabris obtusis cum acumine,
floibus axillaribus solitariis Lin-Suppl. p432. P.V. pag. 897
Habitat ad Cap. S. Jacobi

Facies Telephii imperati. Radix superne in ramos aliquot divisa
Rami a caulis decumbentibus ^{glabri} tetragoni, ramuli alterni
seque pollicari. Folia subsessilia basi acuta, glabra
ovata glaucis viridia figura foliorum Telephii imper.
Stipula ovata acuminata membranacea.

3 pulchella C. foliis ovatis integerrimis floribus lateralibus Lin. 1.

S. p.

Index Othiopicus, podulacis folio, flore ex albo vix fiante
Comm. hort. 1. p. 177. t. 91.

Habitat in Othiopia 7

Rami vixentes glabri erecti ^{se} patentes. Folia petiolata alternata
utroque acuta integerrima, glabra, sequi pollicem
nuda pallida ^{in forma} coriacea ad pressa, saltem in sicca. Pedunculi
axillares solitarii filiformes uniflori, foliis breviores. Flores
masculi breviter pedunculati, plures. Fructus non magnitudine
vix nisi, ~~se~~ albedo punctatus

foliis ellipticis, floribus lateralibus glabri capsulis puni
tus rami glabri.

23 Lanceolata Clusia foliis ellipticis lanceolatis, floribus lateralibus tomentosis
capsulis imbricatis amplexulosis sordidatis.
Clusia lanceolata; foliis lanceolatis, integris, eglandulosis, subtus nudis

Torrh. descr. pag. 170.

Summa affinitas cum Clusia pulchella ad differt
ramis purpuriscentibus, superne p. villosis-subinervi.

Foliis lato-lanceolatis, bipollicaribus et ultra, calycibus villosis-tomentosis
s, subtus impunctatis, supra parum sed vix nisi ad lantem

H Calycibus capulis impunctatis
villosis-tomentosis petalorum flores masculi corosi, aggregati, subpedunculati, in axillis
foeminei subsolitarii, pedunculati.
Corolla, stamina, stylum ut in Clusia Pulchella

obtusata P. foliis ovalibus retusis, floribus racemosis axillaribus - Lin
fl. reip. 357. f. v

Sherunam - collam Rheed. mal. a. p. 23. T. 1 P.

Pornif. Lortii species Bont. jav. 103.

Habitat in India 5

Rami et folia ut in precedente stipulari. Ramuli
alterni elongati simpliciter axillares foliis minori-
bus floribus in axillis sessilibus. Calyx infundibuliformis
laciniis ovatis acutis

Planta squamosa. Lin.

9 *Styulani* C foliis ovalibus subtus tomentosis Lin Mant. 127. H. V. p. 97

Habitat in India orientali

Rami officine angulati, subflexuosi, inferne villosi, superne ferrugineo villosi. Folia breve petiolata junosa utroque villosa, adulescentia subtus mollia, supra nervosa subtus a venis pulchre reticulata. Flo. integerrima bi-
p. Inpoliciana. Flores axillares proles 2-3-4. bracteis
orbibus ovatis acuminatis v. ciliatis, calycis uti bracteis villosi
tomentosi.

ab antecedente non diversa