

Crotoni Guss: Genera p. 374

Pal. 5quepartitis. Peta 5. Capsula leguminiformis coriacea 2 valvulis
monospermis

confer Lum. Bourea

ferruginea Orestis foliis pennatis: foliulis ovato oblongis acuminatis subtus petis
lusque tomentosis.

Habitat in Guinea Herb. 5

Rami crassi & sic per nos cygnei, teretes, superne ferrugines tomentosi
folia sparsa, petiolata, pedalia, pinnata cum impari, 7 & 8 pinnis:
foliola petiolata, subopposita, bipollicaria, interiora minora, supra
cyathata, nitidiuscula aevanea, subtus ferrugines villosa tomentosa
simpliciter venosa. Petioli teretes. Racemi laterales & terminales
terti vel plures, bi- sive tripollicares, ferrugines tomentosi: pe
dicelli brevis & uni, frequentes & uni, sparsi 3-4 flori. & loci parvi

Triphlata Cnestis foliis Ternatis.

Cnestis triphlata; foliis ternatis: folioli ovatis acuminatis, superne
levibus, panicula terminali da Mart. Dict. bot. 3. p. 24.

Habitat ad Succam Loranam in Guinea Herb. Gussonei 7

Rami teretes, superne flavo-tomentosi. Folia petiolata, alternata, frequen-
tia, sparsa: foliola petiolata, tripollicaria, oblongo-ovata, basin
versus sensim parum angustata: lateralia altero latere angustiora
integerrima, acuminata, acuta, venosa, supra glaberrima, sub
nitida, subtus villosula. Petioli teretes, villosi-tomentosi, tripolli-
cari. Stipulae duo & aequae, axillares. Racemi terminales, sub
compositi. Capsula cylindrica, flavo-tomentosa, semi-pollicaris
longitudinaliter sulcata, basin versus attenuata, superne recur-
va.

Serruginea Cnestis foliolis oblongis acuminatis subtus subtomentosis.

Habitat in Guinea herb. Guaf.

Foliola oblonga, acuminata, subtus villosa subtomentosa, et rami, petioli, pedunculi et flores. Racemi laterales subimpositi. Species *Cnestis tomentosa* corniculata, differre videtur tomentosa.

glabra Cnestis foliis pinnatis: foliolis ovato-oblongis utroque glabris, ramis ³
glabris
Cnestis glabra; foliolis ovatis petiolatis utroque glabris, ramis ³
culatis brevibus. La Mart. Dict. bot. 3. p. 23. illust. t. 387

Habitat in Ansula Francie et Bobonea La Mart. & herb. Fuscovi 5
Rami teretes, crassitie penna Cygnea. Folia ad apicem ramorum
approximate, cum impari pinnata, uti congeneres, squae fere:
foliola laevina, alterna, petiolata, 2-3 pollicaria, interiora minor,
basi sinu parvo subcordata, obtusissima, obsolete venosa, integerrima.
Petoli teretes, infra foliola striis transversis approximate canu-
lati. Pedunculi ^{ramulorum} axillares et infra foliacei, aggregati, tuberculato
tomentoso insidentes, tomentosi, bipollicares, e bracteis minutis persistenti-
bus pro capite florum dentati: pedicelli ramosi ^{patentes} ^{patentes} tomen-
tosi. Petala glabra. Germen albosum, bordide griseum. Capsula
laevis triplo major, ferruginea tomentosa.

trifolia Cnestii foliis ternatis

Habitat in Guinea herb. Pers. 7

Rami teretes, superne flavescere tomentosi. Folia petiolata, frequentia, sparsa, ternata. Siliola petiolata, tripolliciana, oblongo-ovata, basi versus ^{superne} panem angustata. Lateralia altero latere angustiora, intermedia, acuminata, acuta senosa, trinerviâ, supra glaberrima, subnitida, subtus villosula. Petioli teretes villosi-tomentosi, tripollicares. Stipulae ~~duae~~ setaceae, axillares. Racemi terminales, subcompositi. Bracteis cylindricis, flavo-tomentosis, longitudinalliter sulcatis, basi versus attenuatis, superne recurvis.

polyphylla Cnestis foliis pinnatis; foliolis oblongis utraque vellosis stipe glabris

Cnestis polyphylla; foliolis ovato-oblongis subvillosis. basi semi-
petiolatis; racemulis tomentosis, capsulis obtusissimis La Mart.

Dict. bot. 3. p. 23.

Habitat in Madagascar Comerson Herb. Tussiacis 5

Rami superne angulati, flavescente tomentosi. Folia superne, remo-
ta, patentissima, spithamea, 8 yuz: foleola subpetiolata, bipollicia
na, interiora minor, alterna, oblonga, extrossum sensum parum
dilatata, integerrima, apice interdum obscure crenata, interdum
acuminata. Petioli teretes, vellosi. Inflorescentia ut in ferruginea
cui valde affinis. Capsula parum minor, quam in glabra

Cnestis polyphylla

corniculata. Cnesti folioli oblongi glabri, fructibus corniculatis

Habitat in Guinea herb. Fus. 3

Rami teretes, superne villosi. Folia alterna, pennata, 7-juga. Foliola bipollia
ria, oblonga, ex trofium parum latiora, altero latere basi breviora, ^{altero}
obliqua, integerrima, subavenia, glabra, ex capto costa subtus, supra nitidius
cula, parum acuminata, obtusa. Pedunculi axillares, unguiculares.
Fructus cylindricus, incurvus, sesquipollicaris, uti in reliquis precibus longi
tudinaliter rugosus, in rostrum acuminatus, basi attenuatus.

corniculata Cnestii folus pinnatis: foliolis oblongis ^{costa subtus villosis; capsulis} glabris, ~~fructibus~~ corni-
culatis tomentosis.

Cnestii corniculata; foliolis oblongo-acuminatis nervo medio villo-
sis, capsulis oblongis acutis corniculatis tomentosis pendentibus. La
mark. Dict. bot. 3. p. 23.

Habitat ad Terram Leonam Herb. Gussonei.

Rami Veretes, superne villosi. Folia alterna, pinnata, 4-juga; foliola bi-
pollicaria, est rorsum parum latiora, altero latere bascos breviora, altero
obliqua, integerrima, subavenia, glabra excepto costa subtus; supra
nitidiuscula, parum acuminata, obtusa. Pedunculi axillares; ungu-
culares, pauciflori. Capsula 4-5, sesquipollicares, cylindrici, incur-
vi, ut in reliquis speciebus longitudinaliter rugis, in rostrum acuminata,
basi attenuata.

Guianensis Aranea Aubl.

9 3

Habitat in Guiana herb. Guss.

Rami teretes, punctati. Folia pennata cum impari: Sobola ovata, acū
minata, obtusa, mucronata, venosa, glabra. Rami terminales, decomposi-
ti: ~~rami~~ ^{semi} ~~patentes~~ ramis patentibus. Flores parvi. Fructus pyrifo-
rmi, pedicellatus, glaber, magnitudine nucis coryli