

# Coiciloba

1. pubescens C. foliis orbiculatis pubescentibus
2. uvifera C. foliis cordato-subrotundis nitidis, racemis fructiferis pendulis
3. diversifolia C. foliis ramorum ovato-cordatis; ramulorum ovatis
4. Ceylanensis C. foliis subrotundis, racemis fructiferis erectis
5. exconata C. foliis ovatis, ramis quasi exconatis
6. punctata C. foliis lanceolato-ovatis.
7. nivea C. foliis ellipticis acuminatis venosis supra nitidis, racemis erectis sculis
8. emarginata C. foliis coriaceis subrotundis exciso-emarginatis
9. barbadosis C. foliis cordato-ovatis undulatis.
10. tenuifolia C. foliis ovatis membranaceis
11. obtusifolia C.

*Corioloeba sagittifolia polygama, folius sagittatis Oley. dec ad pag. 60*  
*Habitat in Brasilia 5*

*an potius polygoni speciei*

ovatifolia Coicifolia foliis ~~oblongis~~ ellipticis obtusissimis membranaceis venosis, rademis  
erectis.

Habitat in Monserrate Andalya

Rami teretes, glabri, striati, cinerei.

Folia petiolata, alterna, tripollicaria, prolires binos lobos venosa, inter  
gemina, apice obtusata

Petioles unguiculares, purpurascetes.

Spica terminalis, tripollicaris.

pubescens Coecoloba foliis <sup>cordatis</sup> reniformibus orbiculatis venis subtus pubescentibus -  
Coecoloba pubescens: foliis orbiculatis pubescentibus Lin. S. V pag. 379.

Habitat in Montserrat de Ryan

Rami crassitie digiti minimi, cortice cinereo-flavescente, glabri, ciliati

Folia sessilia, maxima, bipedalia, latitudine et longitudine fere aequalia, basi cordata, orbiculata, integerrima, venosa, nervosa, supra glabra, subtus venis pubescentibus.

Gemmae axillares, hispidae

Pedunculi axillares, interdum gemini, 6-7. pollidares, angulati: pedicelli semilingulares, frequentissimi, sparsi, saepe 2-4 aggregati

austriaci *Panicoloba*

Boetter

Habitat herb. musci

Caules teretes, ramosi, volubiles, glabri: ramuli angulati. Folia petiolata,  
unquiculana, glabra, subrotunda, subtus pallidiora, venosa, glabra. Petioli  
longitudine fere foliorum. Stipulae in ramis, hyalinae, deciduae. Spica latera-  
les, sesquipolliares. Flores distantes, parvi, pedicellati; aggregati

Festularia Coccoloba foliis ovatis oblongis

Habitat in America herb. Junoni

Gramini glabri, ceneri, florati. Siliqua sive vel 6 pollicaria, petiolata, coriacea, vena  
la, basi pollicaris tris lata. Spica erecta pythamoa, tenues

*Festuca Coriolata*

Habitat in America merid. herb. Sarrac apud Busf.  
Rami cinerei. Spica laterales et terminales, solitane, spithamea  
Flores distincti, alterni

4 barbadosis Coccinella foliis cordato-ovatis undulatis Lin. S.V.p. 379. Jacq. obf.

t. 8.

Habitat in Barbados &

Rami flexuosi cortice cinereo. Folia petiolata saepe pedalis <sup>vel 3 s. 4 pollicia</sup> inferius  
cordato ovata vel oblongo-ovata glabra <sup>supra</sup> pallidiora,  
senosa submembranacea obtusa. petioli vaginantes <sup>superiores</sup>  
Rami <sup>petioli</sup> terminalis 5-6 pollicari erectus floris sparsi distincti  
solitarii frequentes.

an mea vere Jacq. vel potius?

~~non vidi~~



4 Loganea si Coiccoloba foliis subrotundis, racemis fructiferis erectis

Coiccoloba Loganea si: foliis subrotundis integerrimis, nitidis racemis fructuum  
erectis Jacq. h. p. 113. t. 170. fig. 33.

Habitat in Domingo

Rami flexuosi, articulati, cinerei, glabri, ut in tota planta. Folia  
pedicelata membranacea nitida subovata, venosa bipelluciana  
utrinque glabra. Racemi <sup>in</sup> apice ramulorum ultimorum basi folio  
adjecto, tri vel quadripollicares, filiformes. Flores distantes parvi  
sepius ~~sepius~~ solitarii

---

fructus fructiferis erectis, floribus solitariis

folia in mea membranacea potius quam coriacea

in mea eadem cum Jacq. uni

5 punctata *Coiccoloba foliis lanceolatis ovatis* Lin. s. V. p. 379.  
unifera arbor americana, fructu aromatico punctato Pluk. alm. 394. t.

237. fig. 4.  
*Coiccoloba foliis oblongo-ovatis venosis, uvis minoribus punctatis* Brown. jam

240  
*Coiccoloba foliis ovali-oblongis acuminatis planis* Jacq. h. 114. t. 77.

Habitat in America  
Arbustula quindecim pedalis. <sup>submembranacea</sup> folia acuminata, plana, <sup>subcoriacea</sup>  
venosa, nitida, semipedalia. Petiolis basi vaginantibus. Racemi  
terminales, simplices, solitarii erecti, vix sequi pollicares. Flores  
albi. Jacq.

mea planta cum Plukneti figura convenit a Jacquinii vero differre videtur

folia in *Coiccoloba*, alterna, integerrima flores punctati

meum herbari an recte determin.

*S. emarginata* Coreoloba foliis cordatis subrotundis et c. s. emarginatis Lin. S. V. p. 329  
Raij. amer. 37. off. 10. t. 9.  
Habitat in America calidioribus

*Donnifolia* *Coccoloba* foliis ovatis membranaceis Lin. Am. acad. 5. p. 397 +  
*Coccoloba* frutescens, foliis subrotundis, fructu minore trigono Brav. pan.  
210. t. 14. fig. 3.

Habitat in Jamaica

Recedit a congenibus: foliis membranaceis nec coriaceis. Petiolis  
cunctis membranaceo loco stipularum nec exsertite de eorum dorso.  
Racemis terminalibus simplicifloris. Clonibus sparsis & singulis  
punctis pedicellatis Lin. l. c.

3 *Diversifolia* Coccoloba foliis ramorum ovato cordatis ramulorum ovatis  
Coccoloba ~~sp~~ *Diversifolia* foliis ramu<sup>is</sup> sicilonum ovatis, ramo  
rum ovato cordatis Jacq. Pl. Amer. p. 144 \*

Habitat in Domingo

Rami cortice cinereo. Folia petiolato, coriacea, venosa, nitida  
obtusiuscula 3-4 pollicaria. Petiolus unguiculatus purpurea  
siccus, supra per canaliculatus subtus convexa. Racemus  
terminalis solitarius 2-5 pollicaris, erectus. Flores parvi  
Drupa ovata, magnitudinis pisi calyce coronato.

~~Clontari solida~~ *obtusifolia* (C) foliis oblongis obtusissimis Saeg. hest. pag. Tab. 74. *Spicis erectis flombus solitariis*

*Habitat in America meridionali. Fr. flexuosi ramulosi ramuli apice ovato*

*Rami teretes glabri, cortice cinereo. Folia frequentia petiolata pollinaria*  
*armata pubescenti, apiculata <sup>inermis</sup> basi plana, membranacea venosa glabra. Spica ex apice*  
*ramulo bis. In pollinaria flores parvi, solitarii parvi*

7 nvea Porcoloba foliis ellipticis acuminatis venosis supra nitidis, racemis cae  
visifulis. Schw. prodr. 64.

Porcoloba nvea?

Habitat in Yamaitos Hispaniola <sup>Samula</sup> <sup>no</sup> <sup>leucaris</sup> foliis et floribus basi attenuato

Rami cortice cinereo. <sup>ramuli</sup> <sup>no</sup> <sup>leucaris</sup> <sup>foliis</sup> <sup>et</sup> <sup>floribus</sup> <sup>basi</sup> <sup>attenuato</sup>  
Solia pedicellata, pithamea, membranacea b

petiolus brevis. Racemi <sup>ramuli</sup> <sup>no</sup> <sup>leucaris</sup> <sup>foliis</sup> <sup>et</sup> <sup>floribus</sup> <sup>basi</sup> <sup>attenuato</sup> <sup>ramulorum</sup>  
<sup>acuminata</sup> <sup>venosa</sup> <sup>glabra</sup> <sup>ramulorum</sup> laterales et terminales tri vel quadri pollicia  
res. Flores copiosi breves pedicellati nutantes. Bractea minuto plures ad basin  
pedicelli

apud ea Corioloia foliis oblongo ovatis venosis micis terminalibus  
Lour fl. Cochinch. pag. 239.

Habundat in Sphinctina

Caules pubescentes, scandens. Folium oblongo-ovata, pube  
tenuata, integerrima, coriacea, venosa, alterna, flores  
albi. Calyx campanulatus albus, 5 partitus. Laciniae ob  
longo concavis. Stylis semitrisidis stigmata 3 subrotunda  
Bacca subrotunda, squeloba subnigra pellucida parva  
Semina triquetra

non vidi



Cymosa Puccoloba foliis oblongo-oratis, cymis sesquibus axillaribus  
et terminalibus Lour. fl. Cochinch. pag. 240  
Habitata in sylvis Cochinchinae

non vidi

5  
excornata *Poccoloba foliis ovatis*, ramis quasi ~~excorticatis~~ ~~excorticatis~~ L. S. V. p. 379.

~~*Arbo indica glycyrrhizis foliis subobovatis; floribus in prolongam pedicem adactis*~~

~~*Plum. amath. 22 t. 363 fig. 4?*~~

*Guajabara alia racemosa, foliis oblongis Plum. l. c. 146. f. 1.?*

*Poccolobis montana major arborea, foliis subobovatis cortice lavi Brown. Jam.*

<sup>210.</sup>  
*Poccoloba foliis ovato-oblongis acuminatis rugosis Jacqu. h. 115. t. 72*

*Habitat in America?*

*Solca ovato-oblonga, integerrima acuta, nitida, venosa, rugosa, petiolata  
aeterna, semipedalis. Racemi terminales solitarii, simplices; sursum  
versi. Flores exigui, flavescentes. Calyx concavus. erudit frassus, succo  
lentis, nuceis, et ad medullam solummodo tegit nucem triquetram, etiam  
nitidam, supeme nudam. Jacqu. Pl. Am. p. 144.*

*Synonymum Jacquinii ad nucem refert Swartz*

1 pubescens Coccoloba foliis orbiculatis pubescentibus Lin. S. V. pag. 379. <sup>Jacq.</sup> Plant. Amer. 142.  
Scitica arbor americana, amplifloris foliis ovata parte nervi exten-  
tibus. Pluk. Phyt. 222. fig. 8.

Coccoloba arborea, foliis orbiculatis Brown. Jam. 210.

Coccoloba grandifolia foliis subrotundis integris hispitis rugosis Jacq.  
Amer. 14.

Habitat in America

Arbor 60-80 pedalis apice ramosa. <sup>Rami cortice</sup> folia maxima, <sup>scorpioidalis</sup> pectinata, basi  
cordata, integerrima, venosissima, <sup>reticulata</sup> subtus venis extantibus <sup>vel</sup>  
reticulata villosissima. <sup>abacame</sup> Lignis <sup>in pedunculo</sup> spithameo. <sup>in pedunculo</sup> Pedicelli aggregati caposi  
sparsi. <sup>subtus</sup> foliis villosioribus et glabrioribus

2 uifera *Coccoloba* foliis cordato-subrotundis <sup>racemis fructiferis pendulis</sup> nitidis *Lin. h. V. p. 379*

*Populus americana rotundifolia* *Bauh. Pin. 430.*

*uifera littorea*, foliis amplioribus fere orbiculatis crispis, americana  
*Pluk. alm. 394. t. 236. fig. 7*

*Prunus maritima racemosa*, foliis subrotundo glabris, fructu minore pur-  
pureo *Sloan. h. 2. p. 129. t. 220. fig. 3. Ray dendr. 40. Cat. fl. car. 2.*  
*pag. 6. t. 96.*

*Guajabara racemosa*, foliis coriaceis subrotundis *Plum. ii. 145*

*Coccoloba* foliis subrotundis, integris nitidis planis, racemis fructuum  
cernuis *Guaj. hist. t. 73.*

Habitata in America

Arbor procerâ cortice cinereo. Folia magna, coriacea, saturate viridia  
venis purpureis <sup>obtusius venosa</sup> <sub>solitariis</sub> <sup>terminalibus</sup>. Petioli breves basi vaginantibus. Racemus  
parvis albis <sup>aggregatis, papillis</sup> <sub>terminalibus</sub> <sup>prostratis</sup> fructiferis pendulis, fo-  
triplex

australi Q

Falt