

Colcofistum

Condalia flora Peruv. congener secund. Gu!

reperi: *Coleosiphium*.

pedunculatus!

~~Psychotria~~ *Psychotria* foliis ovatis utrinque acutis subpubescentibus, floribus axilla-
~~ribus~~ ~~suboppositis~~ ~~suboppositis~~ ~~caule repente~~, caule repente.
terris ~~et unguibus~~

Habitat in ~~america~~ meridionali von Rohr no 22.

herbacea, Caulis teres ramosi repente subpubescentes. Folia petiolata
opposita remota, pollicina indegemma obscure nervosa are-
nata. Petioli unguiculati pubescentes. Stipulae subulatae. Calyx
et fidus persistenti latius ^{apice} subulatis. Corolla calyce duplo longior
baccis globosis magnitudine pubescenti coronata calyce violaceo
semina plura.

Cordulia lanceolata foliis lanceolatis integerrimis, caule radice ante, pedun-
culis multi floris flor. Peruv. 1. pag. 54.

Habitat in nemoribus Peruvianis locis umbrosis.

Tota planta dense pubescenti. Caulis herbaceus, radicans, succosus, fra-
gilis, teres, ramosus. Folia opposita, petiolata, lanceolata, acuta.

Synula subulata, persistentes. Peduncululi ex altera axilla, solitarii
multiflori. Flores congesti, sessiles. Bractea lanceolata. Calyx sil-

penis, 4 partitus: lacina lanceolata, exserta persistentes. Corolla
albo violacea, infundibuliformis. Tubus longitudine calycis.

Dauci inflata. Lacinia 4 partitus: lacina lanceolata pater-
na. Stamina fauci inserta. Anthera bifida, lineari. Germen

ovatum. Stylus filiformis. Stigmata duo revoluta. Bacca cornea,
ovato-oblonga, calycis coronata, biloculari, spongiosa, cava.

Semina plurima, orbiculata angulosa, a pulpa libera: receptaculo
duo epimento utraque adnato affixa fl. Peruv

omnis Cordulifoli peruv

Pondalica obovata foliis obovatis acuminatis, pedunculis aggregatis,
floibus racemosis fl. Penn. 1. pag. 54.

Habitat in nemoribus Censuum

Caulis pedalis, suffruticosus, tripedalis, erectus, parum ramosus. Folia
petiolata, opposita, ~~per~~ acumine brevi terminata, integerrima
utrinque glabra. Petioli purpurei. Stipulae interfoliaceae, ovatae, acutae
deciduae. Pedunculi 6-8. ex fasciculis axillaris, inaequales, pubescentes
floer racemosi. Corolla albo-rosea. Baccae purpureae fl.
Penn.

Condalia sessilis foliis oblongis acutis, floribus sessilibus congestis axillaribus fl. Penn. 1. pag. 54.

Habitat in Penna nemoribus, per runcationes et tramites.

Caulis suffruticosus, tripedalis, erectus, teres, sive ramosus. Folia opposita, petiolata, integerima, supra nitida, planum oblique, interdum oblongo-ovata. Stipula interfoliacea, ovata, acuta, decidua. Flores axillares, sessiles, aggregati. Corolla purpurea et c. Bacca purpurea ovata. Semina minutissima, fulvescentia. fl. Penn.

Pondalicia repens foliis ovatis acutis, caule repente, pedunculis tri- multi-
floris umbellatis fl. Penn. 1. pag. 54. tab. 24. fig. a.

Habitat in nemoribus Pantahianum
glabra vel pubescens. Caulis herbaceus, plures, repentes, ramosi, verticis
pedales, teneri, nitidi, purpurascens. Folia opposita, ovata, acuta,
petiolata, venoso lineata, nitida patentia, plana, pubescentia, infra
germina. Stipulae in terfoliaceae, erectae, oppositae, subulatae. Pedunculi
axillares, alterni, solitarii, folios duplobreviores, tri- multiflori. Flori-
breviter pedicellati, umbellati, basi bractea utrinque ad apicem pedunculi
calycis laciniis subulatae. Corolla purpurascens. Bacca coerulea
ovata. Semina ferruginea orbiculata plana

Habitus in aeno *Coccosiphili* an ejusdem generis?

repens *Coccidipileum* Brown. *jam.* 144. *Sw. prod.* p. 31.
Habitat. in Jamaica

Coc. tabac. aut. specie non differt *Perk*

naudi

virgatum *Coccopflum* caulebus virgatis foliis acuminatis, cymis lateralibus pedunculatis; pedunculis petiolo longioribus. La Mark T.

E. p. 279.

an *Nacibea* alba Aubl. t. 37. fig. 2.

Habitat in America meridionali

herbaceum caule basi reptante foliis fasciatis cymis
axillaribus sessilibus La Mark

non vidi.