

# Cochlearia

- 1 officinalis C. foliis radicalibus cordato-subrotundis petiolatis, caulibus  
oblongis subsinuatis semiamplexicaulis
2. danica C. foliis hastato angulatis: omnibus deltoideis petiolatis
3. anglica C. foliis omnibus ovato lanceolatis
4. grandaevica C. foliis integris carnosis radicalibus subveni formibus  
petiolatis caulibus oblongis sessilibus
5. coronopus C. foliis pinnatifidis, caule depresso
6. armoëica C. foliis lanceolatis radicalibus crenatis, caulibus in  
7. glastifolia C. foliis caulibus cordato sagittatis amplexicaulis in  
tegenensis
8. Graba C. foliis lanceolatis amplexicaulis dentatis basi angu-  
statis

auriculata Cochlearia

Habitat herb. La Martini.

Caulis herbaceus, ramosus, uti tota planta glaber. Folii lanceolata, int. egemma  
inferiora extriopum dente uno albore notata. Racemi laterales et terminales  
Siliquis globosis, magnitudine sem. Cerauri, mucronatis, laxis.



Pochleania

Habitat

Caules plures, digitales, erecti.

Humifusa Cochleana

~~Hab~~ B. putella apetala Walt.

Habitat in Carolina herb. Reck. C.

Cor. nulla - Filamenta 6.

affinis Lepido didymo et forte non diversa

axillare ~~Hypericum~~

~~Habitat in Carolina herb. Arch.~~

~~Hypericum <sup>mpanulatum</sup> Carolinense Walth.~~

~~Habitat in Carolina herb. Arch.~~



Cochlearia

Raptharus aquaticus canadensis Encia vel crispifolia, Cochlearia capu-  
la

Habitat in Canada

Caulis erectus, scaber, striatus, pilosus, superne ramosus. Folia inferiora petio-  
lata, lyrata, 5-6 pollicaria, glabra: laciniis oblongo, approximato albes-  
centibus, inaequaliter obtusiuscule dentata, superioribus, quibus pollicares; termi-  
nalem subcordata, obtusa; superiora semiamplexicaulia, canaliculata, den-  
tato-subincisa; suprema integerrima sesquipollicaria, canna et venis  
utrinque raris pilosa. Racemi axillares et terminales, bi- & tripolli-  
cari. Flores parvi. Silicula subgloboso-oblonga, glabra, mucronata,  
vix magnitudine draba verna, polysperma. Dispersionem parallelam.

*Thlaspi Cochlearia*

*Cochlearia montana* pumila Gussky vind. Lefst.

*Thlaspi leptaneum* pumilum i Cochlearia folio Tournef. G. R. 4

Habitat in leptanea herb. Guss.

Planta pusilla, vix longitudine digiti minimi, caespitosa, glabra. Caulis filiformis, semipollicaris. Folia longe petiolata, ovata, interdum subangulata, obtusa, semivinculana vel minus, asencia. Petioli semipollicaris. Pedunculi axillares, capillares, folio longiores, filiculis puberato.



officinalis C. foliis radicalibus cordato-subrotundis, caulinis oblongis sub  
pinnatis Lin. I. V. fl. Dan. V. 135

Poitheana God. pempt. 594

Poitheana foliis subrotundo Bauh. pin. 110

Habitat in Europa borealis Aethiopiae maris O. I.

Caulis plures diffusi fructu glabri frantanea palma digitali palma  
res vel ultra. Folia uti reliqua parte glabra radicalia petiolata  
semperque utana. Caulina semper complexa caulis oblonga saepe  
sata sent uno vel altero. Reliqua globosa lavi

petiolati, caulini semperplexi

radicibus.



*Danica*  $\odot$  foliis hastato-angulatis: omnibus deltoidibus Lin 1. V. p 504.  
L. V. Mant. 425. fl. Dan. 100.

*Thlaspi hederaceum* Lobel in 615.

$\beta$ . *Cochlearia Danica repens* Bauh. prodr. 53. pin. 110

$\gamma$ . *Cochlearia minor exita* Bauh. prodr. 53. pin. 100

Habitat in Danis, Suetis littonibus marinis  $\odot$

Planta foere q<sup>ue</sup> vix digitali lata glabra superne in vamo  
uno alterove d<sup>iv</sup>isi<sup>o</sup>ni. folia omnia petiolata semper  
culana inferne dente unico vel gemino utraque profundo  
subhastata, obtusa basi cordata vix longiora quam lata  
filicula oblonga

petiolata

anglica  $\odot$  foliis omnibus ovato-lanceolatis L. V. fl. Dan.

N. 329.

*Cochlearia britannica* f. *anglica* Lobel. ii. 294

*Cochlearia foliosuata* Bauh. pin. 110.

Habitat in Anglia littoribus maris  $\text{F}$



gronlandica C foliis reniformibus integris carnosif Hort. Cliff.

490+ S.W. Spec. pl. p. 904+

Cochlearia minima <sup>na</sup> reperit insula alholmia Barth. act.

3. p. 143. v. 144.

Cochlearia minima Boech. Lugdb. 2. p. 10

Habitatio Norvegia, Flandria Gronlandia C

Planta digitalis glabra folia radicealia petiolata fere Cortl.

officinalis longe petiolata avenia subter. valde comar<sup>et</sup>

amurghicilana caudina fuplia oblonga

silicula oblonga stylo brevi mucronato in officinali globo  
to majori vix stylati

conf. Descript. hort. Cliff

armoracia *Q* foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulibus caespitibus  
Lin. 1. v

Raphani magna Dod. pempt. 670.

Raphani rusticanus Bauh. pin 96.

Habitat in Europa caespitibus et ad rivulos &

Caulis bipedalis et ultra pubescentis glaber, ramosis folia  
inferiora petiolata superiora sessilia profunde serrata.  
venosa obtusa. silicula oblonga



glabrifolia C. foliis caulinis cordato-fimbriatis amplexi<sup>caulis</sup> auleibus  
Linn. p. 1. v

Lepidium annuum Dalech. hist. 1297.

Lepidium glabrifolium Bauh. pin. 97. Monf. hist. 2. p. 312.  
p. 13. t. 21. fig. 3.

Habitat <sup>in</sup> Brasiliæ agri B

Tota glabra facie Brasiliæ orientali folia hypoleuca  
nā superne scapim minora integerrima, glaberrima veno  
sa. Racemi ad apicem alterni filiculis globosis

integerrima

foetida    *O* foliis caulinis pinnatis lanceolatis - sagittatis dentatis,  
filiculis cochleariformibus repandis Schrank  
flor. bovar. p. 105  
Habitat in Bavaria

non redi