

Coffee.

micriana Coffea

Coffea micriana; foliis lanceolatis acutis, stipulis utraque bidentatis; cymis axillaribus terminalibusque patulis &c. Penus. 2. pag. 66. tab. 210. fig. 6.

Habitat in Andum nemoribus
glabra. Caulis fruticosus, inorganicus, erectus, ramis & ramis. Rami erecti, dichotomi, teretes, superne compressi & sculi; cinerei. Folia remota, patentia, lanceolata, acuta, integerrima, venosa. Stipulae vaginantes, trinerviata, bidentata: denticulis subulatis, adpressis, deciduis. Racemi terminales, sesqui-palmares. Pedunculi bracteati, decussati, remoti; venulenter pubescentes; basi Bractea subulata. Florae ternae; & sessiles. Calyx minimus, quinque-dentatus. Corolla albidiuscula, ciliis leviter pubescenti. Bacca magnitudinis Piperis nigri, rubicunda, & superma
H. P. L. c.

folia lanceolata oblonga pedunculi pariter bis
bifidi cum flore sessili in densura

Longifolia Coffea

Coffea longifolia; foliis lanceolato-oblongis undulato-repandis, sti-
pulis ovatis, racemis terminalibus ternis &c. Peruv. 2. pag. 66 tab
210 fig. a

Habitat in Peruvia adum nemorosis &
glabra. Caulis fruticosus, triulnans, erectus, superne ramosus
Rami erecti, teretes, articulati, plerumque dichotomi. Folia pedicelata,
reflexa, lanceolato-oblonga, acuminata, integerrima, undulato-re-
panda, supra nitida, venosa, fere pedalia. Petioli pollicares. Stipulae
ovatae, in vaginam connatae. Racemi terminalis, terni, bracteati,
resque palmares. Peduncululi multiflori. Flores breviter pedicellati, con-
gesti. Calyx minimus, quinque-dentatus. Corolla alba. Faucis villosa ha-
bitu limbo reflexi. Baccis globosa dispersa, rubra. Semina elliptica
obovata. H. B. K.

folia attenuata Racemi compositi

Nitida Coffea

Coffea nitida foliis oblongis obtuse acuminatis nitidis, stipulis trinerviis ciliatis, racemis terminalibus Fl. Peruv. 2. pag. 63. Tab. 217
fig. a

Habitat in Andium nemoribus

glabra - Caulis fruticosus triulnari, erectus. Rami superne, patentes, ^{sub} dicto
forni, obsolete tetragoni, articulationibus incrassatis, vaginati, ^{non} ~~ter~~
compressi. Folia petiolata, sesquipalmaria, patenti-reflexa, oblonga,
nonnulla oblongo-obovata, acumine brevi obtuso, integerrima, venosa
subconata, supra nitidissima. Stipulae semicirculares, breves, in-
tegrissime vaginantes, etius glandulis linearibus albicantibus, cada-
vis and. Racemi terminales, palmares, compositi. Pedunculi flori-
feri bracteati, compressi, bracteis ciliatis ad basin. Flores sessiles ag-
gregati. Calyx squedentatus. Corolla alba: Taux hirsuta. Bacca
magnitudine pisi, calyce coronata, disperma, rubra Fl. Per. l. c.

verticillata Coffea

Coffea verticillata, foliis oblongo-lanceolatis obovatisque acuminatis, stipulis ovatis ciliatis, racemis terminalibus verticillatis & C. Per. 2. pag 66 tab 217. fig. 6.

Habitat in Andium nemoribus & glabra. Caulis berygialis, fruticosis. Rami superiores, brachioti; plerumque dichotomi, teretes, articulationibus incrassati, stipularum basi hinc vaginati. Tenere compressi & scilicet, folios. Folia patentia, oblongo-lanceolata, nonnulla obovata, acuminata, integerrima, venosa, majora bipalmata. Petioli fere pollicares. Stipula interfoliacea, ovata, ciliata, decidua. Racemi terminales, & squamulares, floriferi ternarii, compositi. Pedunculi quaternarii ^{vel sextarii} verticillati, patentissimi 3-6 flori. Bractea ad basin parvula, setacea. Flores sessiles, basi bracteati. Calyx minimus squidentatus, ciliatus. Corolla alba, infundibuliformis: faucibus villosa. Lamentis revolutis. Folia lanceolata oblonga

foveolata Coffea

Coffea foveolata foliis oblongo-ovalibus acute acuminatis, foveolis
ad basin nervorum, Stipulis ovatis, racemis terminalibus & C. Peruv. 2.
pag 65. tab 216. fig. 6

Habitat in Peruvia Andium nemoribus
glabra. Caulis fruticosus, Inorgyalis, erectus. Rami brachiati, plerumque
dichotomi, obtuse tetragoni, cinerei: Tenes compressi. Folia remotis, petio-
lata, horizontalia, plana, oblongo-ovalia, nonnulla oblongo-obovata,
^{acuta} acuminata, integra rimis, venosa, supra nitida, bipalmata, venis ad
basin foveolatis inflexis. Petioli semipollicares. Stipulae semicirculares
apice dorso glanduliferis, adpresso, vaginantes, deciduas, breves. Racemi
terminales, palmares, compositi. Peduncululi et pedicelli brachiato-de-
cussati, tetragoni compressi, basi bracteis minimis setulatis. Flores sessiles
bini verticillati. Calyx minimus, squidentatus. Corolla alba, extus dilute
purpurea. Faux hirsuta. Bacca subrotunda, utrinque depressa
magnitudine ciceris, rubra, duperto, calycis obsolete coronata.
folia oblongo-ovata

ciliata Coffea

Coffea ciliata foliis oblongis acuminatis, styculis truncatis, ciliis obvallatis, racemis terminalibus DC. Penw. 2. pag 65 Tab 216 fig a.

Habitatio Penins. Andam nemorosus 5

glabra. Caulis fruticosus, tergyalis, erectus. Rami dichotomi; obsolete tetragoni, articulationibus incrassati, vestigiis styculorum vix remanentibus: Venae foliorum, compressae, cineris. Stipulae petiolatae, oblongae, acuminatae, integerrimae, venosae, imbricatae, breves, vaginantes membranaceae, ciliis longioribus subulatis, calycis obvallato, morescentes. Racemi terminales, palmares, cernui. Pedunculi brachiati, articulati, basi bracteae parvae, subulatae. Flores aggregati, sessiles, basi bracteati. Calyx 4-5 partitus. Corolla alba. Eius lobata. Lacinis 4-5 fidus. Stamina 4-5. Bractea subrotunda, rubra disperma, vestigio calycis notata DC. P. L. C.

umbellata Coffea

Coffea umbellata; foliis oblongis acuminatis numerosis; stipulis
subrotundis, pedunculis umbellatis &c. Penn. 2. pag 64 tab. 215-
fig. 1^a & 2^a

Habitat in Andiam nemorosis

Glabra. Caulis fruticosus; boryyalis; erectus. Rami plerumque dichoto-
mi, obtuse tetragoni, compressiusculi. Folia petiolata, oblonga,
acumine subulato terminata, integerrima, coriacea, dense venosuli-
creata: nervi horizontalibus, nervo subtus utroque marginato-lutescente
Petioli leviter sulcati, stipulas adnati. Stipulae interfoliaceae, supra
axillares, vaginantes, subrotundae, acuminatae, integerrimae. Peduncu-
li axillares, terminalesque, umbellati, quaterni, involucriati. Pedicelli
7 flori involucriati. Involucrum universale tetraphyllum; parviale
heptaphyllum: foliolis ovatis, acutis. Flores sessiles congesti. Calyx
campanulatus; quinquefidus: laciniis ovatis obtusis. Corolla alba
infundibuli formis. Filamenta basi hirsuta. Bacca ovalis 2 sperma-
tribus calyce coronata. &c. Penn.

Subsessili Coffea

Coffea subsessili; foliis oblongo-lanceolatis, acuminatis; basi excavatis, stipulis ovatis racemi axillaribus Fl. Peruv. 2. pag 64 tab 215. fig. 6

Habitat in Andium nemoribus. 5

Glabra - Caulis bryggalis, erectus. Rami dichotomi, tetragoni, compressi, lutescentes. Folia subsessilia, ^{compressa, petiolata} fere pedalia, oblongo-lanceolata acuminata, basi cordata, integerrima, congrua, obliqua, supra nitida, venosissima, reticulata, venis majoribus horizontalibus. Petioli brevissimi, stipulis adnatis. Stipulae interfoliaceae, supra axillares, vaginantes, ovatae, acuminatae, deciduae. Racemi axillares, solitarii. Peduncululi bracteati, decussati, tetragoni, compressi, adsculati. Bacca ovalis, monosperma, basi calycis tubulosa coronata, obscura - viduae magni Andine Ceras: Semen globosum, ex cornea consistentia, epidermide tallosa Textura Fl. Peruv.

Racemi simpliciter
tata horum attenuata inferne versus sensum parum angustata
peduncululi triflori. Flores pedicellati

racemosa Coffea

Coffea racemosa, foliis oblongo-ovatis acuminatis, stipulis bifidis
racemis axillaribus terminalibusque in flore nutantibus. Fl. Peruv
2. per 64. Tab 214. fig. a.

Habitat in Peruvia nemoribus. 5

Stem. Caulis teretis, erectus. Rami patentes, plerumque dichotomi, compressi,
gemulati. Folia petiolata, bipalmata, oblongo-ovata acuminata, inta
yamina, venosa: venis alternis, inflexis. Petioli pollicares, semiter
tes, stipulis adnatis. Stipulae interfoliaceae, bifidae, acutae, caducae,
ad ipsam axillam setis pluribus conspicuis, glanduliformibus
Præternim axillares terminalibusque, bracteatis; in flore nutantes, fructiferi
erecti. Pedunculi tetragoni, compressiusculi, articulati. Flores subsessi
les congesti, basi bracteis minimis, acutis, deciduis. Calyx squedantatus
Corolla alba: lacinae revoluta. Filamenta basi hirsuta. Bacca ovalis immo
perma dispermaque, magnitudine Cerasi, calycis vestigio notati. Semina
hemisphaerica

oblongo-ovata Racemi subsimplices pedicelli
oppositi multiflori

acuminata Coffea

Coffea acuminata; foliis ovalibus acuminatis ad axillas venarum
villois, stipulis caducis, racemis pauciflori Fl. Peruv. 2. pag 64
Tab 214. fig. 6.

Habitat in Andium nemoribus &

epatra. Caulis fruticosus, bronchialis, erectus. Ramis dichotomis, tetragonis,
compressisculis, sulcatis coloris. Folia petiolata, ovalia, acumine
linear-terminata, integerrima, venosa, ad axillas venarum villosa
Petioli semipollicares, stipulis adnatis. Stipulae interpleaeae, ovatae, acin-
toe, caducis, integerrime, breves. Racemi terminaliter, breves, pau-
ciflori. Peduncululi brachiatos-decussati, adnatis: superiores oppositi
inferiores quaterni. Bractea minima ad basin. Flores congesti sub
pediculis. Calyx minimus squidentatus. Corolla alba limbus revol-
tus. Bacca ovalis monosperma, rubra magnitudine Cerasi umbilica-
ta, calyce coronata. Semen ovale Fl. Per

oblongo-ovata Racemi subcompositi

ambica L. foliis oblongo ovatis, floribus quinquebidi buccis dispermis ha Syst
Veget. Amdend. acad. 6.

Eonymo similis aegyptiaca, fructu buccis laevifolii. Bauh pin. 490.

Platan. Tab 272-ty. 1.

Bon alp. Egypt. 36. f. 36

Tasnum arabicum., laevifolia, rugis fermen apud nos Coffe die
ter Jus. in Act. parisi 1713. p. 300. 7.

Habitat in Arabia. 5

Rami glabri ^(ad articulos dilatati inferne teretes superne altior nabin)
compressi. ^{eg. tunc cinereo} Solida petiolata opposita 4-5; ^{colliciana integerrima}
utrinque glabra, venosa, attenuata. Stipula ^{lata} ^{interfoliaceae} ovata
brevi acuta adpresso. Petioli ^{in quibus laser.} ^{Parvissimi axillares}
oppositi ^{in quibus axilla} ~~carisimi oppositi~~ ^{duplex} 2-3. ^{sespales}

— elliptico lanceolatis
puberulis

— atallunbus, sepi

mauritiana Coff: foliis obovatis venoso reticulatis, floribus axillaribus, fructu
obovato ^{disspermo}
La mark Tabl. encycl. tab. 160. fig. 2.

Habitat in Insula ^{Borbonis} Mauritii Lusitan

Rami teretes glabri cortice cinereo. Folia petiolata
opposita subobovata glabra, ^{acuminata obtusa} intergemma venosiorum quam
in reliquis speciebus, venis transversis reticulatis. Stipulae
marcescentes. Fructus ovatus unguiculari sepius axillari
plerum solitarii.

Coffea mauritiana baccis oblongis basi acutis disspermis
La mark

microcarpa C. foliis ellipticis lanceolatis, cyma terminali dichoto

ma

Habitat in Gfe de Franca & Thomia

Habitus reliquorum. Folia glabra integerrima arenaria
superne saepe terna. Baccis ut magnitudine Piperis

occidentalis C. foliis oblongis ovatis, floribus quadrifidis, bacis monospermis Lin. S. Veget
perg. 9ae qu.

Tasmanum arborescens, laevi foliis, flore albo odoratissimo Plum.
Spec: 17. n. 156 fig. 2.

Pavetta foliis oblongis-ovatis oppositis, stipulis setaceis Brown
fam. 142. t. 6. fig. 1.

Abundat in America calidioribus.

Rami glabri, superne alternatim compressi. Folia petiolata opposita
laevi elliptico lanceolata, integerrima venosa, acuminate, ^{ut supra acuta} petiolo
que glaberrima bi-stipulicaria. ^{Stipula} stipula interfoliacea, parva oblonga
obtusis, manispentes. Pedunculi terminales geminis
bis trifidi, foliis brevioribus.

— elliptico lanceolatis pedunculis bis trifidis —

Infloresc. P. foliis ovato-lanceolatis acuminatis, pedunculatis ter minabilibus
ternis unifloris forst. fl. austr. p. 16
Habitat Tahiti 5

non vidi

paniculata C. foliis ovato-oblongis acutis, floribus quadrifidis panicula
terminalibus - Aubl. pl. qu. 1. p. 152. t. 5. p.

Habitat in Guayana

Guianensis C. foliis ovato-oblongis acutis, floribus quadrifidis lacini-
latis proplebis axillaribus Publ. fl. Guian. 1. p. 150. v. 5. 7
Habitat in Guiana. 5

non vidi

Sumbucina C. foliis oblongo-lanceolatis acutis, Cymis corymbosis terminata
libris. Forst. fl. Austr. p. 16.
Habitat in insula amicorum

non vidi nisi ea est quam a Fabricio habui sub nomine *Cof.*
Lucco

odorata P. foliis ovatis acutis, cymis corymbosis axillaribus. Forst. p. 101. fl.
crist. p. 16
Habitat in Tanna et amicorum insulis 5

non vidi

Opulena C. foliis ovato-lanceolatis, cernis coarctatis globosis terminalibus.

Forst. flor. austr. p. 16

Habitat in nova Caledonia 5

Rami glabri superne compressi. Folia petiolata, opposita 3-5
nerviaria elliptico-lanceolata. Stipula ovata acuta
compressa ex axillis supremis et terminalibus densi: flores unguiculati
lacini. Anthera lineares sicca sordide albescentes ut in reliquis
speciebus et in Gardneria

Zaquebanis Coffea Corollis 6 fidi, fructu angulato nervoso Lour. fl.
Cochinch. 145.

Habitat in ~~Cochinchina~~ Zaquebanis sylvi
Arbor 6 pedali. Rami crassi, breves. Folia ovata lanceolata, glabra
opposita. Flores albi axillares foliis pedunculati sylvi. Bacca
nigra oblongo ovata.

non vidi

racemosa Coffea foliis ovato-lanceolatis scabris, racemis terminalibus

Lour. fl. Cochinch. pag. 145.

Habitat in Mozambique

arborcula 4 pedalis. Rami teretes diffusi. Folio integerrima, opposita
& tuberculis plurimis scabra. Flos papaveris. Pedunculis communis
longus tetragonis: partialis teretes vel stellati. Baccis parva rubra
serena hemisphaerica.

non vidi.