

Coffea

occidentalis Coffea floribus quadrifidis laciniis planis dentatis, bacis monospermis

a Tab. 6. Corolla aperta cum staminibus c. f. Calyx & Pistillum. & Bacca.

f. Semen g. Cotyledones

figura Aubl. non exakte cum nostra convenit igitur dubiose igitur citari

Leunina Coffea

Habitat ad Serram Leonam. herb. Throuni
Rami glabri, obscure tetragoni. Folia petiolata, futhanosa, elliptica, basi vesp
attenuata, acuminata, venosa. Ripula truncata. Pedunculi axillares, angui
culares, multiflori.

odorata Coffea

Foster

Habitat herb. Mus.

Ramiteretes, glabri, et reliqua partes, superne compressi. Folia petiolata, ovata, basi
acuta, apice obtusa, bipollicaria, supra nitida, obsolete venosa. Pedunculis axil-
lariis, oppositi, solitarii, filiformes, longitudine folia, subtrichotomi. Flores rari
germen minimum, Calyx dentatum

Lambucina Coffea

Booster

Habitat herb. mus.

Rami compresso-tetragoni, glabri. Folia petiolata, fere pithamoa, elliptica, glaberrima, arenia; obsolete remotè sine nervosa, supra nitida, acuta. Pedua Culi terminaler, compressi, terni, trichotomi. Calycis margini dentatur. Corolla usquiculani, cinerea.

paniculata Coffea

autl.

Habitat in sylvis Guiano ad montem Yneri Richard.

Stemex glaber, 12-6 pedali. Rami oppositi, patentes, remoti, laevs, obtuse Verticillati.
Folia petiolata, opposita, ut eodem spithamea, elliptica, basi subovata,
acuminata, venosa, integerrima. Petioli vaginulatos. Stipula tubulosa
bifida: lacinis ovata, acuminata, acumine setosio. Panicula varmiculata
pedunculata opposita, bis vel ter ⁱⁿ dichotomi. Iniculus immaturo suboculeus vix
descendit, subdidymo globosi. Pericarpium exsuccum, cotulare, spermatum

Coffea guianensis Aubl.

Habitat in fylvis umbrosis Cayenna Richard.

Indivisus subuni-pedali, glaber. Caulis teres. Rami oppositi, patentes, & lacinia
a petiolo decurrente subuni-pedales. Folia petiolata, opposita, pollicaria
vel paucum ultra, lanceolata-oblonga, lanugine venosa, obscura nervosa, utrin-
que acuta, integerrima, subtus pallide viridia. Flores axillares, breviter
pedunculati, infundibuliformes, quadrifidi. Limbus patens: lacinis lan-
ceolatis. Bacca sphenica magnitudine pisi, amara coculea. Sepala
setuicosa, erecta.

forte non generi *Coffea*

arabica C. floribus quinquefidis difformis Lin. duj. Coff. am. acid. 6. 1. V

Bon alp. egypt. 36. & 36.

Eunonymus similis aegyptiaca, fructu bacca Lauri simili Bauh. pin 490.

Plukh. phyt. 272. fig. 1.

Gajmunum arabicum castanea folio, flore albo odratissimo Till.
P. 87. 8. 32

Gajmunum arabicum, Lauri folio, capis semina apud nos Coffe dicitur
Juss. in act. par. 1713. p. 300. 4. 7.

Habitat in arabis felici, Aethiopia &

Corymbosa Coffea?

Rami inferi glabri cortice ferdide cinereo inferne veretis superne alternatim compressi articulat.

Folia opposita, petiolata, lanceolata elliptica, integerrima, acuminata, glaberrima
Lamina, nervis transversis superpositis basi acuminata attenuata ~~exteriorum triplici~~
cana

Petiolus pollicaris supra planus subtus convexus basi parum latior, insertus
Stipula vaginans petiolo duplo brevior ^{glabra} intra foliacea margine laciniis 4 or utraque
filiformibus longitudine stipulae

Cyma terminalis Corymbi Verminalis composita; Pedunculo pedicellis que
compressis foliis oppositis sessilibus lanceolatis acutis sub singulo divisa
Pedicellis trifloris flori intermedium sessilibus

Bractea linearis sub floribus lateralibus

Calyx campanulatus glaber quinquefida laciniis ovatis persistens inferum
Corolla ^{glabra} infundibuliformis quinquefida laciniis lanceolatis obtusis, tubo intus
vellosus.

Filamenta fere nulla. Anthera quinque lineares in faucibus tubi
Stylus longitudine Corollae, stigma bifidum laciniis linearibus acutis

Rappala bacca? biloculari loculis monospermis

Calyce duplo
longior oblongo

an Coffea habitus et stipulatis certe affinis et ad singulare est quod a reliquis
foliis oppositis stipulatis recedit calyx infero.

occidentalis C floribus quadrifidis baccis monopermis Lin. S. V. p.

Jaqu. Amer

67. 4. 47.

Gasmenum abriescens, launifolis, flore albo odoratissimo Plum. 4c.

156. fig. 2.

Pavetta foliis oblongo-ovatis oppositis, stipulis setaceis Brown Jam.

142. 8. 6. fig. 1.

Habitat in America calidioribus