

Poir.

- Calymma foliis integris <sup>emmis</sup> foemineis ovatis  
serratis — inferne serratis, foemineis oblongis

Caenyma Jobi Pois fructu ovato <sup>Pois</sup> foliis spatulatis lanceolatis margine crenatis  
Pois Caenyma Jobi Lin. l. V. pag. 842.

2 Serrata Coria feminebus oblongis, foliis <sup>sebulatis</sup> spathaceis basi serratis  
Habitat in India Orientali

Similis C. Lacryma differt vero quod multo minor: foliis <sup>sebulatis</sup> floralibus sebulatis vagina duplo longioribus, basi serratis  
per se curvatis, spathis reliquis unguicularibus, oblique  
truncatis anstatis longe antea longitudine vaginarum  
nec triplo vel quadriplo longioribus ut in C. Lacryma.  
Valvulis calycinis lanceolatis nec ovato-lanceolatis

~~gemmae folioe propter unam a Coria & Lacryma~~

retusa Coriaria foliis fasciculatis cuneiformibus retusis tridentatis

Fructus ex bacciferis e Coronandis sordis marini et veluti obtusis et relecti, rari-  
tatis foliis plurimis et uno tuberculo provenientes Pluk.

Tab. 31. fig. 1

Habitat in India orientali

Rami teretes glabri, alterni apice pilosiusculi

Folia sessilia cu pollicaria plura ex eadem gemma 3-5. pubescentia inaequalia  
cuneiformia apice retusa <sup>obtusae</sup> tridentata interdum quadridentata

dentibus duobus intermediis brevioribus approximatis, supra nitida  
adpressis squamis albidis a quorum medium pili solitarii albi minuti ad-  
pressi vix scabra subtus torva pallidiora impunctata  
gemma tuberculo tomentoso

Pedunculi ex eadem gemma ac folia, solitarii, uniflori sive pubescentes  
foliis brevioribus

in aliis stylis  
dubio in aliis  
dubio in aliis  
vel magis  
dubio

Calyx quinque partitus persistens laciniis linearibus pilosis.  
Corolla monopetala infundibuliformis, faucibus aperta.

Stamina 5:

Stylus duo longitudine corollae. Stylis acuta

calyx fructu  
non accretis  
capsa

Pappus globosus magnitudine apertus, mucronatus, quadri-locularis  
semina plura in singulis loculis oblonga, piliis transversalis loculi  
interne in duas partes dividens fructus transversus piliis longioribus  
et emittit

caninatus. C. receptaculo feminis ovato, foliis angustissimis cannatis  
Habitat in India orientali

agrosti Coar. culmo simplicissimo, foliis lanceatis, seminibus subtendis Lous fl. Coch.  
pag 451.

Salce uton Rumph. Amb. lib. 16. Cap. 16. Tab 9. fig. 1.

Habitat in humidis Indis 4

Culmus 3 pedalis tenis. folia lato-lanceata. Semen subtendum fusi-  
menasium.

Caenyma. Cora Lin. V

- Caenyma jobi Clus. hist. 2. p. 216. Pl. rar. p. 501.  
Lithospermum arundinaceum Bauh. Pin. 258.  
Ora P. sicum Rump arab. 5. p. 191. t. 75.  
Catinonda. Rheed mal. 12. p. 133. Tab. 70.

Cora Caenyma Lin. S. V. pag. 842

Habitat in India 4

Caulis plures, ramosi, pedales et ultra. Folia linear-lanceolata  
attenuata glabra: vagina striata pedunculi 2-3 e singula  
vagina. Flos foemineus inferior ovatus masculi e ~~vagina~~ <sup>strobili</sup> pedunculi  
masculi e via gluma foemina 3 vel quadriflorus <sup>al ternis</sup> ~~salvulus~~  
ovatis lobis

varietas in ~~foliis~~ forte ex india orientali foliis angu-  
stissimis in quibus cernatis masculis sessilibus oppositi