

Columnea

- Cal. 5-partitus. Cor. ringens; labio superiore 4-partito intermedia fornicata
supra basin gibba. Pappula 1 loculari femina nidulanti a lutea.
off. bat. p. 248.

1. scandens C. foliis ovatis serratis integerrimis serratis subvillosis calycibus
inter laciniis calycinis integris corollae pubescentibus; latine
intermedia labii superioris bidentata
2. nidulans C. foliis ovatis lanceolatis villosis denticulatis, foliis calycinis
cucurbitatis, labio superiore corollae bipartito
3. hispida C. foliis ovatis acuminatis serratis superiore hirsutis, foliis caly-
cinis denticulatis lanceolatis, labio superiore corollae bifido
4. hispida C. foliis ovatis obtusis denticulatis hirsutis, foliis
calycinis lanceolatis integris, caule villosis seratis

Stellata Columnea foliorum ternis, floribus solitariis, caule repente
Lour. fl. Coch. p. 304.

Habitat in Cochinchina apud

Caulis herbaceus teres, quadratus. Rami puberuli; 4 pollicares. Folii
ovata serrata, 3 lineas longa, petiolata. Flores albi rubro variegati
superfici pedicelati. Lacina calycis pubulata. Perla nuda
labio superiore fornicato 3 fido inferiore trifido. Stamina per
una incurvata. Anthera connata. Capsula pubulata 2 loculari
nonyperma. Tota planta, capsula excepta pilosa.

hamifafa

David Sw

Caulis scandens radicans, angulatus, subtetragonus, striatus puberulus
succulentus, fragilis, hirsutus pilulis. Folia opposita petiolata
ovata acuta serrata (taiq. lia. Plum. ^{var. integris} vero integra).
villosula minor vix nervosa. Pedunculi axillares solita
ri uniflori. Corolla sanguinea villosula. Calycis
lobula lanceolata, integra villosa. Anthera quadrata
connexa supra stigma. Stamina longitudine corollae capsula
molliscula baccis amula

integerrimoque
foliis ovatis serratis subvillosis laciniis calycinis integris
corollisque villosis pubescentibus laciniis ^{integerrimis} labii superioris
indivisa

Scandens Columnea Per. S. V. Gaegu. Am. ^{pub} Hort. V. B. * 748.

Columnea scandens, phoeniceo flore, fructu albo Plum. gen. ii. 89. fig. 1.

~~Rapunculus fruticosus, foliis oblongis integris villosis et adverso setis, flore purpureo villosis, Koen. japon. bot. 1. p. 157. t. 100. fig. 1.~~

β. Columnea scandens, flore lutescente fructu albo Plum. gen. 20.

Habitat in Martineis sylvis.

~~Caulis scandens, adnatis angulatis, caulis repens et gemulis ramiulis longis felleformibus, ovatis, glabris, oppositis, hirsutis.~~

~~triangulatis ferrugineis crispis felle empositis, superne villosis, folia opposita petiolata ovata, petiolis acuta integerrima acuta, sub coracea arena subtus pallidiora utraque pulvis sanonibus adpressa.~~

~~Pedunculis axillaribus solitariis, unifloris, foliis brevioribus sed hirsutis.~~

~~al. folia serrata in Gaeguini. uti et in Cameruni si meo tenaci nec laciniis ad basi hirsuta Calycis an meo cythru, nisi laciniis hirs.~~

~~foliolis Calycis fo laciniis lanceolata pilosis margine apicibusque per marginem longioribus et brevioribus angustioribus basi laciniis brevibus lanceolata utraque acuta. Corolla calycis multo longior extus~~

~~phoenicea labium superius bifidum laciniis interne longioribus lateribus lanceolata obtusa~~

~~foliis ovatis villosis integerrimis, laciniis foliolorum calycinis, laciniis intermediis, auriculatis, collis pilosis, labio superiore bifido integro~~

Columnea scandens foliis ovatis acutis integris subvillosis; laciniis calycis integris corollisque pubescentibus labio superiore indiviso L. Sw. prodr. obt. m. 1499

nitidior folium foliis ovatis lanceolatis villosis denticulatis; foliis caly-
cibus eis laciniatis, corollis villosis, labio superiori bipartito Sw. prod.
pag. 94.

Habitat in Jamaica 5

Caulis radicans angulatus radiculis longis filiformibus, angulatus
puberulis superne pilosis apice hirsuti. Stipulae petiolatae
oppositae, ovatae, integerrimae utraque villosa subtus pallidiora
nerviculae acutae, subovatae avenae. Peduncululi axill-

folia descriptio

ad frondem

referuntur

folia serratis
et integerrimis

vel alia speciei et

diversa calycis

lanceolatis unifloris; hirsuti folio breviori. Calycis foliola
villosa, lanceolata margine et apice sanguinea basi utraque
lacini brevis acuta. Corolla calycis multoties longior
extus hirsuta phoenicea labio superiori lacini
in media indivisa. filamenta longitudine corollae

foliis ovatis villosis integerrimis, calycis foliola basi
annulatis corollis villosis labio superiori lacini inter
media indivisa

hirsuta Col. foliis ovatis acuminatis serratis superne hirsutis, folioli dalycinis
denticulatis lanceolatis, corollae hirsutis, labii superiori bifido
Sw. prodr. p. 94.

Achimenes major herbacea subhirsuta oblique asurgens, foliis
ovatis crenatis oppositis, alternis minoribus, floribus geminatis
ad alas Brown. jam. 270. t. 30. fig. 3.

Habitat in Jamaica. §

Praxineulus fruticosus, foliis oblongis ceteris villosis et
adverso pithi flore purpureo villosis Sloan Ham. 1. p. 157.
t. 100. fig. 1.

vestibulata P

hispida P. foliis ovatis obtusis denticulatis hispido-hirsutis, folioli calycis
lanceolatis integris pilosis; caule piloso scabro - in prodr. par.

94.

Habitat in Jamaica 5

Pol. scabra Banks herb
stellata Loursine