

# Polutea

1. arborescens C. arborea, folioliis obcordatis
2. cuneata C. fruticosa, folioliis cuneiformi-obcordatis, venis illigebis obtusis minimis
3. Poirichii C. fruticosa, folioliis ovatis, venis illigebis elongatis adspendentibus
4. frutescens C. fruticosa, folioliis oblongis emarginatis, subtus sericeis
5. perennans C. herbacea, caule sulcato folioliisque ovalibus vellosis, ramis axillaribus approximatis
6. herbacea C. herbacea, folioliis lineariibus glabris

Polutea ultima est planta dubia a monte videe folioliis byzigi absque emarginatione  
subtus punctatis vide Mscrpt spes. Paris. observ.  
inter ultimos Hedyf. habitat forte in India orientali. Pedunculis axillaribus  
folioliis demum longioribus

penduli florum Colutea foliis oblongo-glabris, racemis <sup>axillaribus</sup> ~~terminalibus~~, calycibus her-  
tis pendulis

Habitat in India herb. Fuss. 5

Caulis fruticosus. Rami glabri, angulati. Folia ciliata 10. unguicu-  
laria, mucronata, opposita et alterna. Stipula lanceolata membranacea flava. Pedunculus axillaris, inter flores, uti calycis nigro-vellosi. Bractea lineares, flavae. Vexillum carinae majori, ala magnitudine carinae. Filamentum 10. distinctum. Germen glabrum. Stylus apice barbatus.

1 arboreo P. arborea, foliis obcordatis. Lin. 1. V

Colutea Dod. pempt. 704.

Colutea vesicaria Bauh. pin. 396

Habitat in Italia et G. Nabonensi

Caulis teris, villosus levis. Folio quadrifido: foliola opposita ovalia  
emarginata basi acuta pollicaria interiora parva minora subtus  
pelosissima. flos <sup>trigynus folium</sup> racemi axillares pauciflori. Flores alterni.

4. 5. flavi. Legumen oblongum utraque acutem glabrum  
hipula ovata

arboreo P. arborea, foliis ovali obcordatis, vexilli gibbi abbreviati

2 *Cnenta* Q

*Fructuosa*, folioli cuneiformi - oblongi obcordati, venelli  
gibbi obtusi minimis - Hort. kew. 3. p. 88.

*Colutea orientalis* Mill. Diet. Lamenth. Enc. 1. p. 353. Roth fl. germ.

*Colutea humilis* fructuosa, folioli obcordati; canno apice truncato. Scopoli ex herb. 2. p. 23. T. 12

*Colutea cneuta*

L'Herit. Supp. N. t. 2. T. 41.

Habitat in monte. T

Caulis fruticosus altitudine

Tota glabra. folia 4 vel

quinque paja: foliola petiolata, opposita vix unguiculata, ovata  
min, mucronata, glauca viridia. Nerviola minuta. Pedunculi  
axillares solitarii 1-5 flori. Calyx campanulatus, uti pedicelli ad  
superiorem partem pilis raris et brevibus. Legumen oblongum  
glabrum. Semen 1. aut 2. reniforme

*Colutea orientalis* flore sanguinea. coloris lutea macula notata  
Tournef. Her

culta

9 Pocockii C fruticosa, foliis ovatis, venis gibbis elongatis ascenden-  
tibus Hort. kew. 3. p. 55.

Colutea 4<sup>ta</sup> Mill. Det.

Colutea halepica La Martia Enc. 1. p. 353

Colutea procumbens L. Hort. stup. N. Tom. 2. t. 42.

Habitat in oriente 5

Puber. caule tereti, ramulis cinereis vellosis. Folia 7<sup>jugis</sup>: foliola  
oblonga, petiolata opposita, semunquicilaria, mucronata, cuspiscula  
avenia, pediculis armatis sulis ramibus adpressis adpressis. Stipulae  
lanceolatae parvae. Pedunculi 1<sup>per</sup> biflori

4 frutescens & fruticosa, folioli ovato-oblongis <sup>emarginatis</sup> Lin. Spici. pl. pag. 1095  
; v.

Raj. hist. 1720. pl. 3.

*Colubea otheopnea*, flore purpureo Breyer. Cent. 70. t. 29. mill  
4c. 99.

Habitat ad P. b. Spei

Caulis teris teris cinere villosi. Folia 7 juxta. foliola opposita, semi  
unquiculana, oblonga, emarginata, extropium minus, subtus cinere  
villosa. Stipula ovata. Racemi axillares, pauciflori. Calyx  
campanulatus cinere viridis. Corolla magna purpurea

Frut. & fruticosa, folioli oblongis emarginatis subtus sericeis

perennans? herbacea, racemis approximatis, folioli ovalibus Murr. in  
Com. Gott 1774. p. 30. t. 7.

*Polutea perennans* herbacea, folioli ovato-oblongis Saigu. enim  
Herp. vind. p. 311. hort. 3. 4. 3.

Habitat in Africa

Caulis erectus, sulcatus, villosus simplex. folia 7 juxta foliola reticulata  
villosa <sup>pubes</sup> pubescentia <sup>et densa major</sup> subcinerea, supra glabra, oblonga, subopposita, semina  
guiculana <sup>vix mucronata</sup>. stipula subulata semina <sup>racemi</sup> racemi  
axillari <sup>supremis</sup> erecti caule altior. pedicelli <sup>versus</sup> summitatem  
pedunculati <sup>communis</sup>, frequentes <sup>parvi</sup> capillares. Bractea setacea  
ad basin pedicellorum. Calyx villosus subcinereus. Legumina pendula  
secunda, ovalia, glabra, utrinque acuta, compressa, unguiculana

per. ? herbacea caule <sup>sulcato</sup> foliolisque ovalibus villosis racemis axillaribus appo  
ximatis

*Polutea fistulosa* caule herbaceo, folioli ovatis complicatis <sup>subtus</sup>  
pubescentibus Act. obj. 3. p. 407

Spontanea

- 6 herbaea Q. herbaea, folioli linearibus glabris. Spec. pl. p. 1045\*
- Colubea annua, herbaea racemis distantibus, folioli linearibus  
Murr. in Com. goth. 1774. p. 40.
- Colubea africana annua, folioli parvi mucronati, vesiculis  
compressis Com. hort. 2. p. 07. 8. 44.
- Colubea africana, vesiculis compressis, flosculis atro rubentibus  
Volvi. nomb. 110. t. 110.
- Habitat ad Q. C. b. p. 17 O B
- Caulis herbaceus pedalis striatus, glaber, uti tota planta. Foliole  
6. 8. p. 2. linearis cuneiformis, opposita unguicularia, interiora mucronata  
emarginata. Stipula lanceolata. Racemi axillares solitarii folio longior  
pedicelli alterni per pairs approximata. Flores secundis nutantes  
Calyx ovale compressum unguiculare basi acuminatum. S. trispermum



*Op. Lymnomenoides* C. foliis glabris lanicolatis obtusis e ner  
so acuminatis Scop. Del. inf. 3. p. 22. t. 12  
Habitat in Bahama 0

non erdi an Galega potius