

Combretum

mucronatum Combratum foliis oblongis acuminatis mucronatis glabris racemorum
compositorum oblongis abbreviatis, fructibus obovato-subrotundis.

Habitat in Guinea Thonnig 5
Rami teretes pubescentes. Folia petiolato, opposita, oblonga bipollicia
rara, oblonga, integerrima, subnitida, supra vix venosa subnervosa, subtus
tenuiter venosa. Racemi axillares et terminales; ^{mitis me} folia sub singulis
pedunculo parvati, unguiculara. Pedunculi omnes pubescentes;
parvati bipollicares, patentes. Flores copios, ^{minuti} parvi. Stamina coot
la longiora. Germina et calycis ope lenti villosi. Stigma quadripartitum,
unguiculari, stramineo nitido: alio denticulato.

mucronatum Combratum foliis oblongis acuminatis mucronatis glabris
racemorum compositorum oblongis abbreviatis, fructibus obovato-subrotundis.
Habitat in Guinea Thonnig. 5

Adansonii Convolvulus.

Habitat herb. Lus.

Raulis repens? viliis vasis ad presens. Folio petiolata, fere tri-pollicaria, lineari-lanceolata, sagittata: auriculis lineari-lanceolatis, ^{duo oppositis} acuta, integerrima, glabra, avenia Petiolus sesquipollicaris, glaber. Pedunculi axillares, solitarii vel gemini, recurvi usi flori, longitudine petioli, versus medium bractea duo, subulata. Flores pollicarum. Calycis foliola, unguiculata, ovata, obtusa, tuberculis aliquot ad presens, obtusa, glabra, uti Corolla.

Caxum Combretum foliis oblongo subrotundis acuminatis subtus pedunculatisque ferrugineis
Combretum Caxum fructu laxo den. L. V. p.

Habitat in America meridionali ad v. Rohr

Racemi teretes, superne ferrugineo pulverulenti

Folia petiolatis, opposita, sessili, pollicaria ovato-oblonga, acuminata, obtusa
sinuata, basi acuta, integerrima, glabra, vix venosa, supra nervosa, subtus
e punctis minutissimis vel mesopunctis ferruginea.

Racemi axillares, oppositi, solitarii, pedunculati, patentissimi, foliis longioribus.
Flores copiosissimi, reflexo-patentes. Pedunculi ferrugineo-purpurei.

Calyces et germina ferruginea. - Squamosa

Decandrum Combretum foliis oppositis alternisque, floribus decandris
Combretum decandrum, foliis alternis; floribus decandris Jacq. tem
hist. pag. 104

Habitat in Carthagena sylvis & ex herb. De Linn.

Trunk infirmus ramifus. Rami tereti cortice cinereo glabro, ^{sec}
^{apice densi} foliis ^{terminalibus} ^{fusis} ^{purpurascens} ^{villoso} ^{pubescentia}
^{haec} ^{est} ^{moles} ^{folia} petiolata, alterna vel opposita lanceolata elliptica, mem
branaea, integerrima glabra, obtusiuscula venosa (in mea mini
me nitida nisi subhis ubi pili copiosi ⁱⁿ ^{axillis} ^{venarum} ^{ad} ^{costam}

Petiolus brevissimus.
Pedunculi axillares et ~~terminales~~ ^{longitudinali} longitudine foliorum
^{lateralibus} simpliciter, ^{terminalibus} ramif. Flores parvi parvi. Pedicellus
tetragonus floe brevior crispus. Soleolum petaleum ad basin fraguli
ubi pedicelli et Pedunculus pubescent

Stamina dodecim numerari

a Jacq. videtur differre floribus minus copiosis dodecandris staminibus
13. Species brevioribus foliis oppositis alternis

glacium Combretum spicis ^{Compositis} axillaribus trifidis, foliis ovatis egrynina

^{si} Habitat in India orientali König 5.

Rami teretes, tortuosi, cortice cinereo.

Folia petiolata opposita, venosa, bi pollicaria, glaucis vinda

Pedunculi axillares solitarii interdum gemini vel terni, trifidi
bi pollicares. ^{in ax.} Flores contigui, horizontaliter patentes sp.

Calyx unicoloratus. laciniis lanceolatis, reflexis fundo pelosiphis

Semina oblonga pallida, unguiculata, alio 40 membranacea

Arbor malabarica folio Sambae Arabum tetrapteros s: quadri
pinnato fructu, quatuor foliaceis secundum longitudinem, exten
sibus alio donato Plukn. alm. pag. 42. tab. 263. fig. 3.

an species Terminalis ulterius inquirendum

20 *aphylla* G. caule aphylo spinis compositis, floribus lateralibus
solitariis calycibus bipartitis

Habitat in Canariis

Rami ^{profunde} striati sparsi purpurascentes ramuli alterni est foliis
spinis ^{ramosis} ^{scandentibus} ^{et} ^{conspicuis} ^{ut} ^{rami} ⁱⁿ ^{aculeum} ^{depressi}
Sei ⁱⁿ ^{inde} ^{striati} ^{versus} ^{apicem} ^{villi} ^{ut} ^{conspicuis} ^{ramoribus}
Spinae laterales ramulorum alterni, inferiores utraque spina
lateralis versus basin ^{et} superiores simpliciter. Bractea parva ovata
acuminata rigida sub singula spina ^{terminali} ^{partiali}. Pedunculi
laterales in spinis ^{terminalibus} ^{brevis} ^{cinereis} Calyx bipartitus lobis
superior brevior ovata inferior oblonga concava. Verruculae
subrotundae extra sententiam uti canna.

Spinae ^{senata}

aculeatum Combretum foliis oblongis subtus villosulis, ramis aculeatis, racemis simplici-
bus paucifloris, fructibus subcordato-oblongis

Habitat ad Senegal herb. Tussis

Rami teretes, purpurascentes, inferne glabri, superne cinereo tomentosi; aculei pauci,
teretes, rectiusculi, sicut unguiculares, subtomentosi cinerei. Ramuli ~~et~~ axillis
aculeorum, foliosi et floriferi, inaequali, pollicares. Folia petiolata, alterna, ungui-
culata, supra glabra, subtus villosula, subrenosa, oblonga, integerrima. Petiolus
brevissimus. Racemi ex apice ramulorum, sicut semi pollicares, 6-7 flori. Fru-
ctus subcordato-oblongus, quadrilobatus: Ala subtus renulata.

frondosia Pombretum foliis oblongis utrinque obtusis glabris, racemum ^{compositum} ~~ovatis~~ longitudinali
racemulorum, fructu oblongo.

Habitat ad Senegal herb. fusisti 5

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, alterna, tripollicaria, lato-oblonga, glabra
integerrima, supra oblique neriosa, subtus venis sine venosa, utrinque obtusis
floratis ovatis, acuta, margine et subtus in costa villosa, unguiculata, hala
mi axillares, compositi, patentes pini, 2-3 pollicares, solitani. Pedunculi par
uales oppositi, pauciflori subtomentosi, uti germina patentes pini. folium
petiolatum ad basin inguli, longitudine racemulorum. Calycis subampulati,
margine villosi. 8 lobes coriacei, uti stamina. filamentis 8, corolla longiora.
Fructus oblongus, 4 alatus, ut semipollicaris.

4 acuta, marginis et subtus in costa villosa, unguiculata.

obtusifolium Combretum foliis obovatis obtusis glabris, floribus
paniculatis Act. sci. h. n. par. 1. pag 108
Habitat in Amer. merid.

mit. ~~synonymum~~

obtusifolium Combratum

Habitat in sylvis Guano Richardi

Arbor 20 pedali: rami compressi tetragoni, scabru sculi canescentes. Folia
petiolata, opposita, 2-3 pollucina, oblonga, basi versus obscure angustata
acumine brevissimo terminata, integerrima, glabra, arena, subtus nerva
utroque impunctata, rigidiuscula. Pedunculi axillares et terminales
interdum gemini in altera axilla, alter brevior. Spica compressa pedun-
culi ^{terminari} proxi. Petala 2 minima alba. Stamina 8. Stigma simplex

Triplicatum Complanatum

Habitat in tara hest huf.

Rami glabri, cortice cinereo. Solia petiolata, ternata, pithamosa, elliptico-lanceolata, acuta, basi obtusa, integerrima, glabra, supra nitida, avenia, nervis immersis, subtus pallidiora, arcuatum remote nervosa, inaevo tomentosa. Petioli purpurei, vix unguiculares. Spicis ternales, racemosa, inaevo tomentosa. Flores parvi, conferti. Emulus pollicaris, tetragonus, obtusus angustus.

paniculatum Combricum

Habitat Cayenne herb Richardi 5

Rami & vertes, canescentes, ope lentis villosi. Folia opposita, petiolata, 2-3 pollicaria
ovato-oblonga, seta acuminata, glabra, excepto costa utroque et nervi subtus,
supra nitida, avenia, levia, subtus eleganter venosa. Spica axillares
& terminalis, racemosa, ut in obtusifolia. Pedunculi ferrugineo tomentosi
uti germes. Flores minuti. Calycis canescentes

rotundi folium Compositum

Habitat in Gambia occidentali herb. Ruk. 5

Rami glabri, tetragoni. Folia petiolata, opposita, 3 pollicina vel ultra, ovata
oblonga, acuminata, integerrima, subtus canopu, utrinque punctis in pressis, co
nspicuis, lucidis. Spica secundae. Calyces unguiculares, reflexe. La
bricis ovato. Involucris oblongis, semipollicinis, 4 alatis. Stamina longis
sima, purpurea

Cinereus Combretum

Habitat Capno herba Martii &
Rami cinerescens. Racema axillares. Decomposita

habes

grandiflorum Combretum

Habitat herb. la Manthe Cayenne 3

Rami glabri, folia petiolata, opposita, ~~la~~ sive pollicaria, elliptica, vitta
germina, glabra, venosa, subnitida. Petioli pollicares. Racemi superne, infer-
ne ramosi, palmatis. Bractea foliacea

Handwritten signature or initials

ovale folium Combretam

Habitat herb. La Mantii Cayennae.

Rami canescentes. Folia petiolata, opposita, bipollicaria, oblonga, subaeuminata,
glabra, axillo armato subhis punctulata. Racemi axillares, saepe gemini,
alter simplex, brevior, alter compositus, foliis longior, terminalis compositus.

Combrethum

Habitat in Domingo herb. Desfont. 5.

Rami glabri, teretes. Folia petiolata, 2-3 pollucina, opposita, oblanceolata, acuminata, vitta supra nitida, obscure lineata, subtus venosa, utrinque glabra. Racemi axillares et terminales, simpliciter vel bosi, rami quatuor. Flores parvi, glabri.

nitidum Combretum

Habitat in St. Domingo Herb. Guj.

Rami teretes, cinerei. Folia petiolata, opposita, bipollicaria, ovata, glabra, venosa,
obtusis, emarginata, supra nitida, oculo armata, punctis albis fittis, glandula?
flavescent in axillis nervorum. Rami axillares et terminales, decomperti,
rami patentes. Flores copiosi, glabri, undique versi. Stylus semi-pollicaris,
oblongus.

rotundifolium Compositum foliis subsessilibus subrotundis utraque obtusi
mucronis abrupto acuta grandiflorum Act. Soc. h. nat. par.
p. 108.
Habitat in America merid

puberulum Compositum ramis rachibus germinibusque nudo pubescentibus
foliis ovatis setosis acuminatis, spicis paniculatis aesti-
peris. n. Par. 1. pag. 108.
Habitat in Am. merid.

michi ignotum

Secundum
1. ~~Cassia~~ Compositum specii Cassia secundis Lin. I. V. p. 359. Jacq. hist. 4. 260 fig. 26
Plant. Amer. pag. 1304

Habitat in America meridionali et

Arbustiva 12 pedalis ramis terribus longis pinnis. ^{glabra} ~~opposita petiolata~~
~~integerrima, glabra, venosa, petiolata, opposita, quadrifolliana, in fo-~~
~~suprema minoribus. Pinnis compositis, lanceolatis, pinnis longioribus~~
Duae foliolis ~~antioribus pubes.~~ ~~Quinquet. foliolis~~ ~~foliolis~~ ~~copiosissimi vnde flavescen-~~
~~ter~~ ~~calycis~~ ~~culo~~ ~~armato~~ ~~laeviss.~~

foliis ellipticis ovato oblongis pinnis
secundis simplicibus

purpureum Combretum ^{Combretum} foliis ovato oblongis calycibusque nudis, specie sim-
plicibus secundis.

Habitat in India Orientali, dedit Dr. La Mart &

glaberrima.

Rami teretes, bracteati.

caulis petiolata, opposita, tripollicaria, integerrima,
subviciata, apice parum attenuata, alba sub specie
pollicaria, acuta.

caudiculi oppositi, patentissimi, subhamis, tetragoni.
multiflori. Flores conosi, spatii. pedicelli tetragoni

calyx ~~vs~~ ^{vs} seminiferis alaribus & raris setis ad basin juncti

calyx ^{floris} ~~etiam~~ paniculatus glaberrima

Corolla purpurea.

filamenta Corolla duplo longiora

Semen subrotundum, retusum, lavi finium, auro rubes.

Combretum collinum floribus decandris specie laxo
paniculatis la Mart. Gen. l. p. 2. pag. 227
Gustavia coccinea Sonner. id. 2. p. 247. t. 129

afrikanus Connanus
foliis ternatis lanceolato-ellipticis venis subtis protuberan-
tibus

Connanus afrikanus foliis ternatis fol. ovatis utraque subt
acutis subtis nervosis, floribus paniculatis monogygni

La Mart. Enxet. Tom. 12. p. 95
Connanus afrikanus foliis trifoliatis petalis e barbatis, flori-
bus paniculatis Par. Tab. 221.

Habitat in montibus terra Leone 5

Rami teretes, glabri. Folia petiolata alterna: foliola
petiolata, palmata et ultra, acumine longe termi-
nata glaberrima, supra nervi et veni transversi copios
subsimplexibus immersis, subtis costantibus integri-
me.
Petiole partiales infra foliatis incrassati nervosi.
Panicula terminalis patens

Decandrum Combratum foliis ovato-oblongis oppositis, ramis spinosis, speciebus
compositis floribus decandris
Combratum decandrum foliis alternis, floribus decandris Jacq.
herb.

Habitat in sylvaticis Carthago amenior ²⁰
Frutex infernus, ramis se sustentans ad ²⁰ pedes scandens.
Rami longissimi. Culci pubescenti obtusi, leviter recurvi semi-
pollicares. Sparsi propositi in ramis spinosis. Folia ovato-oblon-
ga, integerrima nitida petiolata, alterna (nisi opposita)
bis. 3 pollicaria. Spicae laxae semipedales. uniter 10 in proculo
pedunculo communi ad apicem ramorum. flores numerosi
rami Jacq.

Casei

~~Casei~~ ~~Combreum~~ ~~specie secundis~~ Loebl. d. 300 LV. p. 359. Sw. obj. pag. 143 x
Gaura fruticosa scandens, foliis oppositis Loebl. d. 240 * p. 320

Combreum floribus octandris, specie latius secundis Gayo Amer. 14

Habitat in America meridionali: 5 glabra purpurascens

Caules frutescens, teres; ramis superis longis, obsolete quadratis, stemulis
subscandentibus. Folia opposita, oblonga, ^{subtus} ^{reticulata} ^{oculis armatis} ^{serugineo punctata}
lucida, brevis petiolata, glabra integerrima. Flores speciosi in ramulis

4 vel ovale acuminata
oppositis, subsessile Loebl. d. 300

~~Folia acuminata mucronata patentissima, subtus punctis flavescens
bus numerosissimis adpresso.~~

descriptio
ad speciem
cum peti-
net

~~Spica axillaris horizontalis, opposita, saepe gemini ex singulis
artibus, longitudine fere foliorum. flori parvi copiosi. bractea lineata
ad basin florum. Germina et Calyx squamis minutis numerosis adpresso
fere ut in Cistisquamoso~~

Cum in Aethi-
est secundum
1830 ad 5 Richard

Spica axillaris opposita patentissima. flori copiosissimi
calycibus ferrugineo squamosi
simplicibus

glauium C. foliis elliptico-ovatis, specie ramose

Habitat in India orientali hong.

Nam. ~~fructu~~ glabri, cortice cinereo. Folia petiolato
opposita bipollicaria vel minor, elliptico-ovata vel oblonga
integerrima venosa glabra glauco viridia, ~~interna~~ obtusa
interdum acumine brevi obtuso. Spica axillares opposita
interdum geminae foliorum longiorum rami oppositi paten-
tissimi. flores parvi fundo villosi fructus fructus subrotun-
di. flavescent nitidi alii 4 membranacei

umbellata Pomax

Habitat.

Caulis palmatis herba ceteris ~~decumbens~~ ramosis pilosiusculus
Folia opposita ~~petiolata~~ spatulata acuta, unguiculata
numerosi albedi ~~pet~~ utrinque pilosa in axillis, vel siliato ^{pubescentia} sub serrato
pediculi basi conati ~~sup~~ ⁱⁿ ~~ramulis~~ ^{ramulis} in axillis
Pedunculi terminaliter, 6-8. villosi longitudine foliorum uniflori
Calyx turbinatus fimbriatus pilosus