

106. Commelina. Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala. filam. 2-3. Sterilia, glandu-
lis cruciatis instructa. caps. 2-3 locularis

axillaris Commelina foliis linear-lanceolatis, vaginis ore nudis, floribus axilla-
ribus plurihus.

Habitata India orientali: herb. Roth. prope fossas Kioni; herb. Roth.

Caulis laxus, tenuis, striatus, glaber. Folia elongata, spithamea, lanceo-
lata, angusta, nervosa, basi parum attenuata. Vaginae breves, amplo, membra-
naeae. Flores axillares, semper florentes; 2.3. florentes pedunculati:
pedunculo vagina parum longior

a Tridesc. axillari differt caule non repente, foliis longioribus, vaginis
minime ciliatis

notae ad Tridescantiam referenda

angustifolia 1. * Floribus involucriatis
Commelina foliis linearibus lanceolatis glabris, vaginis subultra-
tis, involucri cordatis conduplicatis.

Commelina angustifolia; assurgens, debilis, glabrescens,
dipetaloides: foliis linearibus lanceolatis, acutis, basi planis;
bracteis ~~pedunculatis~~ ^{pedunculatis}, solitariis, extensione brevi cordatis
Michx. fl. bor. am. 1. p. 24.

Habitat in campis Carolinae. Richard

minus simplex Similis ^{brevis} praecedenti, sed folia angustiora. Vaginae ca-
lam ante amplexantes: involucria longius pedunculatum
conduplicatum. Corollae subaequalis.

Sylvestris plerumque erecta, caulibus simplicibus usulis,
vel ab eis simpliciter ramosis. Culta vero solito pro-
sumitur. Flores caerulei. Semina cylindrica Michx.
l. c.

Accedit ad Plukneti Synonymum a Linnaeo ad Com. virgi-
nicam relatum

paniculata C. folus ovatis petiolatis basi ciliatis floribus panicu
latis ^{aiutu}

Habitat in arabe Forskål

Sol maxime affinis benghalensi at folia longiora aiutu
minime undulata floresque paniculati. bractheolae vagi
nantes, paniculae ciliato ramis divariati.

Forsk pag-12. no 35

add. script

Longifolia 2

Comelina foliis lineari-lanceolatis sessilibus glabris, vaginis
subciliatis, involucri tubis cucullatis turbinatis

Comelina longifolia; Corollae subaequalibus, foliis lanceolato-
linearibus, pedunculis longiusculis Lamarck. Illustrationes 1.

p. 129.

Habitat in Tava. Comerson. Ex herbario Lamarckii

Caulis gracilis, glaber. Folia bi-Tripolitana, angusta.

Vagina semipollucaris, ^{paucum amplexum} ~~caulem amplexans~~. Pedunculus

terminalis, solitarius, ^{brevissimus} ~~involucrium condatum, adaxilem~~

^{vage} involucri non pilosum villosum, ore latis margine membranaceum.

Corollae subaequales

mollis *Commelina* foliis ovatis petiolatis villosis, involucrium femoribrevi-
tium

Commelina mollis Gaillon coll. 3. pag. 235

Habitat ad Caraciam

Caules bipolares, geniculati radicantes prostrati caespitii cala-
mi, teretes, villosi ramosissimi. Folia ovata, acuta integerrima
utrinque villosula petiolata alterna 3-4 pollicaria mollia subtur-
pallidiora Petiolus ciliatus in vaginam amplexicaulem dela-
tata villosam. Involucrium brevissime pedicellatum, femoribrevi-
tium obtusissimum cornuans compressum subbiflorum floribus
longicaulis Gaillon

longicaulis 3. Commelina ^{linearis} foliis lanceolatis sessilibus subpilosis, involucri ovatis
conduplicatis, caule repente

Commelina longicaulis corollis subaequalibus, foliis lanceolatis sessilibus
glabrescentibus, caule repente, pedicellis geminis filiformibus geni-
culatis Gay. collect. 3. p. 234. Ic. rar. 2. t. 294

Habitat ad rivulos et in humidis ad Carmacas &

Caules longissimi, ramosissimi, crassitie pennae columbinae, teretes,
geniculati, glabri. Folia tripolliciana, angustissima, margine laevio, utrin-
que variter hirsutata. Vagina ore ciliata. Pedunculi ~~axillares~~, solita-
ria, semipollicares, filiformes, erecti. Pedicelli graciles, erecti,
geniculati. Flores parvi. Calycis foliata ovata, pallida. Petala coen-
cea, subrotunda, ^{subaequalia}, nectari filamenta. Gay. l. c.

adda dactyl e Gay.

Daffafa *C. folius crato-oligis*, involucri nullo, pedunculi capillari
bus Burm. fl. ind. pag: 10. tab 7. fig. 2
Habitat in Gambia Coromandel

non vid.

umbrosa
hustella
hustella

4

Commelina foliis lanceolatis petiolatis cauleque erecto pilosis, ~~vaginae lobata~~
^{involucris} ~~lis~~, ~~spathi~~ ~~sessilibus~~ lateralibus terminalibusque sessilibus ^{lobis duplicati}

Commelina longifolia; stricta et latior, tota conspicua pubescens:
foliis longissime lanceolatis; vagina ad faucem rufa barbatis simis:
bracteis subtiliter subsessiliter aggregato-terminalibus: calycis
subae qualiter tripetaloides. Mich. flor. bor. am. 1. p. 23.

Habitat in umbrosis Sylvarum Virginiae et Carolinae. Richard
Caulis bipedalis et ultra, crassus, strictus, ^{ramosus ut} scabriusculus.
quadripollicaris vel subsemipollicaris, remota, attenuata, margine
scabra, utrinque pilosa, minime vero ciliata. Vaginae satis ferru-
gineo-ciliatae. ^{in involucribus} spathae cordato-falcatae, ^{um} vix semipollicares,
coloratae, ^{um} glabrae. Corollae coeruleae, ^{um} subaequaliter
^{temina} compressa, ^{Michaux.} non haust.
Nomen longifoliae ^{haec} potius competit quam ulla ex aliis, sed
hoc nomen ^{plantae} pluribus speciebus diversa jam dudum impositum
Lamarck

Publutea Texa ~~*publutea*~~ ~~*consolidi*~~ ~~*setacei*~~ ~~*stapo*~~ ~~*uniflora*~~ ~~*conjointa*~~, *protha* *tubi*
Cognoscere La Mark T. Eni: nos. 109
Habitat in Cal. Mexi

attenuata 10 Commelina foliis linear-lanceolatis glabris, vaginis ciliatis, involucri
cordato-lanceolatis attenuato, caule repente.

Habitat in India orientali. König

Caulis pedalis, ramosus, filiformis, glaber, striatus, angulatus, glaber,
geniculis inferioribus radicantibus infra. Palea 3/4 sesqui pollicia-
ria, sessilis, attenuata, glabra. Vaginae unguiculares, superne
ciliatae. Pediculi laterales et terminales, solitarii semipolli-
cares. Involucrum pollicare, valde attenuatum, latere interno
sa villosum. Corolla subaequalis, coerulea.

pacifica. *Q. foliis lanceolatis* ^{lesplibus,} (involucris cordatis subciliatis caule
erecto)

Habitat in Tongatabu

Commelina signata Hoff. Prodr no 26

Habitat in Tongatabu

Vagina tubulosa subciliata. folia acuta ses

nudiflora O corollis aequalibus, pedunculis capellanibus, foliis linearibus,
involucro nullo, floribus diandris Lin. Mant. 1777. p. V. pag. 94

Ephemenum phalangoides maderapratense minimum foliis
perangustis, perfoliatis Plukh. alm. 135. T. 27. fig. 4.

Habitat in Graecia orientalis aridis gramenosis O

Radix fibrosa. Caulis debilis palmatus glaber, basi decumbens, erectus
subramosus. ^{f. tri}folium brevissimum integerrimum basi vaginantis

vagina breviter ciliata. Pedunculi ^{distichales} aequales longioribus 3-4-6. pedicella
tenuissimis absque involucro. Calycis foliola ovata lanceolata

involucro breviora. Petala 3 ovata. Nec tamen filamenta 3. corpusculum
laevidentem

pilosula 9 Commelina foliis linearibus lanceolatis, vaginis involucribus quae
ciliatis. 7

Commelina pilosula; peruviana, diffusa, foliis lanceolatis vaginis
et involucribus ciliatis Aut. Bot. h. n. par. 1. p. 106.

Habitat Cayen nas.

Bers Kollae.

Commelina foliis ovato-oblongis sessilibus, spatulis peruviana
 podunculis
 habitata in Arabia Persia
 Eculi nemorosus, Sinesis glaber. Colia in qua dicitur medicina, alia
 Attenuata, subundulata, marginata glabra, striata multivenosa
 glabra Vaginae tubulosae, semiprobosciformes, glabrae, in medio
 costae, glabrae. Spatheae cordato-falcatae. # Dentes 8-10.
 H. mucosa angustata, 8-12 ciliatis
 raso ciliatis

fasciculata 8 Commelina foliis lanceolatis, involucri cordatis, caula adscen-
dente +

Commelina fasciculata; foliis lanceolatis acutis, vaginis ciliatis,
caula adscendenti, radice fasciculata Fl. per. l. p. 44. t. 72. f. 6.
Habitat in collibus atavis Lima 7

Radix tuberosa, fasciculata; tubera oblonga, pendula, lanuginosa.
Caulis striatus, pilosus; pili decidui. Folia angusta, carinata,
vultus magis pubescentia; villis deciduis, novemnervi. ^{velli} Pedunculus
duo, villosi, alter tenuis longus, uni-biflorus, alter crassiusculus,
quadri-quinque florus, brevis. Petala coerulea. Calyx albus,
Petala coerulea, aequalia. Fl. per. l. c.

quomodo involucra
confer. ead. cum 79

Commelina hispida corollis ~~egualibus~~, foliis ovato-lanceolatis obtusis hispida
marginibus scabris, pedunculis ^{erectis} ~~pubescentibus~~ fl. Penn. 1. pag. 43. tab. 73. fig. 1.

Habitat in Pennis collibus

Radix fibrata. Caulis sesquipedalium, erectus, teres, articulatus, striatus pubes-
cent. Folia obtusa, utrinque hispida, 11-17 nerva, margine scabra, ma-
jora bipalmata. Vagina membranacea, ore liliato, antice linea villosa
subpurpurea cincta. Pedunculi ~~erectis~~ ^{erectis} foliariis, oppositi foliis, foliis pen-
to breviores, superioribus serratis. Spatha cordata, compressa, reflexa,
nervosa, hispida, margine ciliato, 4-6 florum. Pedicelli recurvati;
Spatha parva, lanceolata sub papula flore. Petala 6. duo ex exterioribus
obovata, 3 oblongum concavum: interiora 3 maxima pvalis, e margina
ta concava breviter unguiculata. Nectaria 3. stami niformia. Stigma obli-
quum ^{remans} ^{compressa} tridentatum. fl. Penn.

Mirantia *Commelina*

Habitat in India orientali herb. Ind.

Caulis prostratus, vix armatus villosus, vagina tubulosa, int. conditi bre-
viter, villosi, ore pilosi. Folia petiolata, ovato-lanceolata, bipollicia
nervi, salda attenuata, obsolete nervosa, integerrima, glabra. Peduncululi termi-
nales, tenues: pedicelli oppositi, distant ^{sub}es, uniflori. Bractea minuta cu-
cullata, involucrium nullum

articulatus.

Habitus. Caulis herbaceus; Rami alterni. Folia alterna, integerrima,
 margine & aequalibus, tenuissime nervosa. Vaginae tubulosae,
 membranaceae, caule plus minusve ampliores, nervosae, plus
 minusve ciliatae. Peduncululi oppositi-folii & laterales.
In volucria compressa

Compositae
 angustifoliae
 pedunculatae

Compositae foliis lineari-lanceolatis, vaginae involucris condi-
mentis ciliatis
 Compositae pedunculatae, paniculae diffusa, foliis lanceolatis vagi-
no et involucris ciliatis Det. Bot. K. N. par. 1. p. 106.
 Gleditsia Rayana. Richard.
 Similis Compositae pedunculatae; foliis angustioribus; vaginae caulium
 caulis amplexantibus; involucris condi- mentis ciliatis, conduplicatis

paniculata 40 Commelina foliis ovatis ^{sub} petiolatis acutis basi ciliatis, floribus

~~# Commelina com~~ ~~meti~~ ~~noides~~; ramis paniculatis ~~spicatis~~;

~~lateralibus; arista calycis floribus longiore; foliis ovatis~~

^{tuberosa}
Commelina commelina lanceolata Forsk. descr. p. 12.

noides; ramis paniculatis Habitat in Arabia Forsk. hal.

Pauli ramosus. Folia breviter petiolata, sesqui pollicaria,

Dorpk. descr. p. 12.

margine e denticulis minutissimis & cabra, obscure undecim nerva,
oculo armato pili rarissimi ad 3 per sa, ceterum glabra. Pedun-

culi lateralis et terminalis Vaginae unguiculares, amplae,

tenuiter nervosae, ad lentem villulosae, ^{subtilitate} ore ~~nudo~~. Pedun-

culi lateralis et terminalis, gemini, alter longior ^{& magis di-}
vius, sub dichotomi; vaginae unguiculatae ^{ad primam amplificationem;} ~~et sensim minores, cili-~~

ad peduni.

tae. Rami partiales patentes, vagina unguicularis,
ad ciliata ad basin singuli: pedicelli racemosi, interdum

octo, interdum pauciores, unguiculares, neutantes, uniflori.

spatha minuta, ad glabra, ad basin singuli
Pauli in aquis repens Forsk. l. c.

purata Com. corollis aequalibus foliis lanceolatis undulatis, flombus
paniculatis Lin - Mant. p. 176 x

Commelina bracteolata La Mark Enc.

Habitat in India orientali

Caulis repentes prostratus. folia opposita vel unguiculata
horata supra basi cordata glabra vaginae breves
subulata. Panicula terminalis divaricata bracteolis vaginan-
tibus. Nectarii filamenta 3 subulata, corpuscula Gouier
formia apicibus globosis albicanibus

caule repente

umbrosa 39 Commelina foliis ovatis nervosis petiolatis, natiolis ciliatis, racemis compo-
sitis, caule erecto.

Habitat in umbrosis Aschama Guinea Swed.

Caulis sulcatus, angulatus. Folia bipollicaria, ovata, vel ovato-lanceo-
lata, serrata, septem nervia, glabra, integerrima, basi in petiolum
acuminata. Petiolus unguicularis. Vagina tubulosa, lassa, ovata
et unguiculari⁺. Pedunculus terminalis, interdum gemini, foliis duplo

basi pilis rufis brevioribus: pedicelli alterni, distantes, squamis minutis ovatis persistenti-
bus secti.

borbata

micrantha 30 Commelina foliis ovato-lanceolatis petiolatis glabris, floribus saepe ⁱⁿ cymesis,
caule procumbente

Habitat in India Orientali. Ex herbario Pussiaci

Caulis oculis armato, villosulus. Folia bipollicaria, valde attenuata,
obsoleta nervosa. Vaginae internodiis breviores, tubulosae, villosae,
ore pilosae. Pedunculi terminalis, tenuis; pedicelli distan-
tes, sub uni flori. Bractae minutae, obovatae. Involucrum
nullum.

Longifolia Commelina corollis subaequalibus, foliis lanceolato-linearibus, pedunculis conspicuis La Mark T. Enc: pag 129.
Habitat in Java

clata 37 *Commelina* foliis ovato-lanceolatis ciliatis; floribus paniculatis; caule
^{erectis}
Habitat in India Orientali? Ex herbario Gussonei

Caulis erectus, caesi crassitie pennae cygneae, striatus, oculo armato
villosus. Folia spithamea et ultra vagina vix pollicaris, lancea,
ciliata. Panicula patens. Bractee minutae, ovatae, membra-
nae. Calycis foliola tria linearia. Petala venosa. Stamina
tria, barbata. Corpuscula cruciatu.

radiculis *P. foliis* ~~in~~ *caulati* radicalibus, *scapo* *in* *viso* *Burm* *ind.*
Tab. 8. fig. 1.

~~Habitat in~~ *India* *orientali*

non *ind.*

japonica 36. Commelina foliis ovato-lanceolatis undulatis^{glabris}, caule erecto angulato
to piloso, floribus paniculatis Thunb. in act. Soc. Lin. 2. p. 332. +

Habitat in Japonia

Caulis pedalis, sulcatus, apice paniculatus. Folia inferiora digitalia,
superiora polliciana, oblonga, acuta, glabra. Flores racemosi Thunb.
L. C.

Pimelina fasciculata foliis lanceolatis acutis, vaginis ciliatis, caule assurgenti, radice fasciculata fl. Penns. 1. pag. 44. Tab. 72. fig. 1.

Habitat in collibus et arvis hinc &

Radix tuberosa, fasciculata. Tubera oblonga, pendula, lanuginosa. Caulis strigosus, pilosus: pilis deciduis. Folia supernantia, carnosa, angusta, integerrima, novemnervia, subtus magis pubescentia, villosa deciduis. Vaginae ore ciliatae. Bractha cordata, ciliata, compressa. Pedunculis 2. villosis, alter tenuis longus 1-2 florus, alter crassiusculus 4-5 florus brevis. Flores breviter pedicellati. Petala interiora coerulea aequalia, exteriora breviora alba. Gynae 3 oentata in ped.

serrulata 35 Commelina foliis ovato-lanceolatis subpetiolatis margine scabrae venis;
pedunculis lateralibus terminalibusque multifloris, caula erecto.

Commelina serrulata; pedunculis axillaribus sub solitariis mul-
tifloris, foliis lanceolatis margine serrulato-scaberrimis, vaginis
ciliatis Lib. am.

Habitat in Cajenna. v. Rohr.

Caulis striatus, glaber, purpurascens. Folia quadri-quinque polli-
cario, latitudine fere pollicis, attenuata, opa caulis serrulata. Vagi-
nae pollicares, ciliatae. Pedunculi axillares superne
superne, solitarii vel gemini, breves: partiales longiores, urgentes
laeves; quinque- & sex flori: pedicelli breves. Bractae duae, oblongae
aridae, pilosae, ad basin pedunculorum communium, brevis & imae
calycis foliola oblonga, acutiuscula, oculo armato pilis rarioribus
adspersa.

Longicaulis Commelina foliis linearibus subpilosissimis, involucrio ovato

Commelina Longicaulis Jacq. Coll. 3. pag. 234

Habitat ad Caracas 4

gemuli radices repens caulis longissimi ramosisque teretes-
glabri crispis penna columbina, gemulati, virides. Folia
alterna linearis-lanceolata angustissima, integerrima, margini
lanceolatis, utrinque vix, nervula subtilissima nervosa
vagina striata ore hispidula. Petioli axillares solitarii
filiiformes erecti, semipollicares bractea ovata connivente ter-
minata. pedicelli 2. graciles erecti gemulati. Flores parvi. Peta-
la 3 exteriora ovata pallida, interiora conchlea unguiculata subro-
tunda. nectaria 3. muciformia alba pedicello conchlea. Jacq.

non vid.

gigantea 34 Commelinia foliis linearibus; ^{ovoidis.} conduplicatis, ^{vagini glabris} caule erecto simplicissimo,
racemis terminalibus bipartitis, floribus secundis.

Habitat in India orientali. Rottler

Radices longae, crassitie pennae columbinae, erectae, carnosae. Caulis
bipedalis et ultra, striatus, ad articulos geniculos incrassatus, glaber,
uti tota planta. Folia pedalia et ultra, sursum sensim minorae,
conduplicata, remota; [#] vaginae pollicares, ore et margine glabrae.

Duo suprema
spathacea:

Paniculus ^{erecti} ex vagina semipollicari, obtusa, partialis gemini, breves
et post casum pedicellorum denticulati; triginti flori circiter; pedi-
celli alterni, approximati. Capsula magnitudine pesi, nitida.
Flores non vidi.

flava 7x10 ~~capifolios~~ subhloio, foliis lanceolatis canaliculatis serratis longis
Stylis brevibus la. Mart. T. Cuv. pag. 109.
Habitat in Cap. & Mex.
Petala uterque flava, calicis luteo viridula

non vid.

Simplex 33 Commelina foliis linear-lanceolatis, ^{vagi} basi ciliatis, racemo termi-
nali, ^{subimposito} caule erecto simplicissimo.

Habitat in Guinea Test, Thunberg
Caulis spithameus, bi s. trinodis, striatus, glaber. Folia 2 vel 3 in caule,
remotissima, striata, glabra, basi ciliata, uti fessura obliqua vagina
ciliata, attenuata. Punculi terminaler ^{detoni Terni} gemini: pedicelli breves, pau-
ci, spithamei. Spatha ~~vs~~ unguiculari, lanceolata. Flores nudi.

Similis ^{sequens} praecedenti, ad omnibus partibus cyclo minor, racemi simplices, gemini
vel terni, alterni, tri vel quadri flori: pedicelli ^{sed} puniuli et pedicelli capillares.

spirata 32 Commelina ^{subcordata} foliis linearilanceolatis undulatis, floribus racemosis panicu-
latisque, caule repente.

Commelina spirata; corollis aequalibus, foliis lanceolatis undulatis, flo-
ribus paniculatis lin. mant. 176.

Commelina bracteolata; corollis aequalibus, foliis lanceolato-linearibus undulatis subtriangulis, pedunculis paniculatis, bracteolis semivagi-
nalibus Lamarck. Dict. bot. 2. p. 69. illustr. 1. p. 129.

Habitat in India orientali. ~~Wing~~ ad rivulos locis humidibus Wing &
Caulis epithamiae, parum ramosi, glabri. Dolia sessilis amplexi-
caulia, prothecaria vel minor, ^{angustata} acuta, striata, glabra. Vaginae bre-
ves, subciliatae. Pedunculus terminalis, capillaris, flexuosus, late-
saepe purpureo tinctus, teres, laevis. Racemus simplex vel compositus,
tri- quinqueflorus: pedicelli unguiculares, uniflori. Bractea minuta,
ad basin sive guli pedicelli, semivaginata. Nectarii filamenta
tria subciliata, corpus
nectarii filamenta tria, subciliata; corpuscula cuciformia apicibus
globosis albicantibus Wing

No. 177.

Commelina foliis lanceolatis, floribus racemosis
Wing

spirata

Spirata

^{lineari-}
Commelina foliis lanceolatis undulatis, floribus paniculatis.

Commelina ^{spicata} ~~paniculata~~; corollis aequalibus

nudiflora 31 Commelina foliis linearibus, pedunculis lateralibus terminalibusque
submultifloris nudis, caule ^{basi} repente

Ephemerum phalangoides maderaspatense minimum foliis perangustis,
perfoliatum. Pluk. alm. 135. t. 27. f. 4.

Commelina corollis aequalibus, pedunculis capillaribus, foliis linearibus
lanicollatis, involucrio nullo Lin. fl. regl. 31.

Commelina nudiflora; corollis aequalibus, pedunculis capillaribus,
foliis linearibus, involucrio nullo, floribus diandris Lin. Mant. 177.

Habitat in Indiae orientalis aridis graminosis. Höniy. 0

Caules ^{te, dein erecti} basi repentes, palmarum vel spithamei, parum ramosi, debiles,
folia bi-tripolliciana, ^{hirsutia, remota} angusta, acuta, glabra. Vagina brevis, ciliata.

Pedunculi foliis longiores, capillares, tri- sex flori, rarissime uniflori,
reicelli subumbellati, ^{conspicui} demum ramosi, involucrium nullum. Calyxis foliola ovato-
lanicollata, corolla breviora.

Petalis tria, ovata. Nectaris filamenta tria, nuda. Corpuscula deltoides.

Stamina duo, Höniy in medicis barbata. Höniy

vaginata 30 Commelina foliis linearibus, pedunculis lateralibus terminalibusque
vagina involucriati uniflori; ~~caule ascendente~~

Commelina vaginata; corollisaequalibus, foliis linearibus, floribus dian-
throis involucrio vaginati Lin. man. 177

Habitat in India orientali König ☉

Caulis plures, ascendentes, spithamei, filiformes, teretes, glabri. Folia
bi-quadrupollicaria, ^{sessilia} angusta, acuta, striata, glabra: Vaginae breves, ^{scissae}
runcidiatae. ^{scissae} Pedunculi ^{scissae} remoti ^{scissae} laterales raro ^{scissae} termin-
nales, plerumque ^{scissae} unicus vel duo laterales, remoti, unguicularis,
uniflori; vaginae cylindrica, pedunculo breviora, striata, obtusapinvolu-
crata. Calycis foliola lanceolata, apice colorata. Petala ovata.
Nectarii filamenta quatuor; corpuscula linearia. Stamina duo barbata,
longitudine corollae König

nudicaulis 29 Commelina foliis lanceolatis, scapo bifloro ^{medio bracteato} ~~trifloro~~ +

Commelina nudicaulis; corollis aequalibus scapo indiviso,
foliis lanceolatis radicalibus Burm. ind. 17. t. 8. f. 1.

Habitat in Java

Radix fibrosa, repens. Caules procumbentes. Folia basi vagi-
nantia. Scapus erectus, filiformis indivisus, in medio
Bractea revoluta. Flores coerulei. Burm. l. c.

An modo varietas Com. nudiflorae vel Tradescantie
malabaricae?

obtusifolia P. ~~foliis~~ oblongo lanceolatis obtusis

Habita in moluise insula Bona penins.

caulis ramosus folia unguiculata uti vagina ciliata. vagina
brevis

medica 20 Commelina ^{** Floribus nudis} foliis radicalibus, subulatis, capro multifloro subnudo +

Commelina medica, floribus aequalibus, foliis sessilibus subulatis
glabris Lour. fl. Cochinch. 40.

Habitat in China et Cochinchina.

Planta acaulis, repens, tuberculis plurimis, fasciculatis, parvis. Folia
congesta, reflecta, glabra, crassa. Caprus sex pollicari, tenuis, teres.

Spica interdum simplex, interdum ramosa. Corolla caerulea. Filamenta
duo, villosa Lour. l. l.

Commelina gracilis corollae aequalibus, foliis ovatis acutis, margine scabris, vagina longi ciliatis, caule repente fl. Peruv. 1. pag. 44. tab. 2. fig. a.
Habitat in cultis et humidis locis Linn.

Radix fibrosa. Caulis bipedalis, gracilis, ramosus, teres, gemulatus, striatus, glaber, saepe purpurascens. Rami alterni. Folia nervosa, integerrima, margine retrosum scabra, utrinque glaberrima, subpetiolata. Vaginae longe, membranaceae, pellucidae, ciliatae. Spatha cordata, compressa, ciliata, persistens. Pedunculi longitudine fere spatha, solitarii, sive flori, saepe gemini: alter 1-2 floris: alter 3-4 floris. Petala 3 exteriora alba, ovata parva, concava, duo latera interiora tria subovata, subundulata, subrotunda, duo majora patentia, pedicellata. Nectario 2 subulato Stamina forma furcata, brevia. Capsula ovata, 3 angulis, 3 sulcis, 3 loculis, 3 nervis. Semina bina, angulata.

gracilis 27 Commelina. foliis ovatis subpetiolatis glaberrimis, involucri cordatis
ciliatis, caule repente. +

Commelina gracilis; corollis aequalibus, foliis ovatis acutis margine gla-
bris, vaginis longis ciliatis, caule repente Bl. per. t. p. 44. l. 72. f. a.

Habitat in cultis et humidis locis himae

Radix fibrosa. Caulis bipedalis, gracilis, ramosus, teres, geniculatus,
striatus, glaber, saepe purpurascens. Stemina margine retrosum glabro
utrinque glaberrima. Vaginae longae, ciliatae. Pedicelli longi-
tudine involucri, solitarii, quinqueflori, saepe gemini, alter uni-
biflorus, alter tri-quadri-florus. Petala tria interiora subaequalia,
subundulata. Palpis foliatis albis ovata, parva, concava, albida, duo
latiora. Corolla Petala subaequalia, subundulata, subrotunda, duo
majora patentia, unguiculata. Nectaris filamenta duo. Capsula
ovata triangulari, tribulca. Semina bina in singulis loculis, angulata.
Bl. per. l. c.

an folia acutae quomodo involucri.

benghalensis ²⁶ Commelina foliis ovatis petiolatis obtusis, involucri cucullatis
turbinatis, caule repente.

Ephemeron benghalense; Serpens, folio subrotundo brevi, pha-
langioides Plukn. alm. 130. t. 27. f. 23

Commelina benghalensis, corollis inaequalibus, foliis ovatis ob-
tusis, caule repente Lin. Syst. veg. 97. Murr. in Comment. Gött. 1779.

^{p. 10 t. 5.} Commelina nervosa; corollis aequalibus, foliis ovatis, involu-
cri cucullatis turbinatis ^{nervosa} Murr. ind. 10. t. 7. f. 3.

Commelina cucullata; corollis aequalibus, foliis ovatis, nervosis
involucri cucullatis turbinatis Lin. mant. 176.

Habitat in India orientali

Caules glomerati, teretes, pilosi. Folia pollicaria vel ^{remota,} minora,
subrotundata, villis raris adspersa. Vaginae caule ~~amplexantes;~~
angulares, benedictum uti petioli pilis & taceis distantibus
rufescentibus ciliatae. Anvolum terminale, breviter peduncul-
atum, pilosum. Pedicelli in involucri longiores. Corollae

canescens 25 Commelina foliis ovatis petiolatis ^{acutis veloso} ~~pilosos~~ canescentibus, involucri
cucullatis turbinateis, caule repente
Habitat in Arabia. Forskäl.

Caulis ramosus; crassitie fere pennae columbinae, striatus, pilis
raris simis adspersus. Sola sesquipollicaria, utrinque frequen-
ter e villis frequentibus cone sentia praesedita subtus. Petioli
unguiculares pilosi. Vaginae semipollicares, tubulosae, laevae
pilosae, ore ciliis albo ciliatae. Involucrum axillare, termi-
nale, subsessile. Pedunculis terminalis, six extra vaginam porrec-
ti, gemini. Involucrum ita dem. cucullata, alpeo impressae
in aeternum: Pedicelli fere pollicares. Flores parvi, caerulei.
an modo varietas Com. benghalensis

Torshalsi *C. folii ovato-lanceolatis* ^{undulatis} ~~foliis~~ ^{libris} vaginae margine glabris
Habitat in Arabia Torshal
Ramosa, glabra. Folca hypoleucis vagina lato involucrium
cordatum.

tuberculata C. foliis ovato lanceolatis petiolatis, involucri cuculla
si pilosi caulis prostratis.

Habitat in America meridionali ad Pflanz

Caules decumbentes prostratis. articuli longi glabri
vagina laxa pilosiuscula ciliata. folia basi supra prope
pilose rare nitida. fl. pedunculati terminalis breves. flores
coerulei

affinis virginiana

barbata 24 Commelina foliis ovatis sessilibus, vaginis barbatis, caule repente
Lamarck illustr. 1. p. 129 +

Habitat in insula Mauritiana

Corollae subaequales Lamarck. l. c.

~~non~~

mollis 23 *Commelina* ^{villosa} foliis ovatis petiolatis, involucrio semiorbiculato ^{conduplicato} margine
~~conversis lobis~~, caule repente. +

Commelina mollis; corollis subaequalibus, foliis ovatis petiolatis villosu-
lis mollibus, caule repente Gaigu. collect. 3. p. 235. G. rar. 2. t. 293

Habitat ad Caracas &

Caulis bipedales, crassitie calami, teretes, ramosissimi, geniculati. Folio-
rum - quadripollicaria, acuta, mollia, subtus pallidiora. Petiolus in-
ter. Vaginae caulis Involucrum brevissime pedunculatum, sub-
biflorum. Flores ut in C. longicauli Gaigu. l. c.

bracteolata Com. Annulli aequalibus, foliis lanceolatis lineari undulatis
subnervis, pedunculis paniculatis bracteolis semivaginalibus La Mark

1. Anni. pag. 129.

Habitat in India
cum fer. cum sumali

erecta? Commelina foliis ovato-lanceolatis & scabris, vaginis ciliatis, involucri lacine

latius turbinate, caule erecto

Commelina foliis ovato-lanceolatis, caule erecto, involuculo scabro, petalis

Ephemerum duobus majoribus Lin. bot. cliff. 16

erectum. Novels Commelina erecta, ampliore suboculis flore Dill. eth. 94.

rasen & Carda t. 77. fig. 80.

monai foliis
Herm. pars
bet. 151

Commelina erecta; corollis inaequalibus, foliis ovato-lanceolatis,
caule erecto sub his & sub simplicibus. Lin. syst. veg. 96

Habitat in Virginia &

Caulis simplicis primus, villis adpressis. crassitie fere per nae anserinae,
villis adpressas, inferne glaber. folia quadringuae pollicaria,

#, nollis em lata et
ultra

attenuata, supra scabra, praesertim margine, subtus laevia. Vagi-
nae pollicares, superiores longitudine internodiorum, caule ampliore,
pitoso, margine hirsuto ciliatae, praesertim superiores, Petioli

brevissimi. Involucria terminalia, geminata, sessilia, diametro
semi-pollicari. Pedicelli involucri longiores. Corollae inaequales &

superne hirsute ciliati

erecta Commelina foliis ovato-lanceolatis & subscabris supra scabris, vaginis

~~attenuata C. foliis laevibus lanceolatis glabris integerrimis involucrio
cordato laniceatis attenuatis caule repente
Habita in India orientali~~

~~Caulis filiformis ramis paniculis inferendis radicantibus
sub ^{stratis} angulatis pedalis. Folia sessilibus angustis juniora pilis raris
adpressis, sesquipedalibus vagina laxa ciliata. Pediculi
axillares involucrium pollicare ^{res} folitarii vel gemini
coerulei~~

obliqua 2) Commelina foliis ovato-lanceolatis basi obliquis ^{petiolatis,} caula
que glabro, involucrio veni formibus conduplicatis

Habitat — — — Ex horto Celsii

Caulis crassitie pennae columbinae. Folio tri-quinque pollicaria,
pollicem et ultra lato, attenuata, basi altero latere breviora et obli-
qua, acuta. Vaginae vix pollicares, supremae articulo longitudine
pilis setaceis infis ciliata. Pedunculi ^{solitarii,} terminales, gemini.

Involucrum semipollicare, coarctatum, glabrum. Pedicelli involu-
crio duplo longiores, biflori, ope lentis villosi, declinati. Corolla subaequalis

An varietas erectae?

Tuberosa @ caulis aequalibus; foliis sessilibus ovato lanceolatis subbilis
tis Lam. 1. 11
Commelina radice anacamphorata Des Dill. Elth. 94. 1. 79 fig

90.

Habitatio Mexico &

Caulis erectus frax superne piloso. folia nervosa margine
ciliata bipollicaria. vagina pollicaris ciliata. involu
crum cordatum nervosum subreticulatum nervis pilosis, acutum
pollicare

Sors hāleci 20 Commelina foliis ovato-oblongis sessilibus glabri, vaginis ^{in volucribus} ^{cond} ~~nae~~
~~nae~~, ~~spathae~~ lateralibus terminalibusque pedunculatis cordatis
^{conduplicatis}
Habitat in Arabia Sors hāle 4106

Caulis ramosus, teres, ^{erectus} striatus, uti tota planta glabra. Folia tripolli-
cana et parum ultra, attenuata, subundulata, ope lentis margine
membranaceo scabro cincta, supra ^{ve} scabriuscula, obscura multi-

nervia. Vaginae semipollicares, ^{ve} ^{puberulae} tubulosae, ~~non laevae~~. Spathae
Involucrum cordato-faltatae, ^{um} margine membranaceo ^{um} ~~ae~~, ~~ae~~ Flores exserti, coen-
tei, subaequali

paniculata Commelina

Habitat in India Orientali? herb. Mus.

Caulis altus, erectus, crispis penna cygnea, senatus, orculo armato villosus
vagina six pollicares, laxi, margine ciliati. Folia spithamea vel ultra
lanceolata, basi ovata, margine ciliata, integerrime, acuta. Panicula
terminalis, patens. Bractea minuta, ovata membranacea. Calyx 3
phyllus: foliola lineana. Petala venosa. Stamina 3^a barbata. glandula
cnicata

mollis ^{pubescenti} Commelina foliis ovatis pedicelatis, caudex repente pubescentibus

41

turbinata
mollis 19

Pom melina pubescens, foliis ovato-oblongis, ^{petiolatis involuvis cucullatis turbinatis} caule repente.

Pom melina mollis; corollis subequalibus, foliis sessili ovatis petiolatis vel
lobulis mollibus, caule repente Jacq. collect. 3. p. 235. Fr. rar. 235.

Habitat ad ~~Paracas~~, in insula ^{St. Cruz,} West. 4

Caules graciles, ramosi pedales et ultra, graciter, ramosi: articuli trique-
tri pollicares. Solia bipollicaria, altero latere bases interdum obliqua,
acuta, utrinque adspersa pilis haud frequentibus; subtus canescentia, tenuiter sex-
tem nervi: Vaginae semiunguiculares, nervo basi paucum ampliores, nervosae,
vix ciliatae, in pediculum brevem ciliatum desinentes. ^{9m} ~~pathae~~ ^{pathae} terminales,
breviter pedunculatae, vix semipollicares, cordatae, acutae, pilosae. Padi-
celli exserti, capillares. Flores corolles, aequales.

Pedunculi termi-
nales, gemini
breves. Invo-
lucrum ~~sex~~
saepe ut in Cu-
cullato, vix
semipollicare
altum margin
acuta.

Affinis Com. mollis, sed folio non exserte ovato, et involucrium mar-
gine laterali omnino coalita. Variat foliis majoribus et minoribus
Congiuntibus et laticioribus, brevioribus et angustioribus

mollis ^{nubigena} Commelina foliis ovatis pedicelatis, caudisque repente pubescentibus.

41

Com muni 17. Commelina foliis ovato-lanceolatis subsessilibus acutis cauleque
repente glabris, involucri cordatis conduplicatis
Cacaotirigoo Martz. bras. p. 8.

Ephemerum africanum annuum flora bipetala Herm. Lugd. 231. Mon.
herb. 3. sect. 15. t. 2. f. 2. per. 2. f. 3.

Commelina foliis ovato-lanceolatis, caule procumbente glabro, petalis
duobus majoribus Lin. hort. cliff. 21.

Commelina procumbens annua, saponariae folio Dillen. elth. 93.
t. 28. f. 89.

Commelina communis; corollis inaequalibus, foliis ovato-lanceolatis,
caule repente glabro Lin. syst. veget. 95

polygama β Commelina polygama; corollis inaequalibus diandris hermaphroditis
et masculis, ramis prostratis radicantibus. Roth. catalact. 1. p. 1.

Habitat in America inque Cap. b. sp. 10

Caulis ramosus Rami elongati. Folia bipollicaria, attenuata. Vaginae
Vaginae semipollicares, caule parum ampliores. Pedunculi laterales
et terminales, semipollicares. Involucrum longitudine pedunculi.
Corolla inaequalis. *

Valde dubito num Commelina caroliniana; corollis inaequalibus, flori-
bis hinc oppositifoliis, & pathis ciliatis acuminatis, foliis ovato-lanceolatis

~~vix ciliatis, Walt. fl. caule ramoso repente Walt. fl. car. 60 specie differt, plantam cum Pari
 3is habui a Carolina ~~hinc~~ optime cum Walt. quadrans de Linnaei & communis non
 diversa nisi, foliis parum angustioribus.~~

~~Virginia Complanata, foliis lanceolatis suboperculatis, ore barbato
 No, caulibus erectis in specie. No. pag 61. # 5. U. pag 94
 Epheborum phoenogonios Virginiae cum magis erectum. Pluck. alm. 135.
 t. 174. fig. 4.
 Ghobol in Virginia 2
 Caulis erecti, simplicis, teres, bipedalis. Loco suboperculatis, lanceolatis, foliis
 retroflexis, lobis: vaginis nervosis suboperculatis, ore ciliatis, barbo
 ter pulis ferrugineis. In the formi nectos suboperculatis. Flores comulor, pecto
 Lo cordatis integerrimis: in inferiore brevibus pedunculatis. Lm. pag. 2. 1.~~

tuberosa 18. Commelina foliis ovato-lanceolatis sessilibus sub ciliatis, involu-
cris cordatis conduplicatis, caule erecto

Commelina foliis ovato-lanceolatis, petalis tribus majoribus
aequalibus lin. hort. cliff. 21.

Commelina radice anaëampberoides Dill. elth. 94. V. 79. f. 90.

Commelina tuberosa; corollis aequalibus, foliis sessilibus ovato-
lanceolatis subciliatis lin. syst. veg. 96. Willd. illustr. n. 10.

Habitat in Mexico

Caules plures; pedales, erecti, parum ramosi, glabri. Folia bitri-
pollicaria, lam. ovato-lanceolatis vel lanceolatis, juniora viliis
aliquid adspersa, coeterum excepto margine glabra. Vaginae
interdum pollicares, caulis amplexores, subciliatae. Pedunculi
terminales, gemini, alter brevior. Involucrum pollicare et ultra,
cordatum ^{acutius} pubescentius. Pedicelli longitudine vaginae Corolla aequa-
lis, coerulea.

se mi pollicem
et ultra

Mat lalytic ^{Tetoviana} B. Trionhis Mexicana Hern. 253. ^{Mex}

Scabra ♂ foliis ovatis subperfoliatis acutis margine scabri vagina
glabri, caule prostrato

Habitat in Andia orientali?

Caules ramosi diffusi, vagina caule ampliori membrana
caesius purpureo punctata folia vix pollicina glabra
Pedunculis axillaribus et terminalibus vagina involucrium
cordatum subreticulatum nervosum oculo armato punctato

his pida 16 Commelina foliis ovato-lanceolatis obtusis hispida, involucri cordati
conduplicatis, caule erecto +
Commelina hispida; corollis aequalibus, foliis ovato-lanceolatis ob-
tusis hispida; margine scabri, pedunculis subquaque floris l. per.
1. p. 43. t. 73. f. a.

Habitat in Penesiae collibus

Radix fibrosa. Caulis sesquialteris, ~~erectus~~, ~~paris~~, ~~strictus~~, pube-
scent. Folia majora bipalmata, obtusa, utrinque hispida,
undecim - septendecim nervia. Vaginae ^{ovae} ~~ovae~~ ~~callosae~~, anticae linea
villosa, subpurpurascens. Pedunculi solitarii, foliis paulo

Calycis foliola duo
exteriora obovata, ter-
tium oblongum,
concavum.

breves, superne incurvati. Involucrum deflexum, ~~nervosum~~
nervosum, hispidulum, ciliatum, quadri - sex florum. Pedicelli
recurvati. Spatha parva sub singulis floris. # Petala ^{obovata} ~~obovata~~
maxima, ovalia, emarginata, concava, breviter unguiculata. # ~~stigma~~

Nectaris fila-
menta
tria

ni filamenta l. per. l. c. stigma obsolete tridentatum. Semina compres-
sa - l. per. l. c. Corollae aequalis

quomodo involucri
an folia petiolata

afriana C corollis inaequalibus, foliis lanceolatis glabris, caule decumbente

Lin. Sp. pl. pag. 604

Commelina procumbens flore luteo Royen. Leyd. 530.

Habitat ad C. b. sp. 4

Caules longi articulati glabri striati. vaginae ulnatae, involucrium
non reticulatae
Involucrium cordatum acutum nervosum

Diffusa 15

Commelina foliis ovato-oblongis ^{sublanicollis} ~~acutis~~, in volucri cordatis conduplicatis
tis, caule repente +

Commelina diffusa; corollis aequalibus, pedunculis capillaribus;
foliis ovato-oblongis, in volucrio, nullo Burm. Ind. 18. t. 7. f. 2.

Habitat in Coromandel

Figura ipsa Burmanni monstrat, quod ad involucrios pertinet

Corollae aequales

Commelina nervosa corollis subequalibus, foliis lanceolatis 16 nervis, vagina hirsuta, caule erecto fl. Peruv. t. pag. 44.

Habitat in umbrosis Peruvia

Caulis tripedalis erectus. Folia alterna, subpetiolata, lanceolata, acuta supra nitida, utrinque glabra, basi hirsuta, erecta, decidua. Vagina nervosa, ore hirsuta. Pedunculi axillares. Spatha cordata multiflora. Corolla purpureo violacea fl. Peruv.

divaricata 14 Commelina foliis ovato-lanceolatis, vag. sessilibus, ^{cordato-ovatis} vaginis involvens ^{pro}
conduplicatis ciliatis, racemis divaricatis

Commelina benghalensis Donk. ¹⁸⁴⁴ Descript. p. 12.

Habitat in Arabia Desrial.

Caulis decumbens, dichotome ramosus, glaber. ^{inferne venetium superne} Folia pellucida, ^{subtus glau-}
cescentia, margine ^{interdum de latis rare pilis} scabra, glabra. Vaginae unguiculatae, pilis longis ciliata,
per per es punctatae. Involucrum laterale et terminale, pedunculatum.
cordato ovatum. Corollae

Varia floribus dipetalis flavis et tripetalis caeruleis. Donk. l. c.

inferne venetium
superne appresi-
mata

Barbata Commelina caulis perhaequalibus: foliis ovatis sessilibus, vaginis barbatis
caule repente. La Mart. T. Enci: pag. 129
Habitat in ~~topula~~ maentrona.

Cajonensis 13 Commelina foliis ovato-lanceolatis ^{petiolatis} glaberrimis, vaginis ^{teu} ciliatis, caule
procumbente.

Commelina cajonensis; procumbens, foliis ovato-lanceolatis, sur-
sum sensim angustatis acutis ^{simis} glaberrimis vaginis ciliatis,
Nectario bilobis Act. Soc. h. n. par. 1. p. 106.

Habitat Cajonae. Richard

Rami filiformes; ^{an an} teretes, glabri. Folia pollicaria ^{et} ultra, acuta,
vix nervosa. Vaginae ^{semicircularis} tubularae, in petiolum brevem
desinentes. Pedunculi axillares folio breviores. ^{et} spatula cordata
tenuis vix semipollicaris, tenuis glome undecimnervis; basi ciliata.
Pedicelli capillares, vix ultra ^{involucrum} ~~spatulam~~ exserti. Flores parvi, coeules,
subaequales.

a praecedente differt: foliis petiolatis; involucro acuto nec
attenuato, breviori.

purpurea
~~rubrocyanea~~ folia ensiformibus villosis plicatis

^{purpurea}
~~folia rubrocyanea~~ Jacq. coll. 9. pag. 268.

Habitat in cap-b. mexi

Folia plura ensiformia acuta, erecta basi longe vaginantha
utrinque villosa, nervosa, plicata, vagina glabra. Pappus vil-
losus, longitudine foliorum, pauciflorus, supra folia declinatus
natho involvi concavo acuto exterior longior. Flores alterni
lesiles saepe 3. Tubus corollae pallide purpureascenti. Lumbi-
laciniis subaequalibus lanceolatis patentissimis longitudine
tubus saetate purpurei. Germen antheris nigro violaceo
Jacq.

pacifica 12. Com melina foliis ovato-lanceolatis sessilibus, ^{in involucri cordatis attenuatis} vaginis subulicatis, caule erecto,
conduplicatis, caule erecto.

Com melina virginica Forst. prodr. n. 26

Habitat in insula Tongatabu

Caulis filiformis, glaber. Folia pollicaria vel parum ultra, glabra, acuta: vaginae tubu-
losae, superne parum latiores, semi-pollicares. ^{spatheae cordatae, attenuatae, semi-pollicares} ~~spatheae~~ ^{terminales} ~~terminales~~
res. Pedicelli capillares; spatheae longiores. Flores parvi, subaequales.

Longifolia Complanata

Habitat hinc inde.

Caulis ramosus, erectus

habes

obtusifolia 11 Pommelina foliis oblongis ^{sessilibus} semiamplexicaulis
(obtusiusculis; vaginis brevibus & imis,
caule prostrum bente

^{Moluccis} ^{Bona.}
Habitat in Moluccis in Insula Moluccanis. Com merson. Ext herbario

Thouini.

Caulis gracilis: Rami alterni, glabri. Folia semipollicaria vel
minora, versus apicem ramorum approximata, arcentia, vix nervo-
sa, glabra, interdum ad oculum aromatum pilis variis simis adspersa,
basi subciliata. Vaginae lineam longae, tubulosae, ore ciliatae. Ore ciliatae.

parviflora ~~Faxa~~ foliis linearibus caulis flexuosis, scape subuniflora flore multoties
longiore

nervosa 5. Corn melina foliis lanceolatis subpetiolatis glabris basi hispida, involucri
cordatis, caula erecto +

Corn melina nervosa; corollis subaequalibus, foliis lanceolatis pedem
nerviibus, vaginis hispidis, caule erecto 8l. per. 1. p. 44.

Habitat in umbrosis Pennsylv.

Caulis tripedalis, folia ^{erecta} laevia, supra nitida, utrinque glabra, basi
hispida, ore decidua. Vaginae ore hirsutae. Pedunculi laterales. Invo-
lucrum multiflorum. Corolla purpureo-violacea, ^{subaequali} 8l. per. 1. c.

barbata

~~C. foliis ovatis petiolatis margine scabris vaginae basi oreque pilosis
scopulis nunc ulatis
Habitat in India et idestali~~
Caulis glaber. folia bipollucina, pili ferruginei ad basin vaginae
frequentis.

virginica 6 Commelina foliis lanceolatis subpetiolatis supra glabris, vaginæ
subpubescentes ciliatas, caule erecto simplici;

Ephemerum phalangoides virginianum majus erectum Pluken
alm. 135. t. 174. f. 1.

#4 Habitat in Virginia

Commelina virgi
nicana; corollis subae-
qualibus, foliis lan-
ceolatis subpetiolatis
ore barbatis, caulis
erectis in spec. pl. 61.

Caules bipedales, laevés. Folia supra retrosum scabra. Vagi-
nae ^{ore} nervosae pilis ferrugineis barbatae ciliatae. Involucrum
terminale, subcordatum. Flores coerulei, petalis cordatis, inte-
germinis; inferiore brevius pedicellato. Linn. bot. Coroll. Corollae

subaequalis. Linn. C. C.

communis *C. corollis* inaequalibus, foliis ovato-lanceolatis acutis. Caulis
repens et glabro. Spec. pl. naz. box

Commelina procumbens annua, japonensis folio Willd. Elth:

93. 8. 7. 8. 9.

Habitat in America *C.*

vagina ulcata corpuscula uncinata

africana 7 Commelina foliis ^{sesquibus cauleque decumbente} lanceolatis, glabris, involucri cordatis unduplicatis,
caule decumbente

Commelina procumbens flore luteo Royer Lugd. 500.

Commelina africana; corollis inaequalibus, foliis lanceolatis glabris,
caule decumbente Lin. Syst. veg. 95. Willd. illustr. n. 14. Beg. cap. 9.

Habitat in Africa 4

Caulis elongatus, ramosus, inferius articuli inferiores vaginae Vestis,
aplyeli. Sola h. s. trijovata, acuta. Vaginae semipollia
res, caule amplosae. ^{superiora ciliata} lateralis et terminalis, sex
semipolliares, fere fleri reflecti. Involucrium interdum
polliares, acutum acuminatum, minima reticulatum. Flores
flavi, inaequales

erecta *Commelina* collis inaequalibus, foliis ovato lanceolatis, caula erecto subhirsuta
Simplicissimo Lin. L. V. pag. 94

Commelina erecta, ampliore subconcolor floe. Bell. elth. 94. p. 77. t. 88.

Habitat in Virginia 7

non vid.