

Camotadia

84
~~85~~

Camotadia. Cal. 3-partita. Cor. speta 3-partita. Drupe
oblonga; nucis 2-loba

integrifolia t. Comoradia foliolis ovato-lanceolatis integerrimis.

Prunus racemosa, caudice non ramoso, alato fraxini foliis non crenato, fructu nigro subdulci Swan. hist. 2. p. 131. t. 222 f. 6 Rai.

Dendr. 44.

Comoradia caudice simplici, floribus confertis sessilibus, racemis alaribus. Brown jam. 124

Comoradia integrifolia; foliolis integris. La Saigu. amer. 12.

Lin. syst. veg. 83. Lamarckii illustr. t. p. 99. t. 27. f. 1

Habitat in America calidiora. Ex herbario Tusisii 5

Folia saepe bi-
pedalia:

Rami apice canescentes. # ~~5~~ Foliola tri-odotryga,
opposita vel alterna, petiolata, bi-quadrifolliciana, intus ser-
ius sensim minor, attenuata, tenera, venosa, utrinque glabra
nima, nitida. Racemi axillares, elongati, interdum sesquiped-
ales, paniculati: pedunculi canescentes. Flores numerosi bi-
mi, sessili. Fructus oblongus, nitidus, saba coffea parum ma-
jo.

Hamina et petala saepe quatuor Saiguin

Dentata 2 Comoladia foliis^{olis} ovato-lanceolatis spinoso-dentatis.
Comoladia dentata; foliis spinoso-dentatis Jacq. Amer. 13.
t. 173. f. 4.

Habitat in America meridionali. Ex herbis Tussisi et Vente
natis §

folia petiolata, pedalia & ultra: foliola tri-annuam
juga, subpetiolata, inferiora et exteriora opposita, inter-
media alterna, extrema ^{quasi} tripolliciana, basi ovata, interiora
& externiora basi subcordata, intima vix polliciana:
omnia acuta, margine & nervis ^{immersis} ultra foliolum excurrentibus
remota & spinosa, supra glabra, laevia, nitida, venis nervisque
in meso & subtus nervi venisque exstantibus scissis & ordi-

de-canescentibus. Petioli teretes, tomentosi. Panicula pedalis
et ultra, patens, glabra # flores minuti, saepe glomerati, & sparsi.

pedunculi
neque vix can-
tes.

Varia folia & ultra glabra.

Odor & stans. Succus niger vix eluendus Jacq. l. c.

1462 *Mapana* Aubl. t. 17

Mapana Aubl.

Habitat Cayenna herb. Fusf.

Squamis nonnullis lanceolatis ad basin culmi. Culmi striatus, semipe-
dalis. Stipulae ovatae, sessilia, ^{late} lanceolata, acuminata, trinerviis, b. j.
Tripolluana

~~Stipulae~~ ovales subsingulae squamis foliis linearibus lanceola-
tis, obtusiusculo integerrima nec serrata ut in
Aubl. ² t. 17, dorso ciliata

iliifolia 3. Comoladia foliolis angulato-spinosis Swartz. prodr. 17. fl. ind.
ord. 1. p. 75.

Lodona aquifolii folio tricuspidato Plum gen. 20. ic. 100. t. 110. f. 2.
¶ Hec Lodona; foliis pinnatis Lin. spec. pl. 102.

Comoladia tricuspidata; foliis pinnatis: foliolis ovatis tricuspidatis,
racemis subsimplicibus. Lamark in Art. par. 1704. p.
327.

Comoladia iliifolia; foliolis subrotundis angulato-spinosis
utrinque glabris. Lamark illustr. 1. p. 99. t. 27. f. 2.

inermis 3 Lodona aquifolii folio anguloso non aculeato. Plum gen. 20.
Habitat in insula St. Paeis Dr. Pfluy, in Domingo herbarium
Lamarkii 3

Rami crassitie penna anserina, cicatrici, punctati, superne
villosi-tomentosi. Foliola circiter octojuga, opposita, semipollicia-
na vel minora, basi ~~sub~~ cordata, ovata vel subrotunda, trian-
gularia; angulis apicisque spina pungente flavescente termin-
ata, glaberrima, aerea. Petioli pubescentes. Racemi ^{folio} _{vires}

