

Convallaria

Covellana

Habitat ad fluvium Baccal herb Musci  
Facies C. majalis, palmarum vel pithamour. Folia in petiolum attenuata,  
amplexicaulia, palmata vel bipollicaria, duo radicalia, saepe unatum  
in scapo. Pedicelli racemosi, distanter, patenter, solitarii. unispermii Baccia  
pse. minor non pendula

confer Gmel. fl. Siber

Convolvana

*Polygonatum orientale*, latifolium, flore parvo Tournef. Cor pag. 1.

Habitat in Cappadocia herb. Tournef.

Caulis angulatus. Folia sessilia elliptica; quædam curvata & majores.  
Pedunculi triflori. Flores triplo minores quam in multifloro.

umbellata Pennelliana

Habitat in montis altibus Carolinae Herb. Guss.

Folia radicalia, frithamosa, elliptica, nervosa, acuta, lata, costa pectin  
marginata, pilosa. Scapus pedalis, erectus, teres, pilosus. Umbellae termi  
nalis, ramis unica inferior: pedicelli 15. Semipolluc. axes, veluti. 8. Loco  
parvi

umbellata Convallaria

Habitat in Carolina herb. Rich.

Radix radicalis, plura, fistulosa et ultra. Scapi folio albescentes

habes

verticillata *Convallaria* <sup>lancoolata</sup> foliis verticillatis Lin. l. V. p. 334 Flor. Dan. t. 86

Sigillum salomonis angust. folium non ramo Tray

Polygonatum alatum Dod. pempt 345

Polygonatum angust. folium non ramosum Bauh. Pin. 303.

75. Polygonum 6 lve angust. folium Pluf. her.

Polygonum angustifolium ramosum. Bauh. Pin. 304

Habitat in Europa septentrionalis salsibus, precipitiis 4

Caulis sesquipedalis angulatus. folia sesquialia, lancoolata, palmaria 5-4 pedunculi axillares plures bif. 3flori flores penduli

specimen lectum in montibus circa Petrum herb. Encarth. apud  
Luz.

Caulis angulatus, pedicelli plures biflori. folia 6 opia & cinnata  
suntur glauca an specie diversa?

foliis lanceolato-ellipticis  
majalis Convallaria scapo nudo Lin. V. pag. 334. Flor. Dan. 4. P. 574

~~Lilium convallium lactifolium B.~~

Lilium convallium lactifolium Bauh. Prod. Pin. 304.

Lilium convallis vel sylvestris vel Brunfels.

Lilium convallium God.

Lilium convallium album Bauh. Pin. 304.

Lilium convallium alpinum Bauh. Pin.

Raritas in Europa boreali 4

Folia subcaulifera. Folia perae radicalia gemina, lanceolato-elliptica basi, in petiolum vaginatum attenuata. Scapus erectus pilis  
mou. Flores racemosi, secundi campanulati. Bractea lanceolata  
longitudine pedicelli

Japonica Convallaria scapo nudo aëripiti, racemo cernuo <sup>foliis linearibus</sup> Thurb. fl. Jap. p. 109.

Convallaria japonica scapo nudo aëripiti, floribus racemosis pediculis  
foliis linearibus scapo triplo longiori bushen Suppl. p. 204 L.

Habita in Japonia

β Mondo A. Bialf mondo, vulgo Ruano fize i: est Barba serpentina Komj,  
am. exot. Jap. s. p. 023. fig. 024.

Habitat in Japonia scapo corpora

Folia radicalia plura, inferne attenuata, angusta, inde plana integra  
ferris recurva bipedalia. Scapus tenuis sine striatus subhamosus  
apice floribus et racemus, cernuus. Flores parvi. Pedunculi  
aggregati 2-6. uni flori raro bi-3 flori <sup>superne</sup> incurvati unguis  
cularis. Bractea lanceolata alba, pedunculo brevior. Corolla  
sexpartita. 6 Bractea corollae, calyce persistenti ornata  
Corolla alba. Anthera lineares Thurb. l. c



*pruriata* *Convallaria* scapo <sup>apiculato</sup> nudo ~~strato~~, racemo <sup>pedunculis</sup> erecto floribus <sup>pedunculis</sup> sparsis, foliis linearibus  
*Convallaria pruriata* scapo nudo ~~strato~~, racemo ~~pruriato~~, floribus aggregatis Thunb.  
fl. Japon. p. 141. Lin. S. V. p. 141.

— Habitat in Japonia

Folia oblongo-ovata. Scapuli prostrati aggregati. Pediculi patentibus aggregati uniflori, teretes. Corolla corollae 6-petala: petalis ovatis. Anthera ovata didymo Thunb. l. c.

multiflora *Convallaria* foliis <sup>alternis</sup> ~~at~~plexi caulibus, caule tereti, pedunculis  
axillaribus multifloris Lin. S. V. pag. 334. fl. Tan. t. 152.

*Seyllum salomonis* Brunfels

*Polygonatum latifolium* ~~God.~~ Clus. hist. pa. 1. p. 275

*Polygonum latifolium maximum* Bauh. Pin. 303

Habitat in Europa precipitius rupibus &

Differt ab antecedente magnitudine quod major, corolla angustior  
foliis parum longioribus

*Polygonatum* *Convallaria* foliis alter<sup>nis</sup> amplexicaulis, caule anigro  
pedunculis axillaribus subunifloris. Lin. l. V. p. 334. Flor. Sam. 1377.

*Polygonatum latifolium* minus Tabern.

*Polygonatum latifolium* flore majori Dore Bauh. Pin. 303.

*Polygonatum* floribus ex singularibus pedunculis Bauh. hist. 3.  
p. 530

Habita in Europa septentrionali proecipue, in partibus inque Virginia

<sup>24</sup>Caulis semipedalis parum flexuosus. Folia ovata obtusiuscula  
lesque pollicaria. pedunculi breves 1-2-flori. Flores autantes  
unguiculares

Durius, minor, corollis amplioribus quam in insperante

Thunbergia japonica herb. Proveniend. et foliis multo longioribus ac  
non Europa

*Latifolia* *Convallaria* foliis alternis amplexicaulis acuminatis, caulis angu-  
lato, pedunculis axillaribus multifloris Lin. LV. p. 334 Jacq. fl. Austr.  
v. 3. t. 232.

Habitat

7 an varietas praecedentis?

biflora P. foliis semiamplexicaulis alternis, caule tereti, pedunculis  
axillaribus bifloris Soldani Walt. fl. car. pag. 122  
Habitat in Carolina

non vidi

racemosa <sup>petiolatis attenuati</sup> Convallaria foliis subsessilibus acuminatis, fr. racemo terminali  
composito

Polygonatum racemosum Cor. Canad. 36. t. 37.

Polygonatum racemosum et racemosum fructatum Mon. hist. 3. p. 537. / 13. t. 4.  
fig. 9.

Polygonatum racemosum can. americanum foliis amplexicaulis  
plurimis ellebori albi foliis amplexiformis Pluk. alm. 301. t. 311.

fig. 2.

Convallaria racemosa foliis sessilibus, racemo terminali composito  
Ler. L. V. p. 335.

Habitat in Virginia Canada &

Caulis flexuosus anceps. Folia brevissime petiolata, lanice  
lato elliptica, palmata, septem nervia. Racemuli alterni  
patentes sibi unguiculares vel paucos longos.

— petiolatis ~~oblongis~~

stellata Convallaria foliis lanceolatis amplexicaulis, racemo terminali  
simplex.

Polygonum virginianum erectum spicatum, flore stellato Mon. h. 3.  
p. 536. s. 13. t. 4. fig. 7.

Polygonatum canadense spicatum fertile Corn. canad. 33. t. 33.

Convallaria stellata foliis amplexicaulis plurimis  
Habitat in Canada 4

Caulis flexuosus angulatus, folia longiora et angustiora, flores  
majores pauloties quam in antecedente enervia.

trifolia Convallaria foliis amplexicaulis Verus, racemo terminali simplici  
Lin. S. V. p. 335.

Phalangium veratrifolium Amm. r. th. 137.

Convallaria floribus racemosis, foliis ovatis oblongis caulibus Gmel. fib. 1. p. 36.

8. 6.

Habitat in Sibiria sylvis 7



*bifolia* Convallaria foliis cordatis floribus tetrandris Lin. f. V. p. 336 Flor. Dan. 291

*unifolium* Brunfels.

Gramen Parnassii Lam. epit. 744.

*Lilium convallium* minus Bauh. Pin. 304

Habitat in Europa borealis pratis depressis, appensis

Caulis spithameus erectus, inferne nudus, superne foliosus. Folia duo  
versus summum caulis petiolata alterna, ~~et~~ acuta. Flores  
racemosi. pedicelli capillares. Corolla 4-fida