

# Convolvulus

1. arvensis C. foliis sagittatis utrinque acutis pedunculis unifloris
2. sepium C. foliis sagittatis, pediculis truncatis, pedunculis tetragonis unifloris
3. Wheeleri C. foliis sagittatis pediculis subrotundatis integris, pedunculis verticillis unifloris
4. Scammonea C. foliis sagittatis pediculis truncatis, pedunculis verticillis trifloris
5. Sibinius C. foliis cordatis acuminatis recurvis, pedunculis trifloris, caule farinoso
6. farinosus C. foliis cordatis acuminatis recurvis, pedunculis unifloris: foliolis  
~~me~~ <sup>me</sup> ~~farinoso~~ <sup>farinoso</sup>
7. retusus C. foliis lanceolatis: inferius retusis, pedunculis trifloris: foliolis  
acutis, calycibus exterioribus geminatis magnis
8. medium C. foliis linearibus hastatis acuminatis: aunculis dentatis, pedunculis  
unifloris, calycibus sagittatis, <sup>caule</sup> ~~caule~~
9. japonicus C. foliis hastatis lanceolatis, lobis lateralibus unidentatis, pedunculis  
unifloris
10. obtusifolius C. foliis hastato-lanceolatis obtusis, aunculis lobis subintegerrimis, pedun-  
culis unifloris solitariis
11. Eschscholii C. foliis cordato-lanceolatis, floribus ternis subsessilibus, calycibus villosis
12. hastatus C. foliis lanceolatis hastatis aunculis lobis rotundatis, pedunculis axillaribus  
geminis unifloris

13. *Indentatus* C. foliis cuneiformibus truncatis, basi dilatatis dentatis, pedunculis  
unifloris
14. *incanus* C. tomentoso-seniensis, foliis sagittato-lanceolatis, obtusi basi subdentatis  
pedunculis unifloris
15. *Arenarius* C. foliis oblongis emarginatis basi lobatis integrisve, pedunculis uni-  
floris, corollis tubulosis.
16. *panduratus* C. foliis cordatis integris panduriformibus, calycibus lobatis
17. *bracteatus* C. foliis cordato acuminatis panduriformibus, pedunculis uniflo-  
ris: foliis exterioribus calycis bracteiformibus
18. *carolinus* C. foliis cordatis integris trilobisque villosis, calycibus lobatis, capsula  
hispidis, pedunculis bifloris.
19. *hidemius* C. foliis cordatis integris trilobisque, corollis indivisis, fructibus erectis  
pedunculis petiolo brevioribus calycibus
20. *trilobus* C. foliis cordatis trilobis cauleque villosis, pedunculis unifloris  
foliis longioribus
21. *nit* C. foliis cordatis trilobis, corollis semiquinquifidis, pedunculis petio-  
lo brevioribus calycibus basi hispido-pilosis
22. *flavissimus* C. pedunculis foliis cordatis indivisis, fructibus cernuis, pedunculis  
incomptis
23. *mollis* C. foliis cordatis acuminatis villosis subtus mollibus, pedunculis sub-  
bifloris, calycibus glabris

24. platanifolius C. foliis cordatis trilobis: lobis angulatis, pedunculis subtifloris ca-  
lucibusque glabris
25. angularis C. foliis cordatis quinqueangularibus integerrimis vellosis, pedunculis  
multifloris 2
26. varipilus C. foliis ovatis, cordatis acuminatis, pedunculis unifloris inaequalis,  
calycibus glabris <sup>sub!</sup>
27. Canaginosus C. foliis cordatis hastatis tomentosis sericeis: auriculis dentatis  
pedunculis trifloris, caule piloso.
28. sagittatus C. foliis sagittato-cordatis, pedunculis unifloris
29. obscurus C. foliis cordatis acuminatis, pedunculis filiformibus unifloris,  
calycibus glabris, caule hispido sericeo.
30. Batatas C. foliis cordatis hastatis quinque-nerviis, caule repente tuberifero
31. crenatus C. tomentoso-sericeus, foliis cordato-oblongis subpromorsis inae-  
qualis, pedunculis unifloris.
32. reflexus C. foliis cordatis acuminatis glabris, pedunculis unifloris, fructi-  
bus cernuis caule piloso.
33. velutinus C. foliis cordato-ovatis acuminatis subtomentosis, pedunculis bifloris
34. gemellus C. foliis cordatis glabris, pedunculis bifloris
35. biflorus C. foliis cordatis pubescentibus, pedunculis geminis, corollis lobis tri-  
fidis

36. biflorus C. foliis cordatis pubescentibus, pedunculis geminis, comitis lobis tri-

36. <sup>20</sup> biflorus C. foliis cordato-lanceolatis, acuminatis glabris, pedunculis tri floris

37. stratus C. foliis cordatis acuminatis glabris, pedunculis foliis longioribus

subquadrifloris

38. quinque florus C. foliis sagittatis, petiolo truncato, in junioribus crenato re-  
pandis, pedunculis subquinquefloris

39. cu' pedatur C. foliis cordatis acuminatis glabris, pedunculis multifloris,  
caule piloso

40. flavicomus C. pilosus, foliis sagittato-oblongis obtusis: auriculatis angula-  
tis, pedunculis unifloris

41. verticillatus C. foliis cordatis oblongis nudis pedunculis umbellatis bi-  
fidis multifloris

42. bifidus C. villosus, foliis cordatis oblongis subtus mollissimis, peduncu-  
lis bifidis multifloris.

43. umbellatus C. foliis cordatis subtus molliter villosis, pedunculis indivi-  
sulis umbellatis



67

gibbaulis

<sup>petiolatis</sup>

Convolvulus foliis linear-lanceolatis obtusis mucronatis, basi dilatatis dentatis,  
pedunculis unifloris, folioli calycinis oblongis

[In Guinea invenit Dr. G. S. qui semina de Non Robo dedit unde plantam habuit  
Dr. Lund.

maxime Evolvulo tridentato affinis.

Caulis herbaceus, <sup>pollicari basi ramosiss. rami</sup> ~~sepi formos~~, volubilis, ramosus. ~~Est in Guayana petiolatis~~

Folia brevissime petiolata, distantia, bipollicaria et ultra, lanceolata,  
integerrima, excepto basi, venosa, <sup>glaberrima</sup> ~~venosa~~, utrinque parum angustata, obtu-  
sa mucronata, minime reflexa, <sup>sup</sup> ~~tridentata~~, basi utrinque dilatata, auri-  
culis dentatis; dentibus mucronatis, utrinque 3 vel quatuor

Pedunculus axillaris, <sup>epor mic</sup> ~~filiformis~~, uniflorus, superne incrassatus. Bracteae gemi-  
nae, oppositae, subulatae, supra medium pedunculi.

Calycis foliola oblonga, mucronata, glabra. Corolla flava

Stigma simplex, obtusiusculum.

Fructus angustifoliae taequi coll. 2. pag. 367

[Litr. G. pag. 35.]

67

involutus Convolvulus pubescens, foliis cordato-oblongis obtusis ~~et~~ mu-  
crosatis, pedunculis subtrifloris, bracteis ellipticis

Convolvulus involutus; foliis cordato-hastatis pubescentibus; peduncu-  
lis subtrifloris, calycibus bracteatis Wild. Spec. pl. 1. p. 2. pag 845.

Habitat in Guinea Herb.

Caulis tener, striatus. Folia petiolata, bipollicaria, basi saepe sub-  
truncata, interdum subcordata, venosa, integerrima. Petioli villo-

\* inferior  
obtusissima  
superiora ob-  
tusa cum  
mucrone.

Pedunculi longitudine fere foliorum. <sup>2 3 flori</sup> Bractea duo ad basin  
pedicellorum et duo ad basin singuli calycis aequa longiora, mu-  
crosata.

in Specimine herb. Herb. omnia folia cordata sunt nec triloba

eriospermus C. fruticosus, foliis digitatis foliolis subrotundis lineari-  
bus angustissimis. Sementibus hispida. Cuiusd.

Habitat in Domingo

glaber. Caulis teres. Folia parva, pollicaria cum petiolo.  
pedunculis dichotomis foliis longioribus. Calyx brevis foliolis obtusis  
Corolla cylindrica, rugosa

foliis ~~sub~~ septematis digitatis linearibus, pedunculis dichotomis

pedunculis multifloris

An fronsa

non vidi



Convolvulus ovalifolius, glaber foliis ovalibus integerrimis emarginatis, pedunculis  
uni ad septem floris, calycibus obovatis

Habitat in India occidentali. Von Prokr. 5 inque Guinea 5

Caulis fruticosus, <sup>erectus,</sup> teres, levis, glaber, uti tota planta.

Folia petiolata, pollicaria vel <sup>ultra</sup> ultra, integerrima, basi acuta  
apice obtusis sumis cum emarginatura, obsolete nervosa, arena  
lana.

Petioles semiunguiculares

Pedunculi axillares, solitarii, filiformes, folio dimidio breviores, in  
fimi uniflori, sequentes bi- tri- quadri- quinque- vel septemflori

Pedicelli umbellati, semiunguiculares, angulati, versus flo-  
rem crassiores, angulati. Bractea duo tri vel quatuor ad  
basin pedicellorum, minuta.

Calyx obovatus: foliola tria exteriora late-ovata, acuta, vix semi-  
unguicularia, interiora breviora oblonga, acuta.



*Diphyllus*  
*Aggregatus*  
*Cephalotus*

*Convolvulus* <sup>villosus</sup> foliis cordatis villosis, floribus capitatis, involucri radi-  
phyllis cordatis patentissimis; bracteis lanceolatis hirsutis

Habitat in Guinea Gsert

Caulis volubilis, teres, lavis, pilis raris adpressis. Folia petiolata, bipolli-  
cana, sive nerva, subius villosa, supra fere glabra, simpliciter  
venosa, obtusa, sub mucronata, basi sinu profundo, lobis parallelis rotun-  
datis, venella incana. Petioli villosi. Pedunculi axillares, foliis  
duplo longiores, petiolo crassiores, adpressi pilis adpressis, state glabris  
rari. Involucri foliola cordata, attenuata, obtusa, intus, proæthimi  
basi hirsuta, extus villis raris adspersa, subius pallidiora, pollicaria.  
Flores copiosi, sessiles. Bractea hirsuta, duo ad basin singuli calycis  
Calycis foliola lanceolata, valde attenuata, unguiculata, suprema  
hirsuta. Corolla longitudine involucri, extus lineis sive hirsuta

5-6 retusi Convolvulus foliis lanceolatis: inferioribus retusi, pedunculis unifloris  
folioli calycinis exterioribus semiovatis magnis.

Convolvulus <sup>uni</sup> ~~uniflorus~~: caule volubili, foliis lanceolatis, pedunculis  
unifloris, bracteis duabus cratis Burm. fl. ind. pag. 47.

Tab. 21. fig. 2.

Habitat in India orientali König

glaber.

Caulis volubilis, inferne spinuloso-municatus, glaber, superne pilis  
rarioribus adpressis

Folia crassiuscula, petiolata; <sup>glabra</sup> ~~avenia~~: inferiora sesquipollicaria  
oblonga lanceolata-oblonga, retusa, mucronata, basi acuta,  
superiora <sup>brevius petiolata</sup> pollicaria, lanceolata, apice rotundata, mu-  
cronata.

Petioles inferioris folio parum breviores, supremi vix semilinguae  
longi.

Pedunculi solitarii, uniflori, supra medium bracteis duabus mi-  
nutis, superne villosi <sup>glabra</sup> ~~aspiculi~~

Calycis foliola <sup>glabra</sup> ~~trina~~ exteriora, semiovata, acuta, mucronata  
nervosa, florem tegentia, ~~cum fructu inaccessantia, semipalli~~  
<sup>semilinguae vel longiora</sup>

canā: Duo internō lineari-lanceolatas, lō attenuatas, longitudine  
exteriorum: fructiferi semipollicaria

Corolla extus lineis quinque dense pilosis: pilis fulvis, nictidis

Stigma capitatum.

Capitula glabra, calyce brevior

(Partem superiorem plantae tantum delineare curavit Col. Burman  
nio; figuram calycem haud bene exprimit figura.)

cordifolius C. foliis cordatis hastatis dentatis, pedunculis: bracteis umbellatis

Thunb. prodr. pag. 35

Habitat in Cap. b. frei

Caulis volubilis

non vidi

*Dentatus* C. foliis cordatis attenuatis glabris basi dentatis pedunculis  
truncatis bifidis multifloris

Habitat in India orientali in Kottel

Caulis volubilis, tenuis ad folia villosus ceterum glaber striatus  
folia petiolata ut sesquipollicaria, utrinque glabra transver-  
sim nervosa, ovata, acuminata obtusa mucronata basi versis  
utrinque dentibus 3-4. petioli longitudine folii pedunculis  
petiolo crassior potenti subreflexis bifidis pedicelli ceteris  
sive alterni rariemose in fragulis ramis axillis villosi. Siliola  
calycis dyqualis, glabra, truncata

Compositae  $\odot$  foliis cordatis integerrimis, scabris pilis corymbis. In thalassia foliis

Corollis tomentosis

Habitat in India orientali & Bhotlan.

Caulis angulatus, superne pubescens. Folia petiolata, base quadrifollicularia, acuta, integerrima, nervosa, subavenia utrinque lentis, pilis adpressis adpressa subtus pallidiora supra scabris pilis. Petioli longitudine foliorum. Pedunculi axillares vel ex apice ramulorum, folio parum longiores, petiolo crassiores, subpubescentes, apice trifidus ramis iterum 2-4 divisis, singulis 3-4 floris, floribus pedicellatis, foliicola, sive cuneata, villosa, longitudine calycis, sub singulis flore. Corollae sesqui-pollicaris, e pilis longis adpressis incana.



pubescens C. foliis cordatis oblongis <sup>pubescentibus</sup> ~~pubescentibus~~ pedunculi bifidis pedice-  
lis brevibus trifloris folioli calycis <sup>que</sup> sunt tenoribus ovatis pubescentibus

Habitat in India occidentali

Caulis volubilis pubescens tener. Folia pollicaria <sup>oblonga</sup> versus apicem  
parum angustata, acuta margine villosa. Vap. cordata.  
petioli pubescentes. Pedunculi folio longiori pubescente.  
apice folioli lanceolati Calycis foliola <sup>attenuata</sup> duo ovata. Corolla  
coerulea affinis pentanthe.

verticillatus Convolvulus foliis cordatis oblongis nudis, pedunculis umbellatis bifidis  
multifloris L. Sp. pl. 220\*. S. V. p. 201.

+ calycibus obtusis

Quamoclit purpurea solanifolia minor Plum. ic. 94. f. 2.

Convolv. minor scandens, floribus plurimis alaribus, calycibus glabris,  
foliis oblongis cordatis Brown. Jara 153.

Hyomisa verticillata Am. Acad. S. p. 394.

Habitat in America.

Corolla non divisa. Folia cordata ovata, margine subrepando scabriusculo. Flores  
complectentes parvi. Pedunculi foliis breviores, umbellati, et pedicelli latera-  
les saepe subdivisi. L. Sp. l. c.

17-10 bifidus Convolvulus foliis cordatis oblongis acuminatis subtus mollissimis,  
pedunculis bifidis multifloris

Convolvulus lani ma Rumph. amb. 5. pag. 431.

B. foliis cordatis lanceolato-oblongis glabris

Convolvulus lani minor Rumph. amb. 5. pag. 431. tab.

Convolvulus cymosus 150.

La Martini fide Habitat in Tara India orientali

herb. Thaurin.  
et Sals.

Caulis volubili, villosus.

Folia petiolata, bis. tripolliciana, basi pollicem vel <sup>parum</sup> ~~ultra~~ ultra lata, acuminata, mucronata, supra saepe villosa  
fucula, subtus canescentia, mollissima, integerrima.

Petiolus folio triplo brevior, canescens.

Pedunculus axillaris, solitarius, bifidus. Pedicelli pluri  
mi, subumbellati; basi squamis minutis loco bractearum,  
oblongis, sermigenis, deciduis.

Calycis lobula basi pubescentia, apice rotundata, aequalis  
Corolla fere infundibuliformis, pollicaris, calycis triplo lon  
gior, extus lineis quibus tenuibus villosis: Lobi an ti  
apice barbati

Stigma capitatum, bilobum

Capsula ovata, striata glabra

(Habitus Conv. ~~umbellati~~, diversa<sup>us</sup> foliis minoribus angustioribus.

Varietas  $\beta$  vix nisi glabritie et foliis angustioribus differet  
in  $\beta$ . Capsula ovata corvis obtusa, glabra fere unguiculata bilocula  
ni corvis depressis. seminibus rugatis

umbellatus Convolvulus foliis cordatis, pedunculis umbellatis, foliis cordatis subtus molli-  
ter villosi, pedicellis umbellatis

Conv. umbellatus foliis cordatis caule volubili, pedunculis umbellatis L. V.  
pag. 201

Convolvulus luteus Polyanthus Plum. Amer. Sp. 4. 102.

Convolvulus americanus, vulgaris folio, capsulis triquetris numerosis Planch  
alm 114. t. 167. fl.

Convolvulus polyanthus, foliis subrotundo, flore luteo Sloan jam. 53.

Convolvulus umbellatus foliis cordatis caule volubili, pedunculis umbellatis L. V.  
p. 201.

Habitat in Martinica, Domingo, Jamaica &

Caule purpurascens lenticis <sup>inseiscent</sup> villosis. folia cordata, magna, tripollicaria, <sup>auri</sup>  
supra glabra, subtus villosa, mollissima, <sup>sub</sup> vixida; Petalus villosus folio  
brevis. Pedunculus axillaris, solitarius, foliis longior: pedicelli 10-16. sp  
perne parum incrassati apylli, squamis plurimis ad basin singuli. Calyx  
glaber: foliolis oblongis, obtusis. Corollo radii glabra purpurascens  
Stigma capitatum.

varietatem ex Jamaica vide Caule aculeato

multiflorum C. foliis cordatis <sup>tenuatis, acuminatis</sup> cauleque hirsuto pedunculis multiflo-  
ris Calycibus glabris. pedunculis multifloris

*Sponsoa triflora* foliis cordatis acuminatis glabris, pedunculis  
trifloris Forsk. - Desf. pag 44

~~Habitat in arabia~~

Folia non vidi Calycis oblongi obtusi. flores campanula-  
ti glabri sesqui pollicares.

Specimen perfectum non inveni in collectione

conaceus. Convolvulus foliis cordatis ovatis, glaberrimis, axillis tomentosissimis, cau-  
ca fruticosa, pedunculis quinquefloris

Habitat in Insula Francis In Commerçon deat In Thourin &

Caulis crassus sine pennis antheris, fuscus, rigidus, glaberrimus,  
uti tota planta, axillis exceptis

Folia palmata ovata cordata, suboriacea, acuminata, sin-  
ta vel obtusa, emarginata, nervosa.

Petiolus foliis brevior.

Peduncululus foliis longior ramosis, multifloris; ligula minuta  
ovata, acut concava ad basin pedicellorum.

Calycis magnitudine nuci avellanae: lobula rotundata, sub  
conacea

hispidus Convolvulus hispidus foliis cordato ovatis acutis, floribus capitatis

Habitat in India orientali <sup>Winnig</sup>  
Tota planta hispida <sup>Corolla multisp</sup> proferens involucria florum et calycis, pili tuberculis minutis  
insidenter. Caulis scaber. Folia cordata, ovata, acuta, ciliolata, pubes-  
centia <sup>sequi pedunculata</sup> pedunculata <sup>axillares</sup> foliis parum brevioribus  
Involucris pentaphyllis, oblonga acuta intus glabra. Florum quinque  
fifles. hispida <sup>facile</sup> <sup>synopitius</sup>  
affinis Sponsoa Samnifolia at corolla nimis parva <sup>habet ut nostram</sup>  
esse potest



14-15 maximus Convolvulus foliis cordatis attenuatis ~~glabris~~, pedunculis multifloris glabris,  
caule piloso.

Tin-Tali Rheed. Mal. II. pag. 109. Tab. 53.

Convolvulus maximus foliis cordatis ovatis acuminatis integerrimis glaber  
rimis, caule petiolisque glaberrimis Lin-Suppl. pag. 137. propter

Habitat in India Syn: Rheedii forte quod hirsutem cultura deposuit.  
orientali hoy Caulis volubilis, pili crassitie filiiemprocti, pilosissimus, propositi ad folia;  
pili longi distantibus raris.

Folia polliciana et ultra, petio lata, glaberrima, simpliciter venosa,  
subtus glaucescentia, attenuata, mucronata

Petiolus folio brevior.

Pedunculus folio <sup>mult</sup> longitudine, 4. vel 8. floris, foliis triplo longior  
crassitie equali: pedicelli vix semiunguiculari, incurvati, basi bracteis  
minuti

Calyx glaber: folioli oblongis, apice rotundatis.

Corolla tubus pollicaris.

Stigma capitatum

(Exacte convenit cum figura horti Malab. citata, nisi quod folia superiora  
in triangulari-hastata in speciminibus meis desunt)

15-16

Anatus Convolvulus foliis cordatis attenuatis glabris, pedunculis foliis longioribus subquadrisyllonis, corollis glabris <sup>adpressis</sup> ~~extus striatis~~.

Habitat in India orientali hinc

Caulis herbaceus, volubilis, pubescens, teres, tenax.

Folia petiolata, bipollicaria, remota, exquisitè cordata, integerrima, attenuata: acuminè ~~rotundata~~, mucronata, utraque glabra, excepto costis, simpliciter venosa.

Petioles longitudine foliorum, pubescentes

Pedunculi foliarij, pubescentes, foliis longiores, tri- vel quadrisylloni: <sup>4-6</sup> alter longior <sup>inter medium brevior</sup> ~~inter medium brevior~~

Alter trisyllonus

pedicelli <sup>laterales</sup> geminati, ~~supra medium ad geniculum bracteati~~ gemino oblongo, concavo, parvo, villosa, decidua parum crassior abtractatis. Bractea gemino ad geniculum in pedicellis laterali bus versus medium, oblonga, concava, parva, villosa, decidua.

Calycis foliola oblonga, obtusa, aequalia, concava, duabus exterioribus villosis, subinaequantibus albis

Corolla <sup>longior</sup> ~~calyce~~ duplo longior, fundo fusco-purpurascens, superne vix quinque lanceolatis dilutionibus finis quinque saturationibus punctis.

Stigma capitatum, bilobum

Campanulatus C.

Alred H. Mal. T. 11. Tab. 56

hastata f. folio serrato hastato pedunculato trifloro  
campanulata *Ipomoea*

• *Cono Rheed-fy. convolvuli speciei* *lex Capom. campanulata*  
*est Heliconia populea*  
60

anceps Convolvulus foliis cordatis obtusis <sup>glabris</sup> caule ~~in~~ <sup>bi</sup>alato  
Convolvulus anceps; foliis cordatis, caule volubili utraque canna  
To lex S. V. pag man. pag. 47

Caule volubili, glabro, <sup>membranis</sup> exalato. Duabus decurrentibus <sup>bas. unguis ter later</sup> bialatus

Folia petiolata, ~~tri~~ <sup>tri</sup> un pollicaria, glabra, venosa, obtusa, integerrima

Petalus longior <sup>sine</sup> pedunculo <sup>folii.</sup> longitudine petiolorum  
Pedunculi axillares, ~~foliis~~ pedunculis, petiolo crassioribus, viriditer  
quadriflori. Pedicelli pedunculo parum pollicares, incrassatis  
subumbellati, uti pedunculus, villosi. Bractea duo ad basin  
calycis, lata, ovata, membranacea, marginata, villosa, decidua.

Calycis foliola duo exteriora, ovata, villosa, unguiculata, marginata  
nata: interiora duplo minor, oblonga

Corolla calycis duplo longior, campanulata.

Stigma acutum

habitat in India orientali

Heyna



relictus? *Convolvulus* foliis cordato ovatis acumatis subtomentosis, pedunculis bifloris  
Habitat in Insula Hainan China Dobl.

Caulis pubescens, superne tomentosis, mollis. Folia cordato ovatis acumatis, basi  
fere parvo emarginata, saepe nullo, inferora villosa, superora tomentosa mollia  
semipollicaria. Petiolus folio dimidio brevior. Pedunculus folio longior, biflo-  
rus. Pedicelli pedunculo dimidio breviores. Folioleae, <sup>duplo</sup> albae exteriore ovata  
acuta, <sup>tomentosa</sup> interna lanceolata.

*Turpetum* Convolvulus foliis cordatis angulatis, caule membranaceo quadrangulati,  
pedunculis multifloris fl. zeyl. 74. S.V. p. 201.

*Tubeth* Garria Acotha Dod.

*Turpetum repens*, foliis althoeae vel indicum Bauh. Pin. 149.

Convolv. zeylanicus alatus maximus, foliis ibisi: non nihil simili libris  
angulosis Herm. Lugd. 677. t. 170. 179.

Habitat in Zeylona herb. Herm. in mus. Lugd.

Cauli quadrilateralis glaber. Folia dentata angulata, incana. Pedunculus nudus  
3-4 florus. Foliolae calycinae ovatae acutae. Corolla alba. Stigma acutum  
Herm. Flor. Lugd. pag. 100

Cauli glaber. Folia subcordata, triangulata, attenuata, glabra acuta  
basi <sup>ibus</sup> dentata 3. 4. inaequalibus, subangulata, coeterum integerrima. Calycis  
foliola ovata, duo exteriora pubescentia: fructiferis grandifloris. Capiti-  
la magnitudine Cerasi.

Cauli angulatus, glaber superne absque membrana decurrente. Folia petiolata  
cordata, attenuata, dentata serrata angulata, supra nervis puberis pallidioribus  
utroque venosa, bipollicaria. juniora villosula. Petioli foliis longiores. Pedun-  
culi axillares foliis breviores: pedicelli 3. intermediis 1 florus. Nervi  
~~subquadriflori~~ crispis absque bractea: laterales biflori. Bractea duo ad  
basin. Bractea duo ad basin Calyx non villosus, oblongus obtusus herb. Herm.



70 <sup>scaber</sup>  
~~scaber~~ Convolvulus foliis hastatis glabris: auriculis dentatis, pedunculis mul-  
tifloris <sup>unicatis</sup>

Habitat in India orientali & Schumacher

Caulis volubilis, teres, glaber. <sup>basiforbicatus</sup>

Folia petiolata, vix pollicina; <sup>basiforbicatus</sup> lobo intermedio lanceolato, integerrimo.

Lobes <sup>basiforbicatus</sup> subrotundi, inaequaliter 4- vel quinque dentatis.

Petiolus filiformis, folio brevior, versus basin sepe submunicatis.

Pedunculus <sup>unicatus</sup> ~~partialis~~, <sup>unicatus</sup> ~~pedicello~~ <sup>unicatus</sup> ~~unicatus~~, <sup>unicatus</sup> ~~unicatus~~, <sup>unicatus</sup> ~~unicatus~~.

~~Pedicelli tres per~~

Pedunculi universales, patenti, pedicelo caespitibus et parum longioris,  
uti partiales <sup>unicatis</sup>, rigidis: partiales ternis; intermedium uniflo-  
rus <sup>unicatis</sup> bis- triflori, floribus pedicellatis

Calycis fo <sup>unicatis</sup> loba oblonga, obtusa, mucronata, aequalia.

Hederaceus Convolvulus foliis cordatis integris trilobisque, corollis indivisi, fructibus erectis L. L. v.  
p. 200

P. annuus, foliis cordatis variis trilobis, calycibus tuberculato pilosis Hort. Clus. p. 67.

P. flore purpureo, calycibus punctato Bell. Eth. 99 v. 83 f. 96 et in f. 97. ~~f. 97~~

Habitat in India q̄so, Africa, America &c.

Caulis ad folia pilosus, scabriusculus. Folia cordata, angulata, triloba, acuta: lobi  
~~obtusiusculi~~ Petiolus longitudine folii interdum tripollicaris. Radiculus folio saepe brevior  
superne raris villosa. Pedicelli tres, laterales biflori, omnes aphylli, basi tantum  
bracteati, unguiculares erecti superne parum crassiores. Calycis foliola  
squalea <sup>capitata</sup> ~~lanicolata~~ <sup>tuberculata</sup> ~~acuminata~~, ad medium pilosa; pili puncti tuberculis  
minutis insidentes. Capsula glabra, ~~calycibus duplo brevior~~  
Significatur a reliquis foliis integris, pedicellis longioribus robustioribus, calycibus  
foliolis minus acuminatis duobus angustioribus. Cultra glabra et eradit  
Semen a triquetra fusco nigra antea pubescentia

semen bus, cubeseentibus

+  
Stigma capitatum

Convolvulus ciliatus, folus cordati ovati acuminatis margine villosis-subciliatis,  
capitulis pedunculo latius hirsutissimis involucriati

Habitat in Cayenna von Rohr

Caulis volubilis, pubescens.

Folia petiolata, remota, bipollicaria, <sup>versum</sup> ~~versum~~ minoro, in acumi-  
ne unguiculari ~~attenuata~~ <sup>producta</sup>, acuta, subnervosa, vix  
venosa, supra glabra, <sup>adpressa villis</sup> ~~subtus pilis~~ raris flavescenti-nitidis ad  
pressis, margine parum villosiora, oculo armato subtus minutim  
punctata.

Petioles filiformes, longitudine foliorum.

Pedunculi axillares, solitarii, petiolo duplo longiores et crassiores,  
pubescentes. Flores plures, sessiles in capitulo. Bractea  
duo extrema sub capitulo ovato-lanceolata, attenuata, longior:  
reliquis inter flores lanceolata, attenuata, longitudine co-  
lyce<sup>um</sup>: omnes pilis ferrugineis adspersa

Calycis foliola subulata, pilis longis ferrugineis a tentibus hirsuta

Simil.

(Habitat ad Convolvulum guayanensem alicuius)

*Convolvulus ciliatus*, foliis cordatis ovatis acuminatis <sup>majoribus</sup> marginibus ~~undulatis~~

657 auriculatus

angustifolius Convolvulus foliis linearibus hastatis obtusis mucronatis glabris, <sup>auriculis integerrimis</sup> ~~pedunculatis~~  
habitat in India Orientali

Caulis filiformis, volubilis glaber, ramosus.

Folia petiolata, pollicaria vel parum ultra, glaberrima, obtusa iam  
mucrone brevi; auriculis lanceolatis, <sup>in semiterngucularibus</sup> acutis interdum, rectis inter  
dum parum reflexis, plerumque integerrimis, rarisime postice  
denticulo obscuro, folio <sup>per se</sup> ~~per se~~ longiores

Pedunculi filiformes; antheri, medio bracteis duabus striatis brevibus

Calycis foliola aequalia, oblonga, glabra  
Corolla angustilobata campanulata, glabra  
Stigma bifidum

angustifol.  
Symbola

versus sinam  
Sape Decet herb.  
Thouar.

Q. japonico Thunbergii differt caule ramoso, foliis obtusis, lobis latera  
libus vix semiterngucularibus, calycis foliolis rotundatis  
nec acutis

Convolvulus auriculatus: foliis linearibus hastatis acuminatis  
auriculis integris caule volubili La Mart. encycl. 3. p. 540  
confer. Plukh. pag. 116. t. 24. fig. 3  
varietatem p. Convolv. a. versis credit La Mart. species  
distincta

hastatus  
Leptiflorus Convolvulus foliis cordato-lanceolatis, floribus ternis subsessilibus, calycibus trilobis <sup>reflexis</sup>

Habitat in India orientali

Caulis <sup>volubilis</sup> pilosus densa attenuato

Folia <sup>oblonga</sup> <sup>petiolata</sup> hastato-lanceolata, glabra; auriculis rotundatis integris

ambo vero

diversa ab Convolvulo hastato <sup>et hastato</sup>

Petiolus folio <sup>duplo</sup> brevior: calycibus <sup>valde acuminatis</sup> attenuatis, reflexis

radice linearis calycis pilosi: foliis ovato-acuminatis, apice patulis, capsula ad basin pediculi longioribus

Culorum florum axillares plerumque terni brevissime pedunculatis  
Capsula globosa pilosa

Et C. hastatus Corolla parva ut semunquiculans

Symb. botanicis refert. C. hastatus Turphi an moderata

differentia ibi non ostendit  
omnino eadem ac hastatus Turphi

hastatus in India occidentali

Est folium Convolvuli cordato ovatis ut foliis longius obtusius productius

23. 24 et <sup>loriatque</sup> ~~navarrei~~ <sup>glaberrimus</sup> Convolvulus foliis cordatis ovatis, axillis tomentosis caule fruticose  
~~glaberrimo~~ pedunculis multifloris  
an maximis tenaci

Habitat in insula franco <sup>rigidus</sup>

Caulis crassus fere penno asperus <sup>rigidus</sup> fusus, glaberrimus  
ut in omnia, axillis exceptis. folia ovato-cordata sub  
<sup>macer</sup> truncata, vel et acuta vel obtusa emarginata, nervosa  
semipalmata petiolo longiora. Pedunculis <sup>longior</sup> ~~longioribus~~  
ne folio <sup>longior</sup> ramosis multifloris squama minuto ovato  
concavo ad basin pedicellorum. Calyces magnitudinis  
ardillano foliolo coriacea rotundata

70 ha flatus Convolvulus <sup>2</sup> Convolvulus  
Convolvulus hastatus; caule volubili, bicubitali, scandente; foliis hastatis bipollicari-  
bus, basi infra unidentatis, pedunculis geminis, semel dichotomis Corph. Def. pag. 203.

Caulis volubilis, pilosus.

Folia petiolata, remota, hastata, lanceolata, integerrima, auriculis rotunda supra  
glabra, subtus villosa. auriculis rotundatis infra postice interdum unidentatis.

Petiolus folio dimidio brevior.

Pedunculi axillares, gemini, petiolo breviores, biflori villosi.

Calycis pilosi; folioli ~~oculis~~ acuminatis, apice patulis.

~~venitatem hujus, ut suspicio, ex India~~



macrocalyx Convolvulus

Convolvulus macrocalyx foliis quinatis oblongo-lanceolatis integerrimis  
pedunculis longissimis racemoso-dichotomis, calycibus scanosis. Fl. Penn  
2. pag. 10. tab. 118. fig. 6.

Habitat in Penna nemoribus 4

glabres. Caulis volubilis, ramosissimus, teres. Folia longe petiolata, quoad  
foliola oblongo-lanceolata, integerrima, interna minora. Petioli basi  
purpurascens, cordati. Pedunculi axillares, longissimi, multi flori  
racemoso-dichotomi, purpurei. Pedicelli bractei duobus oppositis, pube-  
latis, parvi. Calycis magni, exterius purpurascens, fructifer pa-  
rentis. Corolla alba Fl. Penn.

lanceolato oblongo  
foliola externa minora. calycis foliola lanceolata

Cymosus Convolvulus.

Convolvulus cymosus: foliis cordatis, integerrimis, caule filiformi, pedunculis  
multifloris umbellato-cymosis. DC. Per. 2. pag. 9 tab. 117. fig. 6.

Habitat in Peruvia ad versuras.

Caulis teretis, volubilis, pilosusculus, pilis deciduis, ramosus. Folia longe  
petiolata, cordata, sicuta, integerrima, supra nitida. Pedunculi axillares, biflori  
bifidi, 5-11 flori. Flores umbellato-cymosi. Pedicelli inaequales. Bractea subulata  
inter pedicellos. Corolla lactea. DC. l.

calyxis foliola ovata

~~longe folia superiora fere emarginata cum sinu vae reliqua acuta~~  
Pedunculi biseptidi cum pedicello unifloro in dichotomia laterali 4-flori

spec. Anis Convolvulus folio-oblongo-lanceolatis acutis obtuse cordatis  
pedunculis unifloris Wild. spec. pl. pag 046  
Habitat in Siberia? 7

non vid.

cuneatu. Convolv. caule fruticoso erecto, foliis cuneiformibus obtu-  
si mucronati glabris, corymbis axillaribus foliis breviori-  
bus Wild. ~~prodr~~ spe. pl. pag 873.

Habitat in India orientali. 5

Convolvulus nuber, foliis sagittatis glabris emarginatis lobis obtusissimis divaricatis integerrimis, umbellis axillaribus involucriatis, caule piloso.

Habitat in America meridionali von Rohr

Caules volubiles, adspersus punctis piliferis. Stem.

Folia petiolata, bipollicaria, remota, utrinque glabra, venosa, attenuata sagittata: auriculis oblongis, obtusissimis, integerrimis, utrinque ~~divaricatis~~ utrinque glabra, venosa, attenuata, obtusa, apice bifida; laciniis obtusis subdivaricatis.

Petioles sesquipollicares, glabri

Pedunculus longitudine folii, axillaris, petiolo duplo ~~crassior~~. Stems crasser quatuor, umbellati, involucriati, primum subsessiles, demum pedunculati, sensim florentes. Involucrum diphyllum: foliolis oppositis, membranaceis, glabris. Pedicelli pollicares, uniflori. Bracteae oblongae, glabrae, ad basin pedicellorum.

Calycis foliola membranacea, glabra: duo majora, mucronata; tria inter ~~ea~~ minora ab exterioribus vecta.

Corolla Convolvuli purpurei

Litr. I. pag. 153

Convolvulus nammularius, aculosus, foliis cordatis mucronatis, pedunculis multi  
floris foliis longioribus, calycibus ovatis, bracteis lanceolatis  
Habitat in America meridionali. Von Rohr.

Caulis volubilis, teres, uti tota planta villis brevibus vestita, tamen  
non incanis

Folia figur<sup>is</sup> Lysimachia nemorum, petiolata, pinguiculana  
coassiuscula, integerrima, acuta, mucronata, avenia,  
nervosa, secundum nervos sublineata.

Petoli folio triplo breviores, pedunculo dimidio tenuiores.

Pedunculi axillares, solitarii, foliis longiores. Floris subumbel  
latis, breviter pedicellatis, circiter sex. Bractes lanceola  
to

Calycis foliola tria exteriora, foliacea, late ovata, acuminata,  
velosa, duo interiora minima, membranacea, oblonga, acū  
minata.

Corolla campanula, integra non secta

(Affinis Convolvulo nodifloro La Martini Martini, differt foliis  
brevioribus minoribus non tomentoso-incanis, pedunculis  
foliis longioribus, foliolis calycinis majoribus inaequalibus.

Convolvulus nodiflorus, foliis ovatis subcordatisve subtomentosis, pedunculis bifidis multifloris foliis brevioribus.

Convolvulus nodiflorus, foliis ovato acutis subtomentosis mollibus, pedunculis axillaribus multifloris brevissimis. La Martk Encycl.

# 3. pag. 557.

Habitat in insula St. Crucis Pfluz, specimina quoque <sup>inde</sup> misit West.

# Convolvulus albi  
floris West. Baskin.  
over St. & vix pag 271

Caulis, uti tota planta corollis exceptis molliter villosa subtomentosa, volubilis.

Folia petiolata, vix pollicaria, ovata, interdum basi ~~sinu~~ <sup>subcordata</sup>, integerrima, acuta, <sup>acumine breviterminata</sup> ~~ovata~~, supra obscura lineata, subtis magis villosa, subincana.

Petiolus foliis ~~vel~~ triplo vel quadruplo brevior

Pedunculus petiolo brevior, apice bifidus: pedicelli plures, longitudine pedunculi, capillares, basi bracteati. Bractea subulata.

Calycis foliola oblonga, parva, equalia, pallide ferruginea, margine scariosa, villosula, obtusa.

Corolla alba, vix unguicularis: limbus ~~laevi~~ <sup>campanulata</sup>: limbus ~~laevi~~

ter ~~quasi~~ <sup>que</sup> fidus, crenulatus.  
Stigma bifidum

(An *Convolvulus verticillatus* Linnæi? corolla vero non cœrulea nec calycis glabri



Convolvulus quinquepetitus, foliis ovato-oblongis, <sup>extrema angustata</sup> obtusissimis emarginatis mucronatis  
glabris, pedunculi multiflori bifidi folio brevioribus

Convolvulus ovalifolius West. & Knir. over St. Croix pag. 271.

Habitat in insula St. Croix West.

Caulis volubilis, tenuis, ramosus, ore tantis vix villosus: ramuli canescentes.

Folia breviter petiolata, pollicaria vel minor, crassiuscula, ovato-oblonga, <sup>sensim</sup> extorsum versus sensim angustata, basi <sup>utrinque</sup> apiceque rotundata, apice emarginata cum mucrone, supra enervi arenia, subtus nervosa, pagina utraque glabra, integerrima: terella vix villosa.

Petioles supra canaliculati.

Pedunculi, uti pedicelli canescentes, axillares, solitarii, plerumque folio breviores, rami longitudine ~~seu~~ <sup>seu</sup> eju'dem, bifidi: rami singulis subexfloris. Flores parvi. Bractea imunda.

Calycis foliola glabra, ovata, ferruginea, aequalia.

Corolla campanulata, semiunguiculari, glabra, profunde quinquefida.

Stylus <sup>da.</sup> longitudine corollae. Stigma capitatum, lobatum.



Convolvulus cissoides, foliis quinato-digitatis oblongis dentatis glabris, caule petioli pa  
dunculis que subani flori hispidis

Convolvulus cissoides, hirsutus: foliis quinato-digitatis dentatis; pedunculis  
subnifloris, foliis brevioribus, calyce hispido La Marti. Tableau Ency  
clap. pag. 462.

Habitat in Cayena von Rohr.

Paulis volubili, teres, pilis longis patentibus imis adspersis.

Folia petiolata remota: foliola sessilia, oblonga, utrinque acuta,  
mucronata, obtusa <sup>ad apicem</sup> dentata, basi versus integerrima, otulo armato  
marginè villis minutis, tenuissime nervosa: intermedium vix pollicaris,  
reliqua latius; lateralìa sensim minora.

Petioli pollicares.

Pedunculi longitudine petioli: bractea duo, parva, lineari, versus apicem  
pedunculi

Calix foliolis lanceolatis, basi pilis longis raris hispidis.

Corolla pollicari, glabra

nummularis <sup>villosus</sup> Conv. ~~fulvis~~ foliis cordatis ~~acutis~~ <sup>obtusis</sup> pedunculatis pedunculis  
 axillaribus multifloris, <sup>foliis longioribus</sup> floribus calycibus confertis bracteisque ovatis  
 Habitat in amena meridionali v. <sup>terris ubi tota planta velis</sup> ~~terris ubi tota planta velis~~  
 affinis Conv. nodiflora. ~~Calycibus velabulis foliis angustioribus~~ <sup>bracteis ovatis</sup>  
~~ta <sup>secundum</sup> ~~arvensi~~ pedunculi foliis longioribus~~ <sup>bracteis ovatis</sup>  
 utique foliola calycis ovata. <sup>ovis</sup> ~~ovata~~ <sup>ovata</sup> ~~ovata~~ <sup>ovata</sup> ~~ovata~~ <sup>ovata</sup> ~~ovata~~ <sup>ovata</sup> ~~ovata~~ <sup>ovata</sup>  
 culam glabra.

Petroti foliis  
 triplis brevioris

Calycis foliola 3 exteriora lates ovata villosa <sup>acuminata</sup> ~~duo~~  
 interiora <sup>membra</sup> ~~membrum~~ breviora <sup>acuminata</sup> ~~duo~~  
 Florit. bracteis petrotis <sup>La Martini</sup> ~~pedunculatis~~ <sup>dentatis</sup>  
 affinis Conv. nodiflora. at folia breviora basi cordata <sup>membrum</sup>  
 villosis <sup>neg. habet omnino villosis</sup> pedunculi foliis longioribus  
 involucri et bracteis lanceolatis  
 foliola calycis 30 exteriora confertis foliis cu  
 majora nec omnia equalia breviora <sup>do</sup> ~~marginis~~ <sup>marginis</sup> ~~marginis~~ <sup>marginis</sup> ~~marginis~~ <sup>marginis</sup> ~~marginis~~ <sup>marginis</sup>  
 folia per hysm. ~~reponunt~~

Convolvulus quinque folius, foliis digitatis lanceolatis dentatis glabris, pedun-  
culis subtrifloris

Convolvulus quinque folius glaber americanus Plukn. alm. 116.  
tab. 167. fig. 6.

# Convolvulus quinque folius, foliis digitatis glabris dentatis, pedun-  
culis lobatis Len. Syst. Veget. pag. 202. Swartz. observat.  
pag. 63.

# Convolvulus pentaphyllus, foliis glabris, dentatis, vitibus hirsu-  
tis Plum. Cat. pag. 1. Ic. pag. 80. tab. 91. fig. 2.

Convolvulus quinque folius, foliis digitatis, glabris, dentatis;  
caule hispido; pedunculis multifloris. Lo Mart. Encycl.  
3. pag. 566.

Caules striati, partem infra et supra in sectionem foliorum puncti  
si minutis mucronatis quibus insident pili longi, coeternum  
inter folia glabres.

Folium intermedium sesquipollicare, reliqua sensim decrescentia  
Pedunculi plerumque triflori. pedicellus intermediis crassior  
verte



Convolvulus

Convolvulus incarnatus, foliis sagittatis oblongis acuminatis glabris: lobis divariatis acutis integerrimis pedunculis unifloris.

Habitat in Curassao. von Rohr

Caules volubiles, uti tota planta glaber.

Folia petiolata, sesquipollicaria, integerrima, tenuissima nervosa, subavenia, subtus subglaucescentia.

Petioles pollicares, filiformes.

Pedunculi petiolo longiores et crassiores, uniflori. Bractea, duo alterna lanceolata, parva, versus basin pedunculi.

Calycis foliola lanceolata, striata, <sup>et canosa</sup> semipollicaria, <sup>albido</sup> flavescentia, acuta, ~~in~~ <sup>exteriora</sup> semipollicaria; <sup>et canosa</sup> exteriora margine <sup>et canosa</sup>; interiora duo parum angustiora

Corolla magnitudine Convolvuli purpurei, campanulata.

a Convolvulo avensis differt aunculis ovatis acutis divariatis, apice apice pleorum longe attenuato, bracteis ad basin pedunculorum, floribus majoribus.

a Convolvulo Wheleri aunculis acutis nec rotundatis, foliolis calycinis longioribus ~~obtusis~~ acutis nec obtusis





hasanensis Convolvulus foliis ovatis obtusis nitidis glabris.

Habitat in littoribus Herano

Herbacea ramosissima altitudine hominis tota glabra. Stipulae oblongae, obtusae  
summae, nitidae semipollicariae interdum longiora. Pedunculi uni flori  
foliis duplo brevioris. Flores albi parvi. Tubus calyce vix longior. Laciniae  
5 fideus ~~caeruleis~~ lineantibus reflexis. Jacq. Strep. Amer. p. 34.

non vidi

Indentatus *Convolvulus* foliis cuneiformibus indentatis truncatis, basi dilatata  
dentatis, pedunculis unifloris Hort. Kew. 1. p. 20 d.

*Sedera laevi* Rheed Mal. 11. p. 133. t. 65.

*Convolvulus indicus barbatus minor*, foliorum apicibus lunulatis  
Pluken. alm. 117. t. 276. fig. 5.

*Evolvulus Indentatus*

Lin. Spec. pl. pag. 392

Burm. ind. 77. t. 16. fig. 3.

Habitat in India orientali ☉

Arenarius Convolvulus, foliis oblongis emarginatis basi lobatis inaequalibus pedunculis  
 unifloris, caudis <sup>tubulosis</sup> infundibuliformibus, caule repente decumbente  
 Habitat in Angulis Aronicis.

<sup>Tota</sup>  
Caulis planta teris.

Caulis <sup>volubilis</sup> decumbens, filiformis, per perspicuus, flexuosi

Folia congesta, petiolata, oblonga, apice valde emarginata, basi <sup>obtusis</sup> sive  
 lobulo rotundata <sup>in pedunculis</sup> aucta, <sup>in pedunculis</sup> ~~per~~ pallidiora, semiangulata  
 Petioli foliis longior.

Pedunculi bini vel solitarii, axillares longit. petiolum squantes.

Calyx foliola squalia, oblonga, ~~frab~~ membranacea

Corolla sesqui tubuli <sup>superna</sup> sensim parum ampliatas, sesqui pollicari

(Taxis omnis procedenti sed longior, folia plura congesta ~~in~~ <sup>in</sup> caulis  
 decumbens, praecipue vero differt corollis tubulosis non vero campanulatis ut in C. Imperati  
Stigma capitatum

nitidus. C. foliis ovalibus nitidis subtus albo fereis, pedunculis unis  
petiolo brevioribus La Mart. Encycl.

Habitat in Philippinis

Caulis teres. Cognosce volubilis fere glaber. Rami, petioli, folia caly-  
cis pedunculi vellis fereis teris. Folia acuta, petiolo dimidio  
longiora, utraque villosa subtus fereis  $3\frac{1}{2}$  pollicari nervi 7-8  
obliqui. Pedunculi axillares solitarii, petioli breviores medio basi  
teris binis. Calycis foliola ovata duo interiora parva corolla  
by pollicares

1 flom

non vidi

Flavicomus Convolvulus pelosus, foliis sagittato-oblongis obtusis: auriculis dentatis  
angulatis, pedunculis unifloris

Habitat in oreata ca

Totus pelosus excepto corolla.

Stem oblonga, pollicaria obtusa, basi sagittata, auriculis brevibus  
et vix dentatis angulatis, ultima densius pelosa, mollia  
pilis flavis scabris

Pedunculus foliis duplo longior, supra medium bracteis geminis  
setaceis, semiunguicularibus.

Calycis foliola ovato-lanceolata

Corolla Convol. arvensis at. Duplo major

Stigmata duo lineana

arvensis Convolvulus foliis sagittatis utraque acatis, pedunculis subunifloris L. S. V. pag.  
200.

Volubilis minor Træg.

Convolvulus minor purpureus Cob.

Convolvulus minor arvensis Bauh. Pin. 294.

Habitat in Europa agnis 2.

Tota glabra Caulis filiformis folia sagittata lanceolata sagittata auricula  
lanceolata acuta parum extrosum sessi petiolo triplo longiora. Pedunculi  
foliis duplo longioris medio bracteis binis setaceis calycis foliola oblonga  
obtus. Stigma bifidum

sagittato-lanceolatus

varietatem vidi in herb. Guss. foliis subhastatis

, nulla in arvensem transit teste Tournef. Convol. pag.

1 Convolvulus minimus, angusto auriculato folio Boerh. mus. 33. Differre videtur foliis hastatis habitum  
4 folia, 15 annis. pat. unculi 1 flori

Convolvulus minimus, angusto, brevi, subrotundo folio Boerh. mus. p. 44. Tab. 33. Sicula

sequim Convolvulus foliis sagittatis, peltatis truncatis, pedunculis tetragonis unifloris L. S. V. pag  
261

Volubilis Brunfelsii latifolia Fallop.

Imulae lenis major L.

lenis major Lebel.

Convolvulus major albus Bauh. Pin 294.

Habitat in Europa <sup>duplo</sup> 4

Caulis proce et omnia <sup>duplo</sup> major quam in proce, totus glaber. foliorum  
auricula rotundata obtusa peltata obliqua. Pedunculus longitudine folii  
calycis foliola <sup>exteriora</sup> <sup>interiora</sup> venosa lanceolata ovata acuta

— orati

23 Whelen Convolvulus <sup>Convolvulus</sup> foliis sagittatis <sup>sub</sup> peltatis rotundatis, <sup>integris</sup> pedunculis teretibus  
unifloris folioli calycinis oblongis mucis

Convolvulus sagittaria foliis, flore purpureo. Plukn. alm. p. 113.  
Tab. 85. fig. 3. Tournef. G. R. 4. p. 82. fide herb. Plukn.  
9 Habitat in Hispania juxta lacum La Albufera Valentis

Affinis Conv. sepium, tota glabra

Folia sagittata, sequi pollicaria, acuta

Petiolus longitudine foliorum.

Pedunculus petiolo brevior, crassior, versus medium bracteatus.

sub flore crassior

Calycis <sup>sub florae</sup> ~~folioli~~ <sup>bracteis</sup> ~~folioli~~ oblonga, duo maxima minora, omnia subrotunda,  
mucronata

Corolla Conv. sepium.

Stigma capitatum.

Variat foliis ovatis auriculis vatis brevioribus rotundatis et  
lanceolatis, auriculis parum divaricatis lanceolatis  
in eadem planta. Convolvulus sepium differt auriculis sublongis  
latis, pedunculis setigeris, bracteis cordatis magnis ad basin calycis.

9 Ipomoea sagittata: foliis sagittatis, pedunculis unifloris  
Poir. d. 2. p. 160. Tab. 3



10-11  
29

Bellardi: Plantago foliis linear-lanceolatis, pilosis scapo tereti hispido albioribus,

Spica ovata erecta

+ Plantago Bellardi pubescens foliis sublineariobtus planis, petiolatis, scapo tereti foliorum longitudine spica cylindrica all. fl. Ped. pag. n. 300 tab. 85.

fig. 3.

legi pasperi in aridis Turæti

Planta parva sæpe vix pollicari, interdum sequi pollicari

Folia radicalia, plura linear lanceolata, acuta & inferne attenuata  
affinis <sup>na</sup> trinevosa pilosa, & pollicaria sæpe in alia minore alla longiora

Scapus erectus, foliis majoribus brevior, valde hispitus: hispitis foveide flavo

Spica ovata vel ovata-oblonga, hispita, longitudine dimidii scapi

Bractea lanceolata attenuata  $\frac{1}{2}$  longitudine calycis

laciniis Corolla lanceolata

Affinis P. cretica

~~Plantago~~ Holosteum salmanticum pupillum annuum Gustav vrid.  
Lef. in Paji Syll. fl. ex. Bot. pag. 3 & 2. fide herbarii Pet. Wenam

Plantago lanceolata lanata foliis linear-lanceolatis integer  
rimis pilosis scapis imisque pilosis lanatis petalis acutis  
Lam. Poir. v. 2. pag. 174

*Galium* *B. folis sagittati* *posteriori* *truncati* *petiolati*  
*refo. ind.*

*non vid.*

Sagittatus Convolvulus foliis cordatis sagittato cordatis, pedunculis unifloris  
foliis <sup>foliis</sup> calycibus oblongis, mucronatis

Habitat in Ampela maki Houm

Totus glaber.

Folia sesqui pollicaria, pendentia, sagittato-cordata, obtusa, <sup>denticulo</sup> mucronata; lobi postice rotundati antice acuti.

Petiolus folio fere longior.

Pedunculus solitarius, uniflorus, petiolo brevior, medio <sup>at crassior</sup> bracteis geminis, deciduis.

Calycis foliola oblonga, mucronata, obtusa, subaequalia

Corolla magnitudine Corv. purpurei

Convolvulus denticulatus foliis cordatis lobis denticulis denticulo ex  
trorsum notatis, pedunculis unifloris calyce brevi La Marti pag

450

Scifi longiflorus Convolvulus foliis cordato-lanceolatis, floribus ternis subsessilibus, calycibus  
vellosis.

Habitat in Cayena König

Caule pilosiusculo. Folia lanceolata, serrata, glabra integerrima  
culis rotundatis integerrimis. Calycis Petiolus folio duplo brevior

Calycis pilosi folioli ovato acuminatis apice patulis, capsula  
longioribus.

refert hastatum ~~Forst.~~ forte varietas

polliciana

trinervis *Convolvulus* foliis cordatis oblongis glabris trinerviis, caule volubili  
terati, pedunculis unifloris Thunb. fl. Cap. p. 88. \* S. V. p. 201.

Habitat in Caponia

(singulare in *Convolvulus*)  
Caulis filiformis glaber. Folia opposita, petiolata, cordata, ovata oblonga, acuminata  
trinervia, subtus pallidiora glabra, pollicaria. Petioli linearis, glaber  
unguiculari. Flores solitarii vel trii, subsessili. Calyx 5-partitus lacinis  
carnicolatis setaceis, glabris, longitudine dimidia corollae. Corolla purpurea

stylus bifidus. Stigmata duo capitata Thunb. l. c.  
an huius generis cum foliis opposita?

— oppositi

teliofolius C. foliis cordatis rotundatis <sup>vello</sup> Venellis incanis foliolo calycis  
oblongis oblongissimis, caule fruticoso

Com. Teliofolius fruticosus, foliis cordatis rotundatis junioribus sub  
tomentosis flore fructuque maximo La Marti Enypt. 3.

pag. 544.

Habitat in Ampula Francia et Cap. b. spec. in Thonin 5  
super tomento <sup>incanus</sup>  
caulis glaber volubilis. Folia petiolata, 3-4 polliciana per  
minora integerrima latitudine et longitudine <sup>proprium</sup> fere aequalia  
pennis nervosa venosa, obtusa juniora <sup>subtomentosa</sup> vello  
tenella incan. Petiolus incanus folis brevior. Pediculi  
axillares solitarii, breves Corolla tripolliciana glabra, <sup>com</sup>  
cylindrico-companulata. Stigma capitatum bilobum. Capsula  
bilobulana

non florus

fibinius Convolvulus foliis cordatis acuminatis lobibus, pedunculis unifloris Mart. 203. \*

L. S. V. pag. 200

Convolvulus rupestris Pall. 41. pag. Tom. 3. pag. 37 tab. 11.

Habitat in Siberia ~~obtusatus~~ <sup>integerrima</sup>

~~Folia glabra. Folia cordata acuminata, lobes postice rotundata, sesquipollicariis. Petiolus longitudine folii. Pedunculi uniflori petiolo quadruplo breviores. Foliola calycina oblonga acuta. Corolla infundibuliformis. Calycis triplo longior.~~

~~Differt a precedentibus foliis lato cordatis, <sup>integerrimis</sup> pedunculis brevibus. Corolla infundibuliformi. C. arvensis dimidio minor.~~

~~Ripulae parvae verticales obliquae per caulem decurrentes Lin. L. C.~~

Folia glabra. Caulis teretis, 4-5. 6 angulatus; angulis membranaceis. Folia cordata, vix repanda, <sup>obtusata</sup> ~~obtusata~~ lobata, subtus pallidiora, acuminata; acumini longitudine folii. Petiolus <sup>obtusatus</sup> dimidio brevioris, supra canaliculati. Ripulae parvae verticales, obliquae per caulem decurrentes. Pedunculi petiolo breviores, tetragoni bifidi, biflori, in <sup>extrema</sup> ~~extrema~~ <sup>apice</sup> cauli uniflori, intrascati, tribasidi in uniflori. Calyx ovatus, acutus. Corolla alba ~~si fibinius Convolv. arvensis dimidio minor, plicata, fundo flavescente Lin. Pallas L. C.~~

Stigma bifidum non vid:

pediculus  
betula

♀ folus cordatis acuminatis <sup>subtus glaucis</sup> cauleque glabro pedunculi  
uniflori.

~~Specimen a Triflora folus subrotundo lobatis integris Forst. n. 44.~~

Habitat in Arabia

Specimen haec nullum perfectum inveni. Folia pollicari  
remotissima petiolo breviora. Pedunculi filiformes medio  
bibracteati.



15-16

Obscurus Convolvulus foliis cordatis acuminatis, pedunculis filiformibus uni-  
floris calycibusque glabris, caule hispido sericeo

Convolvulus Obscurus: foliis cordatis indivisi, caule <sup>pub</sup> pubescente, pedun-  
culis incrassatis unifloris, calycibus glabris Lin. Spec. pl. pag  
220. H. Linné Pflanz: syst. Tom. 5. pag. 524. Tab. 42. fig. 1.

Habitat in India Orientali dedit Dr. Burman.

Caulis <sup>volubilis, herbaceus</sup> hispide molli denso lectus.

Fructus  
Inflores

Folia pollicaria, glaberrima, ~~ut in aliqua planta~~  
Petiolus filiformis, folio longior, versus apicem parum glaber.

an d. ill. eadem Peduncululus axillaris, solitarius, folio duplo longior, filiformis,  
at Burmanni superius versus apicem parum incrassatus fol. bractea duos minuta,  
et Houttuyni sub flore parum incrassatus.

Calyx parvus, foliolis acutis, glabris  
Corolla <sup>pollicaria</sup> (calyce) multo major, glabra  
Stigma capitatum

Plantae consentit planta nostra cum descriptione C. Obscuri Spec: plan  
tanum et ab omnibus reliquis Convolvulis differt, deoque mirum quod  
in Systemate Veget. omittitur. Figura Houttuyni ~~foliis~~ <sup>incom</sup> ~~non nisi quod foli~~  
~~in parte minoris pinguentur~~ veris

77 76

(bona quoad folia, flores vero justo minori depicto sunt)

*Leucanthes* D. foliis cordatis acuminatis, pedunculis bracteatis, petiolo  
pennatis Encyclop. pag.  
*Fernoxia leucantha* Tuck. coll. 2. p. 200.

Habitat in America merid. C

Caulis ramosus volubilis, 4 pedalis gracilis teres inferne foedera purpurascens et  
pubescent. Folia cordata acuminata obtusa, calazerrima vel obtuse repanda  
petiolata, glabra. Pedunculi axillares solitarii erecti, teretes glabri, polli-  
cari, uniflori. Calyx & folioli oblongi acuminati pilis raris prosertum in  
ferne ciliati. Corolla nivea <sup>caputabuliformi erecti</sup> germe pilis coronatum. Capsula bilobula  
nuda apice pilosa. Stigma capitatum bilobum

michi nota

reflexus Convolvulus foliis cordatis <sup>tenuatis</sup> ~~acuminatis~~ glabris, pedunculis ~~unifloris~~  
<sup>reflexis</sup>  
ni, fructibus <sup>cernis</sup> cernis, caule piloso.

Habitat in Madagascar.

Caules <sup>resque petiolis</sup> ad ~~folia~~ pilosus

Folia cordata, <sup>tenuata</sup> acuminata, glabra, obscure nervosa, sesqui-polluciana

Pedunculus longitudine folii, uniflorus, medio bracteatus, supra bracteam ~~nervosus~~, reflexus.

Calycis foliola ovata, acuta



Sylvestris Convolvulus foliis cordatis vellosis: basi angulato-sublobatis, pedunculis uni-  
floris foliolis exterioribus calycis bracteiformibus.

Habitat in India Orientali in Schumacher.

Corolla alba, fundo purpureo-violaceo, <sup>in decedenti,</sup> extus pilosa.

Bractea, calyces, et corolla ~~inferiori~~, differens vero.

Caulis vellosus.

Folium basi cordatis, acutis, mucronatis, minime attenuatis, longitudine et latitu-

di fere aequalibus, basi inferne 1.2. fere tri subtrilobatis, utrinque vellosis

subtus molliter vellosis canescentibus, absque venosis: junioribus sericeis.  
Pedunculi longioribus.

*Galappa* Convolvuli foliis difformibus; cordatis angulatis oblongis lanceolatis que,  
caule volubili, pedunculis unifloris Mart. 43. S. V. p. 201.

*Bryonia methuaria* - *Wigniana* Bauh. Pin. p. 298. Prodr. 137. Bauh. h. 151.

*Galapium methuaria* nympha Dale Pharmoc. 201

*Convolvulus americanus galapium de Linc.* 724.

*Convol. foliis variis, pedunculis unifloris, radice tuberosa* Mill. Dict.  
n. 32.

Habitat in Mexico, vera cinerea 4

Caulis triangulari. folia glabra longe petiolata. Corolla magnitudinis et figurae

*Convolvuli sepium*. semina tomentosa

*Galappa* Q. caule volubili, foliis ovatis subcordatis obtusis obsolete repandis subtus  
vellosis pedunculis unifloris Hort. kew. 1. p. 211.

confertus Mill. Dict.  
non vid.

09 bracteatus Convolvulus foliis cordatis trilobis hastatis attenuatis, pedunculis unifloris: foliolis exterioribus calycis bracteisformibus.

Habitat in India orientali Nonis

Caulis herbaceus, volubilis, adspersus pilis brevibus <sup>longis</sup> raris

Folia petiolata, bipollicaria, cordata int glabra, subtus venosa. Lobo intermedio lanceolato, attenuato, integerrimo, mucronato

et supra  
publobatis

Laterearibus latioribus sursum rotundatis lateribus retusis. <sup>integrisque lobis sub</sup> <sup>obtusis</sup>  
Petiolus folio brevior, pubescens

Pedunculus longitudine petioli solitarius, uniflorus, superne <sup>bracteis</sup> <sup>nanis, infra calycem</sup> <sup>bracteis</sup> <sup>duo, opposita, lanceolato, acuto.</sup>

Calycis pubescentes: foliola duo exteriora ~~exteriora~~ ~~adstantes~~  
interioribus multo latiora, oblonga obtusiuscula, nervosa,  
pubescentia: interiora ab exterioribus inclusis quasi inter  
duas bracteis <sup>bivari</sup> lanceolata <sup>latera</sup> parum breviora

Corolla extus villosa: limbo quinquefido <sup>Vanellia africana</sup>

Stigma capitatum, bilobum



*C. plataniifolia,*

Figura foliorum fere eadem ac in ~~insequente~~ auricula vero non  
dentata sed lateribus sine obtuso reflexo, peduncululi uniflori  
nec bi-<sup>3</sup> triflori, differt vero <sup>2</sup> praecipue ~~foliis~~ <sup>calycibus</sup> duabus calycibus exteri-  
bus latis.

pubescens

Trilobus Convolvulus foliis cordatis, trilobis, cauleque villosi, pedunculis ~~compositis~~  
foliis longioribus, foliolo calycinis ovato lanceolato

Habitat in Insula Francia Commenor deo. de Thourin  
facies Conv. hederacei

Calycis reversi pilosi, apice tomentoso sericeo.

Dolca pollicari, cordata, omnia triloba, utraque villosa, mollis,  
viridica: lobis ovatis.

Petioles pilosi, longitudine foliorum.

Pedunculi longitudine foliorum: bractea supra medium pedunculi,  
lanceolata

Calycis foliola tria exteriora, ovato lanceolata, villosa.

Corolla purpurea limbo <sup>inopulchris</sup> quaque lobo radiis lanceolatis

(a confimelibus differt foliis omnibus lobatis: a C. carolino calycis  
fimbriato piloso: a C. hederaceo et nel pili calycis tuberculo non in fimbria  
tribus, pedunculi uniflori. ~~et C. nitidissimo corollis integris~~  
<sup>et ille americanus.</sup>  
astronoea pubescens la Martini vel Convolvulus carolinus

flavicomis *Convolvulus pilosus*, foliis sagittato oblongis obtusis: auriculis dentato-angulatis, pedunculis  
uni flori.

Patria ignota

Tota pilosa; corolla caecata. Folia oblonga, obtusa, pollicaria basi <sup>in angulo sagitta</sup>  
<sup>ta auriculi brevis</sup> extrofum <sup>in angulo pilosus</sup> dentato-angulatis; ultima <sup>in angulo pilosus</sup> pelotata, mollis  
pedunculis <sup>in angulo pilosus</sup> foliis duplo longior, supra medium bracteis geminis setaceis feminea  
guicularibus. Calycis foliola ovato-lanceolata. Corolla con. arvensi ad duplo  
major. Stigma bifidum-linearis.

tomentosus Convolvulus foliis trilobis tomentosis, caule lanuginoso F.V. pag. 202.

C. jamaicensis trilobus, foliis tomentosa lanugine densiori ac veluti in partibus retrorsive  
obductis Pluk. alm. 115. t. 167. f. 24.

C. foliis lanato in tres lacinas duris, flore oblongo purpureo Sloan jam. 55. h. t. p. 129  
f. 90. f. 2. Raii suppl. 3. 11.

Habitat in jamaica

uniflorus

conf. Sloane

non vid:

affinis P foliis stobis cauleque pilosis pedunculis unifloris calycibus  
hispidi

*Thymus* sp. abra. caule volubili foliis axillaribus solitariis, comles  
foliis stobatis utraque sp. abra. Forst. descr. pag. 44

Habitat in Arabia

C. *hederae* affinis lobi ovati uti petioli, caulis pedunculi  
pili longi reversi adpressi Calycis lacinae subulatae.

bract. 2. duo lineares in medio pedunculi pedunculi petro  
lo breviori. Stigma capitatum