

Convolvulus

- 44. parviflorus C. foliis cordatis acuminatis glabris, pedunculis multifloris calycibusque acuminatis villosis.
- 45. coelestis C. foliis cordatis acuminatis spinis pubescentibus, pedunculis elongatis umbellatis trifidis
- 46. ^{part. auctor.} color C. foliis cordato-ovatis, pedunculis bifidis multifloris: foliis calycibusque ovatis acutis villosis.
- 47. hippidus C. hispidissimus, foliis cordato-ovatis, pedunculis multifloris pedicellis umbellatis.
- 48. pubescens C. foliis cauleque molliter pubescentibus, pedunculis bifidis multifloris
- 49. malabaricus C. foliis cordatis glabris, caule perenni villosis ^{intergerminis} floribus capitatis
- 50. capitatus C. hippidus, foliis cordato-ovatis, floribus capitatis
- 51. ^{semihispidus} guianensis C. foliis ovatis subrepandis caule que tomentosis, floribus capitatis
- 52. canariensis C. foliis cordatis pubescentibus, caule perenni villosis, pedunculis multifloris
- 53. mucronatus C. foliis cordatis, pedunculis inaequalibus calycibusque lobatis. caule mucronato.

longis
 inflo
 culis
 villosis
 sub
 his
 aliis pa
 rtem

54. anceps C. foliis cordatis caule utroque carinato.
 + 55. trilobus C. foliis cordatis subvelloso, pedunculis multifloris, caule tralato
 56. turpethum C. foliis cordatis angulatis, caule membranaceo quadrangulari,
 pedunculis multifloris
 57. grandiflorus C. foliis cordatis ovatis obtusis basi integerrimis, pedunculis subbi-
 floris, calycibus coriaceis, caule petiolisque pubescentibus
 58. coriaceus C. foliis cordatis ovatis glaberrimis, axillis tomentosis, caule fruticose
 pedunculis quinquefloris glabris
 59. maximus C. foliis cordatis ovatis acuminatis integerrimis, caule petiolisque glaber-
 rimo
 60. trinervis C. foliis cordatis oblongis glabris trinerviis, caule tereti, pedunculis
 unifloris
 61. peltatus C. foliis peltatis undulatis pedunculis multifloris
 62. palappa C. foliis ovatis subcordatis obtusis obsolete repandis subtus velloso,
 pedunculis unifloris
 63. senecius C. foliis lanceolato-ellipticis subtus tomentoso seneciei, pedunculis
 subumbellatis, calycibus pilosis
 vel 64. tomentosus C. foliis trilobis tomentosis, caule lanuginoso
 65. althooides C. foliis seneciei inferioribus cordatis sinuato-dentatis superioribus
 palmatis quinquepartitis, pedunculis unifloris

- (59-60) 66. *hirsutus* foliis cordati subtus tomentoso-sericeis, pedunculis petiolo longioribus umbelliferis, calycibus acutis
67. *cinereus* C. foliis palmatis glabris serrulatis, foliis foliiformibus palmatis, axillis tomentosis, calycibus paniculatis lobibus
68. *capillaris* C. villosus foliis septem partitis linearibus dentatis, pedunculis unifloris
69. *viridis* C. foliis palmatis quinque lobis glabris dentatis, caule piloso, pedunculis multifloris
70. *dissectus* C. foliis palmatis septem partitis dentato-serratis glabris, caule piloso, pedunculis unifloris
71. *venosus* C. foliis palmatis quinque partitis lobis foliiformibus, pedunculis quadrifloris
72. *macrocarpus* C. foliis palmatis pedatis quinque partitis, pedunculis unifloris
73. *paniculatus* C. foliis palmatis lobis 7 ovatis acutis integerrimis, pedunculis paniculatis
74. *glaber* C. foliis digitato-quinatis glabris integerrimis, caule quoque glabro, pedunculis trifloris
75. *macrocarpus* C. foliis digitatis septenis repandis integerrimis, caule glabro, pedunculis trifloris
76. *quinquefolius* C. foliis digitatis glabris dentatis, pedunculis lobatis

77. pentaphyllus C. foliis digitatis quinis vel septis integerrimis, caule calycibusque

hirsutis

78. mucronatus C. foliis palmato pedatis, lobis ciliatis, apice mucronatis,

pedunculis unifloris.

hirsutis

(62-63) 99. ~~mucronatus~~ C. foliis ovatis obtusis nitidis glabris, pedunculis unifloris

6. florus *Convolvulus foliis cordatis pubescentibus, pedunculis geminis, corollis lobis
trifidis* Sp. pl. 1668. * L. V. p. 201

Habitat in China ☉

Caulis pilosus basi ramosus, magnitudine arvensis. Folia cordata oblonga, utraque pu-
bescentia. Petioli teretes, pilosi, foliis breviores. Pedunculi gemini hirti, basi appropin-
quati fere in unum, pediculis breviores. Calycis foliola duo exteriora cordato oblonga,
duobus interius linearibus lanceolatis, quinto semicordato. Corolla albo, campanulata
quinquefida, pluriata, parva: lobis apice trifidis: medio minore. Tubus calycis brevis
stigmatata duo, ca. petala lin. sp. l. c.

Vnfr. C. foliis lineantibus subpinnatis, floribus sessilibus: petalis undatis, caule
fruticoso. L. V

Leucogon minus Cavendish folio, obsoleto flore Borl. mus 14 P. V. 111.

Barrel. u. 803

Leucogon minus, brevifloris, obsoleto flore Barrel. u. 999. n. 2.

Habitat in Hispania, Italia, Montpellier

Planta vix pedalis tota tomentosa virens interdum adpressis punctis
flavescentibus copiosi arisios apice inter sepe defunt. folia
lineant lanceolata basi attenuata dentibus quatuor 2.3 utrinque
magnis sinuatis obtusiuscula. Racemus pili stellati. Racemus
terminalis elongatus. petala linearia vix flavescencia cum
camena longitudine calycis. Siliqua bipollicari apice tricu
spidato sagittato

varia foliis angustioribus integris adha Barrel. Lym. 803

huc ad hanc varietatem referenda forte specie diversa cum
cupides siliquis non retrosum spectant.

lineari lanceolata sinuatis integris
siliquis apice sagittatis caule fruticoso

ad de indeynfolus

muniatu involvulus foliis cordatis, pedunculis ⁱⁿcrasatis, calycibusque lobatis,
caule ^{muniatu} mans. 44 * P. V. p. 201

Habitat in Suraba.

Caulis ^{stratus petioli} et pedunculi adpersi ^{pedunculi} aculeis minutis minutis inermibus, interdum
absque ^{et} in uno alterove ^{petiolo} ^{stratum} petiolo. Folia cordata obtusa, nervosa glabra
pollicaria. Petioli folio longior. Pedunculus longitudine ^{foliarum} petioli
supra medium bracteatus si uniflorus, interdum biflorus s. triflorus
tum bractea ad apicem et duo in medio pedicelli. Bractea ovata acumi-
nata. Calycis foliola duo exteriora interioribus dimidio breviora nigra
omnia oblonga apice rotundata. Corolla cor. purpurei

periplocaifolium P. foliis cordatis ovatis attenuatis glabris, pedunculis trifloris apice
apice bracteis duobus foliaceis calyci

Habitat in India occidentali

Caulis teres glaber volubilis. foliis ~~op~~ utraque glabra sequi
peltata adulta obtusa cum mucrone, integerrima
Pedunculis est atillis foliorum ramulorum foliis longiores
apice bracteis lanceolatis 2. seminaque lobis longitudine
florum. Calyci floris brevis pedicellati intermedium primum
floris. Calycis foliola extensa vix unguiculata attenua
ta. Capsula ovata longitudine calycis biloculari semina 2 in
pungulo loculo glabra in quatuor doiso converta magna ope lentis
dentata
affinis pentha

~~herbat. thymifolium~~

grandifloris Convolvulus foliis cordatis ovatis obtusiusculis integerrimis, pedunculatis
subbifloris; calycibus coriaceis; caule petiolisque pubescentibus L. Suppl

p. 136 * S.V. p. 201. Gaëq. Hort. V. 3. t. 69.

Convoli maximus; femina hirsuta Herm. mus.

Munda-valli Rheid. Mal. II. p. 103. t. 50.

Habita intra finetam ad littora fluminum Tanphaurty

Ochroleuca ^{pubescens} ~~villosa~~, foliis cordatis acuminatis, pedicellis ternis lobis
tubo biflori

Apocynum triflorum foliis cordatis acuminatis glabris, pedunculis
trifloris Forst. descr. pag. 44

Habitat in arboribus

Caulis pubescens. Folia petiolata subtus pallidiora vena
utroque villosa. Pedunculi pubescentes. Calycis foliola ovata
acuta aequalia semiangulata longitudine capsulae. Corolla polli-
cari

repens *Convolvulus foliis sagittatis postice obtusis, caule repente, pedunculis unifloris*
V. p. 203
Ball. Rheid. Malac. 11. p. 107. T. 52.

Habitat in India Orientali Arabia &

Caulis repens crassitie penna anfernis folia sagittata acuminata basi subdentata
to-repanda auricula rotundata. Pedunculus longitudine folii biflorus
Calycis foliola oblonga obtusa. Corolla calycis multo longior infundibuliformis
mi est glabra est tota planta. Stigma capitatum

Americana Diversa planta videtur

tuberosus C foliis cordatis obtusiusculis mucronatis glabris integris; pedun-
culis multifloris ^{infloribus}
~~ex amenit~~ ~~meris~~ ~~septentrionali~~ ~~habui~~. Caulis teres glaber pur-
purascens. foliis pollicariis subtus vix venosa. Calyci u. foliolo
oblonga exteriori duo breviora. filamenta basi hispida. Stigma capitatum.

an Convolvulus foliis cordatis radice tuberosa capitata
Gronov. fl. vry. pag 29. ^{minime} ~~vix~~ vero Gillenii ab allata
a Batatas & paranduro d. vesp. videtur

Thunbergii
haflatii

C. foliis haflatii ~~longioribus~~ lobis semi bifidis, pedunculis subbifloris
caule decumbente villosa Thunb. prodr. pag. 35
Habitat in capite C. spici
caulis decumbens

nihil notum

nomen triviale in ~~hac~~ ^{hac} vel in altero mutata

15-16

gemellus

Convolvulus foliis cordatis ^{subtus pilloso-pubuli} glabris, pedunculis bifloris.
Convolvulus gemellus, caule volubili, foliis cordatis glabris, pedunculis
bifloris. Burm.: fl. ind. p. 46. tab 41. fig. 1.

Habitat in Java. Desid. in Burmann

Caulis debilis, ^{velutibilibus teneri} superne pubescens.

Folia pollicaria, ex quibus cordata, obscure ^{nam acumina} ~~per~~ nervia, obtusa.
cum ^{nam supra quod septem raris vel costis} ~~ve~~ ^{velut} ~~pubescentia~~ ^{pollicaria}

Petiole longitudine foliorum.

Pedunculus longitudine petiole, superne ^{nam in brevioribus} induratus, biflorus: pedicelli
pedunculo ^{etiam brevioribus} ~~ferè~~ ^{etiam brevioribus} ~~aequalis~~, alter brevior, crassior, aphyllus, alter
tenerior, medio ^{etiam brevioribus} ~~bibracteatus~~, maturitate reflexi.

Calycis foliola oblonga, obtusa ^{oculo armato} ~~vel pilosa~~, fructiferi glabri

Corolla ^{calycis} ~~multo~~ ^{glabra} ~~hinc~~ ^{hinc} ~~major~~ campanulata, calycis ^{sexies} ~~hinc~~ ^{hinc} ~~major~~

Stigma ~~lucidum~~ caputatum.

++++
~~potest esse in folio concolorato, pedunculis angulatis, pedunculis bifloris, calycibus~~

platanifolius ~~Convolvulus~~ foliis cordatis lobatis 5-lobis: lobis angulatis, pedunculis subtis
floris calycibusque glabris

Convolvuli forte species platanifolia occidentalis folio Planch. alm. p. 115. Tab. 167. fig. 3.

Habitat in torpula francica Thourin

Glaberrima petioli erecti pilis raris obsiti. ^{fistula pallida,} Folia cordata 5-loba: lobis
lanceolatis, integerrimis, acuminatis intermediis longior, lateralibus postice
rotundatis antice dentibus interdum sinuato-angulatis. Petioli folio
brevior. Pedunculi solitarii inferiores triflori, biflori, supremi uniflori
folio breviores: pedicelli breves. Calycis ~~ob~~ foliola oblonga ~~setosa~~
~~seta terminali.~~

Stigma capitatum globosum antheris hastata

velutinus Convolvulus foliis cordato-ovatis acuminatis subtomentosis, pedun-
culis bifloris.

Habitat in Insula Hainam de Dahl

Caulis pubescens, superne tomentosus, mollis tenues

Folia ^{ternipollitana} cordata, acuminata, basi sinu parvo emarginato, fere nullo
inferiore villosa, superiore tomentosa mollia.

Pedunculus folio duplo longior, biflorus. Pedicelli pedunculo di-
midio brevior.

Calycis foliola exteriora, ovata, acuta, tomentosa, interiora lanicula-
ta

canariensis Convolvulus foliis cordatis pubescentibus, caule perenni velloso, pedunculis
multifloris L. J. V. p. 201.

Conv. canariensis sempervirens foliis mollibus incanis Com. hort. 2. p. 101. f.

51.
Convul. canariensis, foliis longioribus mollibus incanis Plukh. alm. 184. tab.

325. f. 1.
Convul. foliis cordatis caule fruticoso velloso Hort. Cliff. 67.

Habitat in Canariensibus insulis &

Nota planta hispida mollissima. Calix breviter pedicellato ovato-cordato, acuto.
Pedunculus foliis brevior tri-floris, foliola brevia de basi pedicellorum linearia longitudo.
ne calycis, bractea lanceolata sub flore. foliola calycina externa oblonga acuta. Radix
caulibus extus hispida.

malabaricus Convolvulus foliis cordatis glabris, caule perenni villosis. P. V. p. 201.

Kratu-Velenghe Rheed. Mal. II. p. 105. t. 51. Pavi Sept. 376

Convolvulus foliis cordatis acuminatis, caule arboreo scandente Royen.
Leaydt. 429.

Habitat in Malabaris arenosis

an mea lin. & ramis teretes apice canescentes. Folia
reticulata palmata, mucronata. Peduncululi axillares
pediculis brevioribus sursum. Calycis foliola oblonga extensis
in majora illis adpressis canescentia

inflon
conf: Rheed quoad Sepi.

~~mea~~

specimen meum dubium
mea

lanifolius *Convolvulus* foliis cordatis acuminatis repandis, pedunculis trifloris, caule
lanifolio. Lin. mant 203. * Syst. V. pag. 200 Calyc. hort. tab. 35.

Habitat. --- 203. C

acuminata
Totae planta pubescens. Folio cordata, subrepanda, a univulsi acutiusculis
sere dentatis, pollicari. petiolus longitudine folii. Pedunculus folio longior
uniflorus vel triflorus vespis apicem vel apice lobat. catus si flores bi stemi.
Calycis glabri subhiansi, folioli oblongi acuti. Corolla quinquefida stig
mata duo

sub triflorus

attenuatis

sub triflorus

mollis Convolvulus foliis cordatis acuminatis villosis subtus mollibus, pedun-
culis subbifloris, calycibus glabris

Habitat in India orientali

Caulis, uti petioli, pedunculi, calycesque basi pubescentes

Folia cordata, indivisa, acuminata, supra pubescentia, subtus
densius villosa molliter villosa, tamen non incana.

Petioli folio breviores

Pedunculi axillares, folio longiores, biflori; pedicelli apice incur-
vati, aphylli basi bracteae geminae lanceolatae deciduae.

Calycis foliola lanceolata, acuminata.

Corolla et stam. habetur Conv. purpurei

bifidus

~~Convolvulus ^{vellopi} foliis cordatis oblongis subtus molliter villosis, pedunculis
bifidis multifloris
Convolvulus tenuis minor mas Rumph. h. Am. pag. 431.~~

Habitat in Java

Thouin

Caulis uti pediculi petioli et pedunculi villosi. Folia oblonga, acumina-
ta, basi cordata supra pilosiuscula, subtus sicca mollia, bipollicaria
Petioli folio ^{et capite} dimidiis brevior. Pedunculus axillaris solitarius, bifidus
Pedicellis subumbellatis, basi squamis minutis oblongis ferrugineis. Floris
calycina basi pubescentia, apice rotundata, equalia. Corolla
fere infundibuliformis calyce triplo longior. Capsula ovata stylata
aliam vidi foliis angustioribus, glabrior foliolo unico ^{sa} hastato
reliqui sagittati an diversa quae

purpureus Convolvulus foliis cordatis indivisi, fructibus cernuis pedicellis in craspati L. S. V. pag.
200

Convolvuli species altera, quo ad vel Avicenna referri potest. Bodon.

Convolvulus purpureus, folio subrotundo Bauh. Pin. 295. Chrest. pict. 7. f. 2.

Convol. calycibus tuberculatis pilosis Cliff. viid. 10.

β Convol. conuleus minor, folio subrotundo Dill. Eth. 1001. 24. f. 97

γ Convol. folio cordato glabro Dill. Eth. 1001. 24. f. 97.

Habitat in America

Spontanea. Caule retrosum pilosus, scaber. Folia ^{omnia} cordata, brevia acuminata
rara pilosa. Petiolus pilosus longitudine folii. Pedunculi pilosi superne
in craspati longitudine foliorum. Pedicelli quatuor interdum solitarii
vel gemini, basi bracteati superne ^{prostrati} singuli in craspati, robustiore quam in affini-
bus, fructu maturo reflexi, pedunculo parum brevior. Calycis foliola lan-
ceolata, duo reliquis angustiora, basi tuberculato-pilosa, acuta, Capsula glabra
calyce globosa, calyce parum brevior

Dignoscitur a reliquis foliis omnibus integris, pedicellis ^{longioribus} in craspati
tate ante ad pedunculum reflexi, foliis calycinis linearibus, duobus
minus acuminatis duobus angustioribus

feminebus glabris

x pediflorus
Stigma capitatum

granduratus Convolvulus foliis cordatis integris panduriformibus, calycibus levibus L.S.V. p. 200

Convolvulus foliis inferioribus cordatis, superioribus trilobis, calycibus pedunculatis
petiolisque glabris, caule rubescente Gron. vrg. 141.

Convolvulus megalorhizus, flore amplo lacteo; fuscis purpureis Dill. Ecth. 101. t. 25
fig 99.

Habitat in virginis arenosis.

Caule foliisque villosis. Caule & hinc glabris in herb. Jac

beiflorus

mammofus Cav. foliis cordatis acuminatis repandis: tuberculis aggregatis lous: fl.
Cochinch. pag. 16 d

Battata mammosa Rumph. amb. t. 9. c. 10. v. 131.

Habitat in India orientali in Cochinchina culta.

Caulis tenuis volubilis annuus. Folia glabra. Flo. alba. Lateralis
plicatus pedunculis 2-3 floris. Tubera fusca pilosa lous

5-6 Canuginosus Convolvulus ^{Convolvulus} foliis cordatis oblongis subhastatis tomentoso sericeis,
aureolis dentatis, pedunculis trifloris, caule piloso.

Habitat in oriente?

Caulis herbaceus, volubilis, pallidus, pilis copiosis purpurascens
adpressis.

Folia breviter petiolata, basi cordata hastata, ^{flab. ferrugineo,}
vecta, acuta; basi lobis auricula bidentata

Pedunculi axillares solitarii, tri- vel quadripollicares, apice
pedicellis ternis, patentibus. Pedicelli pilosi, uti pedunculi,

Bractea gemina ad apicem pedicellorum, et lanceolatae
duo similes in singulo pedicello laterali versus florem.
pedicellus intermedius brevior, et bracteatus.

Calycis foliola ^{nit} tria exteriora hirsutissima, ovata, acie
munita.

Corolla fere C. scammonis, flavescenti; extus linea lanceo-
lata pro singulo lobo limbi, purpurascens, flavo-
pilosa.

Stylus bifidus

~~anthera hastata~~

carolinus *Convolvulus* foliis cordatis integris trilobisque vellopi calycibus lobatis, capsulis hirsutis
pedunculis subbifloris L. f. V. pag. 200.
Convolvulus, foliis hederaceo, arvensi, flore dilute purpureo Dill. Ect. 100. t. 04. f. 90.
Habitat in Carolina 7.

conf. Dill. Ect.

non vid.

nil *Convolvulus foliis cordatis trilobis, corollis semper quinquefidis, pedunculis petiolo brevioribus.*
L.S.V. p. 200

Similior *conoclea* God.

Convolvulus conileus affinis [?] *hederaceus* L. S. V.

Convolvulus conileus, *hederaceus* anguloso folio *Bauh. Pin. 295. Bauh. h. 2. p. 164. Will. Cat. 96.*
tab. 100. fig. 91. 92.

Habitat in America

Caulis scaber retrosum pilosus. Folia cordata ^{quinquevenera} triloba, pilosa: lobi ovati, acuti; bi
nolliciani et ultra. Pedunculis petiolo duplo brevioribus saepe unifloris vel trifloris
pedicelli brevissimi, ^{in medio ovati} ~~saepe reflexis~~. Calycis hispiti vel pilosi: foliolo lanceolato
subulato fructu glabro duplo longiore, basi angustiore.
Limes in his quatuor inveniuntur, profertim si folia lobata in specimenibus
herbarii desiderantur. Calyx in purpureo vix fructu longior. Lobi a reliquis
diversa foliis profundius fissis quam in reliquis, folia interdum glabra
Corollis quinquefidis laciniis crenatis

lobus intermedius valde attenuatus inferne cordatus laterales
ovati ^{attenuati} postice rotundati vel lobo ovato angulati

lobus ^{attenuatus} intermedius inferne attenuatus calycibus
lanceolatis attenuatis hispido

†
Stigma capitatum

19 platani folius Convolvulus foliis cordatis trilobis: lobis lateralibus dentato-angulatis,
pedunculis subtrifloris calycibusque subequalibus glabris
Convolvulus forte speciei platani occidentalis folio Pluken. alm.
pag. 115. Tab. 167. fig. 3.

Convolvulus indicus vulgo patater dicitur Ferussac 3. pag. 16.
Tab. 11.

Habitat in America.

~~Plant~~ Totus glaberrimus, exceptis petioli

Caulis repens (Ferussac) Teres

Folia petiolata, bipollicaria et ultra, subtus glaucis v. indica, nervis
purpureis entibus picta: lobi lanceolati, intermedio longior,
latiore, integerrimo, acuminato: laterales ^{abus} angustiores ^{buss} attenuati,
postica inferne extrorsum ^{utrinque} acuti lobo minore, latiore, integerrimo
vel dente angulato, postica rotundato.

Petioli folio brevior, pilis rariis obtus.

Pedunculi solitarii, folio breviores; inferiores triflori, intermedi
biflori, supremi uniflori, superne incrassati: pedicelli vix
femiunguiculares.

Calycis foliicola oblonga, submembranacea, seta terminata

Stigma capitatum.

(A Convolv. Batatas omnino differt caule ~~glabro~~ ^{non repente} glabro, figura foliorum
minime convenit nec cum figura Rheed. nec cum Monf.
Batatas Menier. Junina m. d. Tab. 41. Tom. 1. ed. N. Buch. hinc
haud ab simili foliis sed pedunculi in illa uniflori

30-31 quinquefloris Convolvulus foliis sagittato-oblongis attenuatis glabris crenato-subrepant
os, pedunculis subquinquefloris

Habitat in insula Bourbonia? Dedit de Thouin

Caulis leviter pubescens; teres; ramosus.

Folia petiolata, glaberrima, venella cinerea: superiora sequipolliciana, latera, sagittato-ovata, crenato-subrepantia: superiora bipolliciana, angustiora, magis attenuata, obsolete crenata; auricula ~~sub~~ recta, postice subtruncata, unidentata.

Petiolus folio brevior

Pedunculus longitudine folio, pubescens, ^{terni, umbellati,} plerumque quinquefloris, ^{linguiculatis;} supremi triflori: pedicelli ^{cinereis;} laterales in inferioribus bifidi. Bractea duo inferne, in pedicellis lateralibus, cinereis, nullo in intermediis

Calycis foliola oblonga, obtusa, mucronata, villosifera.

Corolla calycis duplo longior, lobis barbatis.

Stigma bifidum

bufalinus - C. folio cordato-sagittato glabro, pedunculis multifloris
antheris cochleari, caule fruticoso. Lour. fl. coch. pag. 169
Habitat in sylvis Cochinchina
Caulis magnus - scandens glaber - folia petiolata glabra. Flores
tubi magni. Capsula biloculari 2 penna.

michi cynotus

peltatus Convolvulus foliis peltatis pedunculis multifloris L. V. pag. 201.
~~Convolvulus Lewisii indicus major R.umph. Camb. 5. p. 42 D. 1757.~~
Habitat in Ambona

quod descript. conf. Rumph. ~~non~~ habes

Lat Len

Rami & lineis decurrentibus, flexuosis angulati, glabri, cortice flavescenti-
viride, transverse tenuissime rugoso, ^{tripollicaria} ~~tripollicaria~~
Folia petiolata, alterna, ^{ovato} ~~ovato~~ lanceolata, glaberrima. ob ^{tenuis} ~~tenuis~~
nervosa, vix venosa, obtusa integerrima.
^{Racemi} ~~Racemi~~ axillares, ^{in plerisque} ~~in plerisque~~ ^{foliis breviori} ~~foliis breviori~~; plerumque solitarii interdum gemini
Pedunculis filiformes angulati, ^{paucis} ~~paucis~~ casum florum denticulati.

15-16 parviflorus Convolvulus foliis cordatis acuminatis glabris, pedunculis multi
floris calycibusque acuminatis villosis.

Convolvulus verticillatus Burmans fl. Ind. pag. 46

Habitat in terra dedit de Burmannus

Caulis debilis, superne teres sine villosis.

Folia cordata, acuminata, glabra, pollicaria.

Petiolus longitudine folii, villosus, filiformis.

Pedunculi longitudine foliorum, filiformes, multiflori: pedicelli
umbellati, villosi ut calyces, laterales subramosi

Calycis foliola ovata, acuminata, parva.

Corolla coerulea, glabra, calyce duplo longior, quinquesida

Stigma bifidum; laciniis revolutis.

Ipomoea paniculata caule volubili, foliis ovatis acuminatis, pedun-
culis paniculatis Burm. fl. Ind. pag. 50. tab. 21. fig. 3

valde affinis pentstemon. flores multo minoris et divelli
longiores

capitulis. Convolvulus foliis ovato-cordatis acuminatis pedunculis unifloris inaequalibus,
calycibus glabris.

Habitat in Madagascaria.

Caulis, folia et petioli pilis non reversis, adpressis. ^{longe} folia ovata, acuminata
base vix cordata, ~~stipulae necesse~~ subtus pallidiori, pollicaria. petioli
foliis duplo brevior. Pedunculus ~~longior~~ ^{longior} foliis longior superne inaequalis
glabris bracteis geminis lanceolatis acuminatis submarginatis
Corolla conv. purpurei sequi pollicari. Calycis foliola ovata lanceo-
lata semipollicaria lutea. Stigma ut in purpureo.

Convolvulus

Ferrugineus Convolvulus ferrugineo-tomentosus, foliis cordato-ovatis acutis, pedunculis axillaribus quadrifloris.

Habitat in America meridionali. L. v. Prostratus

Caules fruticosus; teres, uti tota planta tectus tomento ferrugineo mollissimo.

Folia petiolata, alterna, pollicaria, integra, acuta, avenia, supra leviter lineata, subtus puberula.

Petoli longitudine foliorum.

Pedunculi axillares, solitarii, longitudine petoli; pedicelli quatuor, breves, uniflori.

Calycis foliola ^{tria} exteriora cordata, acuta: acuminata: duo interiora breviora, lanceolata.

Corolla unguicularis, conica.

Stigma inersatum.