

Convolvulus

xx caule non volubili fruticoso

80. *penosus* C. fruticosus erectus, foliis lanceolatis sericeis, ramulis floriferis
fruticosis, pedunculis unifloris
81. *nitedus* C. caule suffruticoso erecto, apice spinosissimo, foliis ellipticis petio-
latis, floribus solitariis
82. *lanatus* C. caule fruticoso erecto, foliis linearibus tomentosis, ramis bene scabris
fruticosis, floribus capitatis involucriati
83. *hystrix* C. fruticosus, foliis oblongis, floribus sessilibus solitariis, ramis spine scabi-
bus
84. *saxatilis* C. hirsutissimus foliis linearibus lanceolatis, floribus capitatis, calycibus
acuminatis
85. *Creorum* C. foliis lanceolatis sericeis, floribus umbellatis, calycibus hirsutis
proliferis obtusis oblongo basi attenuatis
86. *floridus* C. fruticosus prostratus, canis, foliis linearibus lanceolatis glabris
thyrsis terminalibus pyramidalibus compactis subpilosissimis, ramis floriferis perian-
thibusque paniculatis.
87. *pepianus* C. foliis linearibus peloponnesiacis, pedunculis subtrifloris, calycibus
lineari ovatis acutis, caule fruticeo ramis virgatis.

88. *Oenotheroides* C. erectus foliis linearibus canescentibus, pedunculis axillaribus plerumque
 erectis unifloris bracteatis, calycibus lanceolatis glabris
89. *diversiflorus* C. fruticulosus, foliis inferioribus oblongis superioribus lanceolatis
 sagittatis
90. *denticata* C. fruticosus erectus, foliis ovatis subtus serratis denticulatis, pedunculis
 unifloris, ramis inermibus
91. *boykinii* C. foliis sublinearibus serratis, caule fruticuloso paniculato, calycibus
 nudis pediculis obtusis
92. *parviflorus* C. fruticulosus, foliis lanceolatis petiolatis, villosis, pedunculis soli-
 tariis unifloris, calycibus lanceolatis.

174 caule non volubili herbaceo

93. *lineatus* L. foliis lanceolatis serratis lineatis petiolatis, pedunculis ^{bi} unifloris,
 calycibus serratis subfoliaceis
94. *contabundus* C. foliis linearibus lanceolatis acutis pilosis, pedunculis inferioribus
 foliis longioribus subbifloris, calycibus ^{sub} oblongis lanceolatis hirsutis.
95. *frutulosus* C. foliis cordato-ovatis, pedunculis bifloris, bracteis lanceolatis flore
 albo subsessile

96. sespiliiflorus C. foliis sespilibus: inferioribus subspathulatis, superioribus ovato lanceolatis, capsulis sespilibus pediculis.
97. pentapetaloides C. foliis lanceolatis obtusis nudis lineatis, ramis declinatis floribus solitariis semperque pediculis.
98. pappus C. foliis ovalibus tomentosis, pedunculis unifloris.
99. pithamosus C. foliis cordatis pubescentibus, caule recto, pedunculis unifloris.
100. bicolor C. foliis lanceolato-ovatis glabris, caule declinato, floribus solitariis pedunculatis.
101. martinicensis C. foliis ellipticis caule repente subvolubili (ad idem. forte spectat)
102. corymbosus C. foliis cordatis, pedunculis umbellatis, caule repente.
103. edulis C. foliis cordatis integris trilobis que glabris, caule repente angulato.
104. soldanella C. foliis reniformibus, pedunculis unifloris.
105. imperati C. foliis reniformibus integrisve e marginatis basi cordatis, pedunculis unifloris, caule repente.
106. hirtus C. foliis cordatis subhastatisque villosis, caule pediculisque villosis, pedunculis unifloris.
107. parvulus C. foliis sagittatis, auriculis acatis, pedunculis unifloris caule decumbente.
108. repens C. foliis sagittatis, postice obtusis, caule repente, pedunculis subbifloris.

109 septans C. foliis hastato-lanceolatis auriculis rotundatis, caule repente, pedun-
culis unifloris.

110 ~~hermannia C. foliis hastato-lanceolatis auriculis rotundatis, caule repente, pedun-~~
~~culis unifloris.~~

111 sublobatus C. foliis superioribus apice dentato-repandis, caule procumbente,
floribus capitatis.

112. nes Capra C. foliis bilobis, pedunculis subunifloris

113. brasiliensis C. foliis emarginatis basi biglandulosis, pedunculis trifloris

114. littoralis C. foliis oblongis lobato palmatis, pedunculis unifloris, caule repente

115. contidus C. foliis pedatis fenatis, pedunculis ensiformibus bifloris, calycibus
municatis

Spinopus *Convolvulus* *fruticosus* erectus, foliis lanceolatis sericeis, ramulis floriferis spinosis Luppel.
p. 137 * P. V. pag. 202.

Convolvulus fruticosus Pall. iter vol. 2. p. 134. tab. M. *

Habitat in Sibiria

Fruticosus inferne ramosis ~~ramis simplicibus~~ ^{apice volubilibus} sericeis, superiore ramulis attenuatis
cuiusque pollicibus patentibus. Folia lanceolata, sericea acutiuscula in
seno subpetiolata supra sessilia: spinula in alis superioribus profertur in
ramulis petaceo beleneas. Pedunculi ex alis supremis et in ramulis solitarii
uniflori, foliis brevioribus apice folioliis bene linearibus calyce longioribus. foliola
c'alycina ovata, acuta sericea

pedunculi axillaribus solitariis unifloris apice
bracteatis floribus sessilibus

ovalifolium C. foliis ovalibus emarginatis superne obscure crenatis supra glanis
eglandulosis, calycibus foemineis ciliato dentatis

Habitat in sapula fr. Linn. in Pflanz et West

Trunculus ramis teretibus superne a pelis stellatis hirt: folia
petiolata pollicari obscure ner vosa, supra glabra subtus pelis
minoribus stellatis hirtis propositis pinnatis superne vespis obscure

videt folia plurimis ^{enulata}. Sepala minuta decidua. Racemi ~~axillares~~ solitarii
minuti ex omni ex apice ramulorum pollicari flori foeminei inferne quatuor
but axillis longius pedicellati, calycis lacinis cordato, attenuata pelis
varioribus adpressa margini denticuli longi angustis pinnatifidis
flori masculi conferti copiosos bracteis minutis. Stili sex multi
ped. erecti

confert. glabellum

nitida B. fruticosa erecta, foliis glaberrimis inaequaliter cordatis acutis

obovatis denticulatis, stipulis ciliatis Hort. Kew. 3. p. 352.

Begonia obliqua L. Herb. Supp. nov. p. 95. tab. 46.

Begonia minor Gaëquin. Collect. 1. p. 126

Begonia purpurea Swartz prodr.

Habitat in Jamaica

Conchocypselum ^{terrestris} foliis oblongis supra glabris subtus venis pilosis, glandula petiolari subtus
pedunculata

Habitat in Canbais

Rami teretes glabri Ramuli iniani. Folia petiolata pollicaria, costa
et nervi subtus cani. Racemi ex apice ramorum squamulosis
floris foeminei inferiores, calycis lacinis integerrimis. Germen trifidum
canum. Pella in pagina superiori ramorum etate evanescentes
Sepala striata

Capeensis *B. acaulis* foliis inaequaliter denticulatis Lin. Suppl. p. 420 S. V. p.

054

~~Bezoaria obliqua~~ Mant. 5024

Habitat in Cap. bono spei

matutinus C. foliis cordatis glabris ~~atenuatis~~ ^{acuminatis} pedunculis longitudine
petiolorum pedicellis subum bellatis.

Habitat in Insula St. Crucis in Pflug sub nomine Douli Linn 4
Caulis, uti tota planta glabra, striatus. Folia petiolata tri-pollia
na vel ultra venosa, pollicis ter lata integerrima in
acumine attenuata. Petioli striati foliis longiores. Pedun-
culi petiolo crispis ^{pedicelli} 4-7 flori laterales saepe biflori
unguiculati. Calycis foliola oblonga obtusa flavescen-
tia sub pianosa. Corolla conv-purpurea. Stigmata capitata
bilobum

aliud specimen missi in West foliis nonnullis medio
subcoarctatis

varietas Conv. batatas

maximus ~~Convolvulus~~ foliis cordatis ovatis; acuminatis integerrimis, caula petiolisque glaberrimis
mus ~~Suppl.~~ 137 * S. V. p. 201.
Tern. Tali Rhed. Mal. 11. p. 109. t. 53.
Habitat in Zeylona

notus

Spinosus (Burm) Convolvulus caule erecto suffruticoso, apice spinoso, foliis ellipticis, floribus
solitariis

nitida. Ramis plurimis spinosis, apice spinosis. Stipula minima ad præaxillum et
pedunculum. Pedunculi demum patentes uniflori, infra calycem in
flexu ubi bracteato. Bracteis lanceolatis. Calyx erectus glaberrimus Burm. loco
c.

an eadem cum spinoso Lin. facit accidi si diversa an differentia sequens sufficit?
suffruticosus foliis petiolatis oblongis, ramis spinosis.
Spinis vero apparent rudimenta ramulorum ut in spinoso Lin.

quinquefolius Convolvulus foliis digitatis glabris dentatis, pedunculis lobis S. Vp. 202.
C. quinquefolius glaber americanus Plur. Alm. 116. t. 167. fig. 6.

Habitat in America O

Paulis striatus versus folia punctis minutis mucronatis quibus in se dent pilis longis
inter medium septem in officina latendum
ceterum glaber. Folia lanceolata, ^{obovata} acuminata, glabra, uterque, inaequalia

semper minus

dentata. Pedunculus folio duplo longior, triflorus: pedicellus intermedius
crassior, brevior aphyllus. Floretulae duae minutae ad apicem pedunculi, et duae
sub floribus lateralibus. Calycis foliola glabra, ovata, acuta

Swartzii obs. pag. 65

— lanceolatis dentatis glabri pedunculis
trifloris

Stigma dentum +

45-46 Canarus Convolvulus foliis lanceolatis linearibus tomentosis, ramis senescentibus spinosis, floribus axillaribus caputatis involucreatis
Convolvulus cinereum Boiss. Catal. pl. Egypt pag. 63. n. 124 et. Catal. pl. Arab. pag. 106. n. 120

Habitat in Egypto inferiori et monte Sinai

Convolvulus Orientalis humilis argenteus latifolius erectus et villosus
Tournef. Cor. p. 1.

Habitat in Egypto inferiori et monte Sinai

Caulis fruticosus, in ferae ramosus. Rami senescentes, spinosi aphylli, floriferi, subvillosi 1-2 pollicares. Floriferi a basi senescentium, simpliciter conferti, spithamei et ultra, erecti, teretes, inermes, valde hirsuti rigidi, versus apicem flectuosi, valde hirsuti; hirsuti mollis senescentia
Folia alterna: inferiora lanceolata, basi in petiolosa attenuata, interdum plurica coarctata ad exitum ramorum, ex eodem puncto, in aequalia. Superiora lanceolata linearia, fessilia, acuta, unquiuul an o, spatio semipollicari remota.
Stemalia reliquis parum latiora, sternia crassiuscula, avenia, tomentosa, minime senescentia.

Pedunculi a basi ferre usque ad apicem ex omnibus axillis, solitarii, foliodemi dic breviores, multiflori

Flores 6 & fertiles, involucri Involumen hexaphyllum longitudine calycis: foliolis
tribus exterioribus ovatis acutis; interioribus lanceolatis. Omnibus latere exteriore
una cum pedunculis calycibusque hispitisimis, & pilis longis, mollissimis, niten-
tibus: latere interiori subpelosi.

Bractea bino subpinguis flore.

Perianthium quinque partitum: laciniis linearibus

Corolla campanulata extus pilosa, colore Conv. Cneo

Stamena inaequalia: Anthera linearis.

Stylus filiformis bifidus: laciniis filiformibus. Stigmata acuta

Differetia Conv. Cneo ramis senescentibus spicosis, floribus axillaribus & Conv. spino
Gussler Suppl. pag 137. distinguitur a nostra ramis folisque tomentosis senescentibus, pilis mini-
tis, spicis axillaribus, pedunculis unifloris versus summitatem.

De Synonymo Tournefortii non dubito, quam spino nullo aderam in specimine a
Tournef. ipso lecta, quod in Collectione Dr. Fuschii Parisi vidi, nam omnia reliqua
eadem erant. Si non fallor Burmanni Convolvuli senecioides Bl. Ind. pag 49.
Tab. 19. fig. 3 etiam huc pertinet, certe specimina quo in ejus herbario vidi cum no-
stra omnino conveniunt, quantum ^{nam} vero recordor flores plures in capitulo collecti
erant.

a Convolvulo spino Tournefortii Catal. pl. arab. tab. pag 106. n. 121. toto solo differt.

45-46 hyffnia Convolvulus ^{isopus} fruticosa, foliis oblongis, floribus sessilibus subsolitariis, ramis ^{essentibus} ~~fruticosis~~
Convolvulus fruticosus D. Hoffm. Cat. pl. Arab. pag. 106. n. 121.

Litr. E.
pag. 57

Habitat in Arabia ^{ramosis fimeis,}
Triter rigidus, diffusus, pedalis: ramis ramulisque fruticentibus: ramulis subsessilibus
semi pollicaribus,

Bolea sessilia in ramis ramulisque sparsa, oblonga, sericea, integra, parva scissis
bilineari inferioribus

Clorae axillares, ad basim ramulorum sessiles, plerumque solitarii, rarius gemini.
Bractea bina ad basim calycis, oblonga, acutiuscula, apice parum latiores, re
flexa.

Calycis lobata ^{hirsuta,} duo exteriora oblonga, rigida, reliquis majora

Corolla hirsuta, parva

~~hirsuta~~
hirsuta

Stigmata duo capellana.

4746 Saxatilis Convolvulus hesperifolius; foliis linearibus ^{lanceolatis}, floribus
capitatis calycibus acuminatis.

4 Convolvulus saxatilis erectus, villosus perennis, flore et albo purpure
rascante hispanicus Bois. mus. par. 2. 79. tab. 70. Barrel.

Fe. 470

1 Lycnis sylvestris species mejoni Daléch. hist. 807.

2 Campanula lycnidea Bauh. hist. 2. p. 803.

3 Convolvulus rectus, villosus, argenteus angustissimo folio Bois.
mus. pag. 130. tab. 96.

Habitat in Hispania ^{Dr} Dr Barnades

A Convolvulo caerules, cui satis similis, differt, hesperie lanuginosa
foliis rectis nec pilis adpressis vix distinctis argenteo nectis
ut in C. caerules:
foliis linearibus remotis et basi versus non dilatatis.
foliis calycibus linearibus subulatis, floribus subsimplex.
Corolla ut in caerules est stigma ut in C. caerules

Convolvulus lanuginosus La Mark tomentoso in canis erectus foliis
linearibus, floribus terminalibus capitatis La Mark

Convolvulus
orientalis humilis
argenteus latifolius
erectus et villosus
Tournef. Corol.
herb. Hist
quid ut canis ex omni
nani un usum eodem
Syn. ad lanatum
ut ut.

bracteatus Convolvulus foliis cordato ^{attenuatis} ~~acuminatis~~ ^{attenuatis} panduriformibus; pedunculis
eis unifloris: foliolis exterioribus calycis bracteiformibus

Habitat in India orientali Honij

Caulis fulvopubescenti. Folubili, adparso pilis brevibus raris. ^{attenuata}

Folia ~~longa~~ ^{bi} ~~longa~~ ^{pollicaria}, cordata, ~~acuminata~~ ^{attenuata}, mucronata, integerrima
glabra, basi utranque lobo ~~acuta~~ ^{acuta}: Lobus magnus: superius rotundus
obtusus, lateribus reflexis.

Petiolus folio brevior, pubescens

Peduncululus longitudine petioli, solitarius, uniflorus; superne respus
foliola duo opposita, lanceolata, acuta.

Calycis pubescentis: foliola duo exteriora interiora occultantes
quasi bractea binis, multo ^{catiora} ~~magis~~ oblonga, obtusa, superius filula
nervosa, pubescentia, interiora lanceolata, parum breviora

Corolla ~~quinquefida~~ ^{quinquefida}, extus villosa: limbo quinquefido

Stigma capitatum bilobum

Cnicum ~~Con~~ ^{obtusifolium} ~~volivolum~~ foliis lanceolatis ~~tomentosis~~ ^{sericeis}, floribus umbellatis, calycibus hispatis,
caule erecto L. S. V. p. 203 *

Cnicum album Dalech. ~~Doynum~~ ~~Clus. h. 2. p. 254.~~

Cnicum album foliis oleo argenteo molli Bauh. Pin. 463.

Conv: major erectus creticus argenteus Monf. h. 2. p. 11. f. 1. 3. f. 1.

Conv: argenteus umbellatus erectus Tournes. G. R. H. p. 24.

~~Conv: saxatilis erectus callosus perennis Barr. G. 470. Wood. Mus. 2 p. 29~~

~~Habitat in Hispania, Neapoli, Creta, Syria &c.~~
Inj. Capri

Conv. *Cnicum* foliis lanceolatis tomentosis, floribus umbellatis, calycibus his-
patis, caule erecto L. S. V. p. 203. *

Folia lanceolata basi in petiolum attenuata sunt caulis tomentosa sericea
non pilosa. Flores in umbella terminali. Involucro tetraphyllo uno cum caly-
ces molliter hispatis sunt. pedicelli laterales divisi fol. Bracteo sub flores
lineares calycis longiores. foliola calycina subrotunda. Stella corolla
purpurascens pilosa

prolifera Convolvulus foliis linearibus subtus sericeis, capitulis terminalibus
inque dichotomiis, bracteis ovatis extus hispidissimis

Habitata America meridionali v. Rohr. 5
Rami filiformes, ^{erectus} inferne glabri, superne tomentosi, capite liliati cum
capitulis sessilibus in dichotomia ~~capitulis~~

Folia sessilia, alterna, superiora remota, inferiora approximata, linearia
pollicaria, linearia, attenuata, supra glabra, subtus e pilis mollibus adpressis

Genus Capitulum terminale, magnitudine fere nuclei Corijli, subhemisphaerico
sessile. Bractea ovata, foliis triplo latioris, anguiculares, acuminata,
extus hispidissima, sericea, intus glabra. Flores solitarii, sessiles

in axillis bractearum
Species Convolvulus ^{de Villi} Cantabrici.

Diversifolius Convolvulus fruticulosis; foliis inferioribus oblongis superioribus lanceolatis sagittatis

Habitat in arabra Foshat

Fruticulus prostratus. Rami flexuosi apice vellosi apice subsericeo.

Folia petiolata, inferiora oblonga, semiunquivalaria, mucronata, vix pubescentia, superiora lanceolata, sagittata, longiora: utriusque utriusque dentati.

Pedunculi uniflori, medio bracteati, fructiferi carnei. Bractea lanceolata.

Calycis foliola oblonga, acuta.

Corolla parva, calycis dimidii longior, semiquinquesida.

sespiti floris Convolvulus foliis sespilibus: inferioribus subperistylatis superioribus ovato-lanceolatis
Capsulis subsessilibus pilosis.

Legi in Hispania

~~Caulis~~ pilosus decumbens, pro parte spinosus, teretes, villosi, squamato. Folia sespilia, inferio-
ria lanceolata, ex basi profundata, glabra, superiora ovato lanceolata, pilosa
apice folia et flores congesti. Pedunculi viriduli flores solitarii. Calycis foliicola
ovata, acuta. Corolla parva calyci duplo longior villosa. Capsula globosa
pilosa

^{violatus}
~~Dentata~~ Convolvulus fruticosus erectus, foliis ovalibus subtus serratis denticula-
tis, pedunculis unifloris ramis inermibus.

Habitat in India orientali König

Inde ex inermis, fruticosa, subalpestris cortice albo. ramuli volubiles
Folia brevia ^{perglucosa} petiolata, ovalia, utrinque dentibus binis vel quatuor remo-
tis, minutis, serrata, apice latiora & dentibus extremis puber-
ulata, venosa, supra glabra, subtus argentea, nitida.

Ramulis ~~fruticosis~~, ex axillis supremis, foliis parum longioribus, serratis.

Floris solitariis, brevis pedicellatis, in

Calycis fructu

an volubilis tum inter 27. 28 inferenda

hispidus Convolvulus *hispidissimus*, foliis cordato-ovatis, pedunculis umbellatis
Habitat in India Orientali: Bahl.

Caulis et omnia hirsuta. Folia cordato-ovata, acuminata, ultra bipollicaria. Petiolis
foliis brevior. Pedunculi breves, vix semiunguiculares: pedicelli umbellati, longi-
tudine pedunculi. Calycula calycina lanceolata acuminata, intus glabra, extra
Corolla parva
hispidus non facile distinguitur a reliquis foliis integris

Dorycnium? *Convolvulus* foliis sublineari bus fericeis, caule fruticeo ullo paniculato, &
calycibus nudi & sepalis obtusis L.S.V. p. 203. Spec. pl. p. 224 *

Habitat in Oriente, herb. Tur.

Caulis paniculatus. Folia sub lanceolata, fericea, in summis ramis minora vario
ra. Rami rigidi, rarius dichotomi, terminati floribus sub solitariis. Lin.
Spec. loc. cit.

Caulis erectus, rigidus, ramosus & stemus in anis. Folia vix pollicaria
lanceolata

subsolitariis

parviflorus Convolvulus fruticulosis, foliis lanceolatis petiolatis villosis,
pedunculis solitariis unifloris, calycibus lanceolatis.
Habitat in monte viduo Brasiliae Com. mesor. die. In Thaur. 3
Fruticulus palmari. Ramis teretes, simplicibus, superne villosi.
Tota breviter petiolata, semiinquinulana, lanceolata, villosa,
subsericea.
Flores axillares, solitarii, a basi ramorum usque ad apicem.
Folio brevioribus. pedunculi folio brevioribus medio bractea bina parva
Calycis lobis solidis aequalibus, lanceolatis, acuminatis, subsericeis.
Corolla calycis parum longior, extus villosa-sericea

Convolvulus rectus minor folio angusto candicante Sloan
herb. 1. p. 99. fig. 3 satis convenit

reflexus Convolvulus foliis cordatis acuminatis glabris, pedunculis unifloris, frutibus
cerneis, caule pelop.

Habitat in Madagascaria

Caulis ad glabris pelopis. Folia cordata acuminata, glabra, obscure nervosa
sequi pollicaria. Pedunculus longitudine folii uniflorus, ~~q~~ medio bracteis
supra bracteis in crosatis, reflexus. Solidula calycina ovata, acuta.

lineatus Convolvulus foliis lanceolatis, sericeis lineatis, petiolatis, pedunculis bifloris, calycibus
sericeis subfoliaceis L. Sp. pl. p. 224. & S. V. p. 202.

Convolv. minor repens neapolensis, flore rubro Monj. h. 2. p. 17. f. 1. t. 4. f. 2. mala

Convolv. serpens maritimus, spicae foliis Trumf. off. 91. f. 91. f. 2.

Convolv. maritimus repens, angusto et oblongo folio, flore purpureo Barrel. Ic. 1132.

4 Habitat in Hispania, Sicilia, Mediterranei maritimi ego semper in collibus aridis
Hisp. & Barbaria observari

9 Convolv. minor spicae foliis, hispanicus Barrel. Ic. 311.

Caulis saepe digitalis, ^{in plicis & pinnis} totus incanus sericeus uti tota planta. Folia plerumque ad
basin caulis, paucia in ipso caule, inferne angustatis in petiolum. Pedunculi
terminales gemini uniflori, basi folio utrinque firmiteura cauleum.

Calycis in frontanea piloso sericei, foliis ovatis acuminatis obtusis.

9 Convolvulus minor spicae foliis, hispanicus Barrel. Ic. 311. (Synom. huius ad
speciem aliam referat la mark)

Microfolius C. foliis linearibus - lanceolatis, basi angustatis, caule subsericeo
pluribus, pedunculis foliis brevioribus Ency.
Bav. u. 311.

Habitat in Hispania 4

Convolvulus cantabricus quorundam Clus. hist. 44 Jacq. herb. Vail.
Convolvulus linearifolius Bauh. pin.

Caules plures, adscendentes, spithamei. Pedunculi axillares, uniflori

an modo varietas c. linearis

~~non cognita~~

caule erecto, basi solo

Cantabricus Convolvulus foliis linear-lanceolatis acutis, caule ramoso erecto in stulo,
calycibus pilosis, pedunculis subbifloris L. S. V. p. 203. Jacq. fl. Austr. 3. t. 296.

Cantabrica quoniam Clus. hist. 2. p. 49.

Convolvulus linariifolius Bauh. h. 295.

Convolvulus mini mus hinc foliis Monf. h. 2. p. 17. f. 1. t. 4. f. 3.

7 Habitat ~~Habitat~~ in Hispania, Italia, Narbona, Sicilia Barbaria. (Europa australi)

4
7 β. Convolvulus terrestris ~~sp~~ foliis linearibus seneciis, pedunculis subbifloris
calycibus hispitis, mucronatis L. Sp. pl. pag. 224.

Volvulus terrestris Dalech. h. 1425. Bauh. h. 2. p. 160.

Caules in spontanea planta decumbens superne ascendens pilosus uti tota
planta, subnitida. Folia viridia, utrinque acuta. Pedunculi axillares
et terminales foliis triplo longiores. foliola calycina ovata acuminata
Radix corolla fultus purpurascens hispiti. Lineatus differt caule subspu-
tiente, foliis lancatis seneciis, pedunculis foliis breviores

Cantabrica C. foliis linear lanceolatis acutis pilosis, pedunculis inferioribus
foliis longioribus subbifloris, calycibus oblongo-lanceolatis hispitis
Hort. kew. 1. p. 213

Scelus Convolvulus foliis cordato-ovatis, pedunculis ^{bifloris} unifloris: bracteis lanceolatis, floribus sessilibus L. V. pag. 202

Convol. scelus minor, flore parvo aunculato Boerh. sic. 89. t. 40. Monf. l. 2. pl. 77.

f. 5.
C. foliis ovatis acutis Hort. Cliff. pag. 67.

C. foliis ovatis acutis, floribus duplici bractea succinctis Royen. Lugd. 420.

Habitat in Sicilia, Barbano &

Caulis prostratus, pilosus, varie magnitudinis ratione loci. Folia remota, cordato-ovata
Rano, acuta, raris pilosa. Petiolus longitudine folii. Pedunculus filiformis
in frontanea plerumque biflorus, interdum uniflorus, folio brevior, apice
folioli binis lanceolatis pedicellis longioribus. pedicellis alter filiformis
longior sub flore bracteis geminis lanceolatis, alter brevis crassior, ephyllus, flori-
sessilis si pedunculus uniflorus, si vero pedunculus biflorus alter basi bractei-
reatus tantum sessilis. Calycis foliola ^{versus apicem} pilosa, ovata, acuta. Corolla calyci
dissepis longior conulea radiis persistentibus pilosis. Flores cernui
β. varietatem hujus foliis cordato lanceolatis caule ascendente in Bar-
bano andis laque

— capsula glabra

Stigma bifidum

pentapetaloides. Convolvulus foliis lanceolatis obtusis nudis lineatis lineatis,
ramis declinatis, floribus solitariis semiquinquifidis. Len. t. V. pag.
202.

Convolvulus prostratus; caule prostrato, foliis sessilibus lineari cunei
formibus: pedunculis axillaribus unifloris bibracteatis. Bot.
deser. pag. 203.

(Variat in solo macroni. Caulibus simplicibus, filiformibus, digitali-
bus, versus apicem pilosis spiculis. Folia autem semiunguiculari-
bus angustis, apice dilatatis; superioribus linearibus sessilibus
et inferioribus pedunculatis superioribus sessilibus
Calyceibus pilosis spiculis

78 *Vesiosum*
alatum

Galiun foliis inferioribus quaternis obovatis, superioribus ^{canicollatis} ~~senis~~ linearibus retro-
sum scabris caule teri

Habitat in montosis Turceti

antrosfum
aculeatis

Caules plures ascendentes digitales glabri, teres tetragoni e linea
decurrenti subulati ramis ^{rami proplexissimi, pollicares} interdum caules diffusi putamini
Solia infima quaterna parva obovata, reliqua ^{membranacea} ~~senis~~ linearia semun-
guiculata internodiis dimidio breviora, glabra, margine aculeis
minutis scabra

suprema *sepe*
septena

Pedunculi laterales oppositi a basi ^{et ex apice ramorum} usque ad apicem in thotomi
folia tria sub prima ramificatione bina sub sequentibus
sex pedicellis ultimis triflori
Semina parva minuta glabra, viscosa

a *Spinis* differet magnitudine foliis non canicollatis nec retrosum aculea-
tis, aculeis ^{canicollatis nec superficie} venis profum vixi minutis
Cucidum *Allionii* foliis margine vix scabris, summa quina vel qua-
terna
a cinerea colore glauco non ~~trita~~ obducta folia non callyptia
nec apice *Spinis* alba

pentapetaloides Convolvulus foliis lanceolatis obtusis nervis lineatis, ramis declinatis, floribus
solitariis semiquinquifidis Syst. nat. 3. p. 229. L. V. p. 202.

Habitat in Majorca 0

Caulis ~~ascendens~~ erectus, basi rami bini oppositi ascendentes altitudine
1 fere caulis, pubescens, simplicis spinis, spithameus. Folia radicalia
oblonga, longe petiolata, interdum emarginata; Caulina subsessilia, lan-
ceolata, erecta, omnia subglabra. Peduncululi axillares, uniflori, medio
bracteis duobus minutis, pubescentes. ~~Flores~~ ^{Flores} longitudine foliorum. Calycis
seanosis, ovati acuti. Corolla semiquinquifida. Stilla pubescens
a siculo ^{affinis} diffinitur foliis caulinis lanceolatis sessilibus, peduncululis
absque foliis sub flore, semper unifloris calycibus seanosis
sequens differentia forte melior

not. C foliis caulinis lanceolatis sessilibus nudis, peduncululis unifloris, caly-
cibus seanosis, corollis semiquinquifidis

valentinus. Convolv. foliis linearibus acutis plicatis extus pilosis
floribus axillaribus solitariis Cav. 4c. 2. p. 65. Tab. 110. fig.

2.

Habitat in Hispania

Caules erecti semipedales saporis ramosi, pilis albis ob
diti uti tota planta exceptis foliis perpa. Folia
breviter petiolata linearia acuta, plicata.

Flora pedunculata folio longior prope calycem bracte
ata. Calycis laciniis ovatis acutis extus pilosis. Corol
la rotunda rubra limbo 10 crenato. Stigmata duo feli
formia. Capsula biloculari Cav. 4c.

non vid.

lineari - Pons. folus lineari - acutis piloso - feniis, flombus Verm
nalibus umbellato - paniculatis, calycibus pilosi Curtis bot. Magar.
p. 209.

Habitat 4
Caules erectus

Spithamow *Convolvulus* foliis cordatis pubescentibus, caule recto, pedunculis ^{unifloris} multifloris L.S.

p. 203

Conv. Spithamow, caule recto, foliis subrotundis. Gron. Voy. 141.

Habitat in Virginia

~~Caule erecto, simpliciter foliis, pubescentibus, Spithamow. Folia ^{cordato} ovata, radicalia et inferiora petiolata, floralia sessilia, pubescentia, semiangulata. Pedunculi siliiformes foliis longioribus apice sub flore foliolis geminis truncatis longitudine calycis. Flores nudantes. Foliola calycis ovata, acuta, apice pilosa. Corolla corollae affinis sicula et pentapetaloides. Differt a sicula foliis supremis sessilibus, caule erecto, a pentapetaloides calycibus non truncatis foliolis sub sed basi floris foliis inferioribus ovatis~~

~~Part. Conv. foliis ^{ovatis} subcordatis pubescentibus floribus simplicibus, caule erecto pedunculis unifloris~~

~~an varietas sicula et certe quam maxime si meli forte quod non videri potest eo~~

in Spithamow Corolla rotunda plantae magna Clayt. Descript. Desideratur nunc mihi nota

descriptus est.
varietas sicula

non videtur

tricolor Convolvulus foliis lanceolata ovatis glabris, caule decinato, floribus solitariis
L.S.V. pag. 203

Convolv. peregrinus conuleus, foliis oblongo B. Pin. 245. Prodr.

Convolv. flore triplici colore insignito Monf. h. 2. p. 17. f. 1. t. 4. g. 4.

Convolv. foliis lanceolato-ovatis nudis, caule recto, floribus solitariis Hort. Clief. 60.

Hort. Upf. 30.

Habitat in Africa, Mauritania, Hispania, Sicilia &c.

Caule pubescenti, decumbeo. Folia lanceolata, acutiuscula, glabra ^{superius} ^{angustata} ^{subaequalia} ^{pedunculo} ^{subaequalia}
culi areolati ^{uniflori} foliis longiores, supra medium bracteatis: bracteis petalis. Calyx
pelosus peracta florescentia erectus: foliola calycis oblongo obtusa.
Convolv. magnis ab affinibus differuntur

Convolvulus longifolius arvensis rivos umbilico superius ^{erectus} ^{2^a} Barrel. 322-321.
~~erectus~~

pedunculo uniflori & bracteatis medio bracteatis
varietatem vide in herb. Vaucl. foliis lanceolatis, &c.

Stigma bifidum

Corymbosus Convolvulus foliis cordatis, pedunculis umbellatis, caule repente L. b. V. p. 203.

Conv. niveus polyanthus, foliis subrotundo majore Plum. pp. 1. 4. 89. f. 2.

Habitat in America

Eulaia Convolvulus foliis cordatis integris trilobisque glabris, caule repente angulato
Thunb. fl. jap. pag. 84. P. V. pag. 203.

Haec datur in Japonia

a Batavia differt: foliis cordatis integris, trilobis et quinquelobis, nec angustatis in medio
ut sagittatis evadant. flores non vidit Thunb.

Soldanella Convolvuli foliis reniformibus, pedunculis unifloris L.S.V. pag. 203.

Brasilea maritima Math.

Soldanella Lob.

Soldanella maritima minus Bauh. pin. 295

Habitat in Anglia, praesertim in maris mediterranei littoribus arenosis. Et Brasilia etiam
Pediculi sub arena saepe longe repentes. Caulis ascendens simplicissimus, palmatis
o glaberrimus uti omnia in planta. folia emarginata crassifolia venis
simplicibus. Calycis peduncululi ^{oppositi} folliculares longitudinis foliorum. Calycis
foliola rotundata. Corolla Conv. purpurei glabra. Stylus bifidus

6261 Imperati Convolvulus foliis panduriformibus integrisve ~~per~~ marginatis basi cordatis,
pedunculis unifloris, caule repente.

Convolvulo marino Imper. h. N. 671.

Soldanella vel brasica maritima major B. Pin. 295

Convolvulus marinus, Soldanello affinis Bauh. h. 2. pag. 160.

Convolvulus maritimus, major italicus, sinuato et auriculato folio Monif. h. Ox.
2. 37.

quoniam fl. orient

Soldanella marina, longo et sinuato folio, seu Convolvulus marinus Laetepens

pag. 19. no 47

Soldanello congener Imperati Barrel. obj. 33. Fior. 156.

fide herb. Rau

wolff

Habitat ad littora maris Neapoli

Folia petiolata, remota, erecta, oblonga, basi ^{cordata} utrinque lobulis binis rotundatis, ^{aurata} ⁱⁿ ^{der}
Dum integra, a marginata, crassifolia, glabra, nervosa, subpollucida.

Petiolus folio longior

Pedunculus axillaris, solitarius interdum gemini, longitudine petiolorum,
versus apicem foliolum lanceolatum.

Calyx glaber, foliolis oblongis ~~et~~ ^{et} ^{habitu}

Corolla Convolv. Soldanella et Habitus Convolvuli Soldanella

Habitus Convolvuli Soldanella

~~Imperati Convolvulus foliis panduriformibus integrisve, basi cordatis, apice emarginatis, pedun-
culis unifloris, corollis eam~~^{b.}

hirsutus Convolvulus foliis cordatis subhastatisque villosis, caule petiolicisque pilosis, pedunculis
multifloris L. L. V. pag. 203 Spec. pl. pag. 226*

Habitat in India.

Planta non magna, minus volubilis. Pedunculi et caulis pilis flavescientibus exsertentibus
hirsuti. Folia parum villosa: primaria cordato subrotunda; secundaria prope cordato;
floribus proxima saepe hastata. Pedunculi nudi, foliis longiores, floribus alternis pedicel
latis, involucri ad singulum pedicellum minores, lanceolatis. Linn. Spec. L. O.

parvulus Convolvulus foliis sagittatis, ^{hastatisque} auriculis dentatis acutis, pedunculis unifloris,
caule decumbente.

Habitat in Cap. b. p. ei

Caulis et rami filiformes, flexuosi, glabri, uti tota planta.

folia antiochini aegyptiaci, parva vix semiuncularia: auricula
lanceolata, portis raris denticulata minutis.

Pedunculi folii duplo longiores, supra medium bracteati.

Calycis foliola ovata, obtusa

Corolla parva.

Capitula globosa magnitudine pisi

Convolvulus sagittatus: foliis hastatis sagittatisque, pedunculis unifloris
caulibus prostratis Thurb. prod. fl. cap. pag. 35

bicolor Convolvulus foliis ovato-cordatis ^{acutis} pedunculis bifidis multifloris foliolis calycinis
vellofis.

Habitat in canibus

ex verticillato differt, caule, petiolis, pedunculis ^{calycinibus} ~~que~~ vellofis. Folio ovato
cordatis. Pedunculis folio triplo longioribus. Calycis foliolis tenens ovatis
acutis. Bracteis lanceolatis ~~longitudine~~ longitudine pedunculi parvis
ovatis foliis glabris petiolis ^{acutis} ~~ovatis~~
aliam huc similitudinem foliis glabrior, foliis acuminatis, bracteis angustiori-
bus in reliquis vero convenit

Stylus bifidus

Dianthus C. foliis pectice truncato-rotundatis, pedunculis subbifloris Torph. Desf.
nuy 203.
Habitat in Egyptis

miki ynobus

acutifolius Convolvulus foliis oblongo-lanceolatis subhastatisque, pedunculis elongatis unifloris, caule repente.

Convolvulus maritimus catharticus foliis acutis, flore nervis Plum. Am. pag. 91. Tab. 105.

Convolvulus repens: foliis sagittatis pediculis obtusis, caule repente, pedunculis unifloris. L.V. pag. 207

Habitat in America meridionali. L. v. Rohr.

Caulis ~~erectus~~ ~~erectus~~ angulatus, glaber, apice leviter pubescens; ad singulum folium dense dilatatus; a cujus axillo petiolus. Folia a dense petiolata, alterna, bipollicaria vel ultra, interdum unguem lata et undique ejusdem latitudinis, interdum latiora, saepe basi acutiora quam apice, interdum dilatatione subhastata, apice obtusa, saepe non raro emarginata, glaberima, supra avenia nervosa, subtus venosa.

Petioles foliis parum breviores uniflori, quinque vel Sexta

Pedunculi axillares, solitarii, ~~sub~~ pollicares, in medio ~~terminati~~

Bracteae duobus alternis subulatae; uniflori

Calycis foliola oblonga, glabra.

Stigma capitatum.

(Species differt omnino a C. B. Babel horti Malab. sub nomine Convolvuli repentis in Symb. bot. p. 1. pag. 177 descriptus.

3
se 139 d. v. Rohr

repens Convolvulus foliis sagittatis postice obtusi, caule repente, pedunculis ^{subtilibus} unifloris. ~~unifloris~~
V. 203 (unifloris L.) Lin. S. V. pag 203.

Ipomoea aquatica; foliis cordatis acutis Forst. descript. pag 44.

Habitat in aquisitaribus felicis et India orientali.

Radicula fibroso, bipollicaris.

Caulis repens, teres, crassitie penno anseris. Stolones axillares 3-4 pollicares.

Botia primaria cordato-acuminata, versus basin dentata: dentibus 3-4 in quatuoribus, remotis, pollicaria. Stolonum cordato-sagittata, integerrima minor. Omnia glabra.

Petiolus flexuosus, glaber, foliis duplo longior.

Pedunculus axillaris, solitarius, ~~uniflorus~~ ^{subtilis} ~~uniflorus~~, rarius quadriflorus, longitudine petioli - 6 cores pedicellati; pedicelli semper crassiores. Bractea duo minor ad basin pedicellorum.

Calyx quinquefidus: laciniis oblongis, glaberrimis, obtusis.

Corolla tubus semipollicaris.

Planta Forstholii optime convenit cum Babel Hort. Malab. T. II. pag. 107. Tab. 52. Convolvulus vero Plum. Amer. p. 89. Tab. 105. videtur esse diversa planta.

Babel Hort. Mal. II. p. 107. Tab. 52.

Callosum Lithospermum foliis lanceolatis linearibus ^{calloso} (verniose hispida), caule suffruticoso

hispido

Lithospermum angustifolium; seminibus lobatis; corollis calyce triplo longioribus;
caule diffuso; foliis lanceolatis. ~~Boiss. Descript. pag 39.~~

Habitat in desertis thaliniis

Caulis prothamnosus inferne ramosus cortice albo inferne villosus superne
hispidus; ramorum rami altitudine caulis superne semel vel bis divisi.
Folia sessilia remota, lanceolata linearia, obtusa, undique ~~est foliis~~ ~~albis~~ ~~callo~~ ~~albido~~ ~~inferentibus~~ ~~adpresso~~ ~~callo~~ ~~prospicua~~ ~~callo~~ ~~albidis~~ ~~apice~~
~~foliis~~ ~~setosis~~ ~~concoloribus~~ ~~adpressa~~. Spica terminalis solitaria revoluta
hirsutissima. Flores alterni, foliodum lineare calyce longioribus ad basin
singuli floris. Corolla tubus villosus
varias ramis plus & magis vel minus erectis.

differt tantummodo ab

Arab. Planta arabica differt solummodo ab Indica ramalis, foliis quae
ramis seminibusque densius villosis, lenicis, punctis punctis

sublobatus *Convolvulus* foliis superioribus apice ~~repando~~-dentato-repando, caule procumbente
floribus capitatis L.S. V. pag. 204. Suppl. pag. 133-*

Habitat in India ©

Folia subpilosa: inferiora cordata, superiora obtusa, sublobata-repanda in apice.
Flores aggregati, terni, sespites, parvelli. Involucrum hexaphyllum. Corolla
magno L. in Suppl. h. c.

Swartzii

P.: foliis oblongis sagittatis que ^{emarginatis}, pedunculis unifloris, caule repente

Convolvulus repens Sw. *obf. bot. pag. 64.*

Habitat in arenosis montibus Jamaica

per Capro Convolvulus foliis bilobis pedunculis unifloris L. S. V. pag 203.

Schoranna - Adamboe Rheed. Mal. II. p. 117. Tab. 57.

Convolv: maritimus zeylanicus, folio crasso cordiformi Heron. Lugdb. 174. 175.

C. maritimus humph. Amb. 5. p. 433. 459.

C. foliis puberulis apice emarginatis basi integris Rayer Lugdb. 420.

C. foliis bilobis fl. zeyl. Lin. 75.

Habitat in India

facie sequentis. Caulis minus crassus. Folio basi acuta obtrata valde retusa
cum mucrone. Pedunculi 1-2-3 flori bracteis deciduis membranaceis
lobula calycina oblonga apice rotundata ~~lobula~~

a la marthia conjungitur cum brasiliensi sub nomine marthian.
a Thoreus varietatem habuit
cum brasiliensi conjungit la Marth.

An differentia excludat pedunculi uniflori saepe bi sive triflori

brasiliensis *Convolvulus* foliis emarginatis basi biglandulosis, pedunculis trifloris L. N. pag. 204.

C. maritimus sive *Soldanella brasiliensis* Mart. Agr. bras. 51. Pl. Bras. 258.

C. maritimus catarticus, foliis rotundo, flore purpureo Plum. Amer. 99. tab. 104.

C. maritimus, foliis nitidis subrotundis emarginatis, petiolis biglandulosis Brown Jan.

153.

Habitat in Brasiliâ, Dominguo maritimo

Caulis angulatus, glaber sic ut tota planta, crassitie digiti minoris. Folia ovalia

Petiolus membrana plana bi- si tri- pollicaria nervosa venosa, latitudine et longitudine fere aequalia
cuius longitudine nervi non exstantes, retusa. Pedunculis interdum punctis emittentibus samentibus
foliis glandulosis non scaber erectus Flores subpaniculati plerum trifloris Pedicelli non
brasiliensis ad inferiorem partem folii est eodem ex eo percussio bina pro superioribus partibus superiorem in crassitate
basi bracteati

Littoralis. *Convolvulus* foliis oblongis lobato-palmatis, pedunculis unifloris caule repente.

L. S. V. pag 204

Convolvulus albus, foliis laciniatis, maritimus Plum Spec. 1. Ge. tab. 90. fig. 2.

Habitat in America.

Egyptus Convolvulus foliis pedatis serratis, pedunculis ensiformibus bifloris, calycibus mucronatis
L. mant. 559 & S. V. pag. 202.

Convolvulus quinque folius Bauh. prod. 134.

Habitat in Oriente ex India misit Bonnier

Caules plures prostrati filiformes simpliciflori, glabri. Folia serrata pedicelata palmato-quinque partita, ~~obovatis~~ lanceolatis, extus latius, lateralibus minoribus, versus apicem serrata, glabra. Soliola ^{compositis antheris} una floris Pedunculis unifloris folio duplo longior. Stipulae utraque ad basin petioli et soliola duo supra medium pedunculi ~~fructuosa~~ foliorum caulis. Soliola calycina ovata, acuta lobis ^{extimis} mucronatis ~~fructuosa~~
pedunculi supra medium folia duo opposita caulinis familia

— 5 que partiti

Convolvulus

Caulis volubili | Stigmata bifido | foliis cordatis
 | | foliis divisis
 | Stigmata capitato | foliis divisis
 | | ~~indivisis~~

Caulis erecto

Caulis procumbente

Sagittatus Convolvulus foliis cordato-sagittatis glabris, pedunculis unifloris

Habitat in Insula Mahé ^{Thonin}

~~Tota glabra. Folia cordato-sagittata obtusa cum mucronem, lobis postice rotundatis, nervis acutis, sequi petiolicaria, persistentia. Petiolus folio longior. Pedunculus solitarius ^{uniflorus} petiolo brevior & medio folioli geminis decussatis. Calycis oblonge foliola oblonga mucronata. Corolla magnitudine Convolvuli purpurei.~~

ordo Convolvacearum.
Caule volubili

- primum foliis lanceolatis
2. foliis hastatis sagittatis
3. foliis cordatis
4. --- hastatis
5. --- cordatis lobatisque
6. --- lobatis.
7. --- multifidis.
8. --- simpliciter.

Caule non volubili vel repente.

1. apice Volubiles

2. angustis foliis
et sic porro ut antea

conveniunt omnes pedunculis axillaribus
2 plurimis pedunculis bracteatis

limites inter Convolvulum et Ipomeam vix datur tibi amplitudina eorum sensus in aliis nec
ampliatas nec tubilopis ideoque est haec nota character Dubius erodit. Stigma forte melius est pro
distinguenda sed magis realiter confusum foret ambo conjugere

Convolvuli officini

1. Convolvulus major polyanthos, longissime latissime repens, floribus albis minoribus odoratis Sloan. Jam. T. 1. p. 153 Tab. 97. folia cordata acuta pedunculata floris paniculatis
2. Convolvulus major, folio subrotundo, flore amplo purpureo ib. pag. 154 Tab. 98. fig. 1. folia magna cordata acuta, pedunculata subbiflora
3. Convolvulus minor lanuginosus folio subrotundo flore caeruleo ib. p. 156. Tab. 99. fig. 1. folia sequipollicaria, cordata subvillosa pedunculata subuniflora flores caerulei
4. Tacuache mas ^{ou hage mexuacania} et fomeno ^{Hernandez hist. pag. 164.} folia cordata, pedunculata uniflora
5. Totoyacitl pede passens ib. pag. 256. folia palmata, lobis lanceolatis, pedunculata uniflora
6. Ystacoltzia Chululensi Scammonio mexicano ib. folia sagittata pedunculata uniflora
7. Caiacoti Tlano quiloni seu Batata purgativa ib. pag. 299 folia sagittata angulata vel dentata pedunculata uniflora
8. Mecapatli metatlanensi ib. p. 304. folia cordata pedunculata uniflora
9. Temecatli. Ex purgante ib. p. 305 folia hastata
10. Convolvulus minimus ~~heleanthemi~~ villosus, heleanthemi folio Plum. Cat. 1.

varipilus Convolvulus foliis ovato-cordatis ^{attenuatis tuberculati} acuminatis, pedunculi uniflori in
crassatis, calycibus ^{foliis saepe} glabris ^{laniccolatis}

Habitat in Madagascaria Commespou dedit Dr Thour.

Caulis, folia et petioli pilis raris ^{adpressis} ^{reversis} adpressis,

folia pollicaria, ovata, longe ^{attenuata} ~~acuminata~~, basi ~~ret cordata~~, subtus
pallidiora.

Petiolus folio duplo brevior.

Pedunculus folio longior, superne incrassatus: bracteis geminis lanceola-
tis, acuminatis, subunguicularibus.

Calycis foliola ovata, lanceolata, semipollicaria, laxa.

Corolla cons: purpurea, sesquipollicaria

Stigma ut in Con. purpureo

30³¹. erofus
crenatus

Convolvulus tomentoso subsericeo, foliis cordato-oblongis obtusissimis cre-
nulatis, pedunculis unifloris. Des

Habitat in Brasilia ^{Conspicua} dedit An Thouron

Caulis volubilis, sicuti tota planta, molliter villosa tomentosa, subsericea

Folia petiolata, unguiculata, ^{vel ultra} nervosa, secundum nervos sublineata,
crenulata, mucronata; auriculis rectis oblongis, obtusis.

Petiolus folio triplo brevior.

Pedunculi solitarii, longitudine foliorum, uniflori, versus apicem
bractea gemina, opposita, setacea, ^{subaequalia} semiunguiculata.

Calyx foliola oblonga, acutiuscula, ^{subaequalia} duo interiora glabra.

Corolla calyce dupl. dimidio longior, extus lineis 5que lanceolatis,
pediformibus sericeis: lobis apice barbati.

Stigma lacinis bifidum.

Math. Encycl.

3. p. 558.

~~Convolvulus crenatus Jacquin. coll. 2. pag. 277.~~

~~Convolvulus crenatus tomentosus foliis cordato-oblongis obtusis
subrepandis, pedunculis petiolo longioribus, limbo acuto Lu~~

~~Math. Encycl. 3. p. 558.~~

~~1789 89. a. Convolvulus erofus L. in tomentosus foliis cordato-oblongis
obtusis, pedunculis longitudine foliorum bifloris~~

hippedulus. Q Foliis cordato subfagittati glabris, pedunculis axillaribus
geminis brevibus, fructiferis re flexis calycibus ~~hepatis~~ hirtis

~~Fr.~~ Fr. como a verticillata Forsk. Desfir. pag 44

Habitat in Arabia Forskål

Caulis volubili angulatus pilosus. Folia petiolata polliciana
acuta, unguem longa glauca viridia, auriculo rotundata late
geminis subsessis. Petioli ad alterum folio triplo longiores
glabrescunt juniores breviores villosi. Pedunculi axillares
geminis uniflori petiolo crassiori semunquicubito pilosi
obscure ciliati foliolo calycis oblonga. Capsula globosa magnitudine
sine Pyreni biloculari. Semina villosa ~~tomentosa~~ ^{glabra} tomentosa

5-6 unicanus Convolvulus tomentoso-fenicus, foliis lanceolatis sagittatis, obtusis
basi subdentatis, pedunculis ^{bi} unifloris
Habitat in America ~~Habitat in Guayana~~ dedit A. Dall.

Ables Caulis volubilis, herbaceus, teres
Folia ^{ter} pollicaria, lanceolata, sagittata, apice obtusata, mucro
nata, basi parum dilatata, angulata, dentata, ^{subangulata} auriculis
obtusatis ^{quadriplo}

Petiolus folio ^{quadriplo} triplo brevior.
Pedunculus longitudine foliorum, biflorus. pedicello altero bre-
vior crasore basi bibracteato, altero longiore. medio brac-
teis bitis petaceis.

Calycis foliola ovata, acuta: exteriora villosa.

Corolla exterior villosa # Pappula glabra, globosa, uniloculari?
Stylus bifidus Semina glabra

Convolvulus crinitus Jacq
hermannia & Heurtier

Striatus Convolvulus foliis cordatis acuminatis glabris, pedunculis foliis longioribus subquadri
floris

Habitat in India Orientali Nonij

Paulis pubescentibus, teres annuus

Folia petiolata, remota, ^{exquisita} cordata, venter minima acuta utraque glabra. Petioli lon-
gitudine foliorum pubescentes. Pedunculi axillares foliatis, pubescentes
foliis longiores apice bifidi, pedicelli ^{gemmiferi} plerumque biflori interdum floruni-
cus in divifura, floris pedicelli parvales gemmiferi. Calycis foliola
oblonga, per obtusa ^{quatuor ex quatuor lobis} foliola aequalibus concavis. Corolla calycis
duplo longior, medio dorso striis ~~quatuor~~ ^{quatuor} medio dorso striis quinque
foliis ad apicem concurrentes marginibus albis lateris interstitiis albi

1516 Triflorus Convolvulus foliis cordato-lanceolatis attenuatis glabris obtusis,
pedunculis trifloris.

Habitat in India orientali nonij

Caulis solum herbaceus, volubilis, glaber. ^{tenuis purpurascens}
Folia bipollicaria, glabra, lanceolata, ^{basi cordato-sagittata,} attenuata, integerrima
~~basi cordato-sagittata~~, simpliciter venosa: veno subtus
ad lentem villosa, subtus pallidiora, apice rotundata
micronata: lobi extus obscure angulati

Petiolus brevis

Pedunculi foliis brevioris, triflori: pedicelli angulati, ebracteati,
seu fere sursum versus in crassati, aequales, longitudine fere
pedunculi.

Calycis foliola obtusa.

Corolla calyce duplo longior: lacinus apice barbati

Stigma capitatum.

Scammonia Convolvulus foliis sagittatis, costis truncatis, pedunculis teretibus subtrifloris
L.S.V. p. 200 in pl. 210 4

Scammonia Math.

~~Cous~~

Scammonia synaca Bauh. pin. 294.

Convolvulus synacus f. Scammonia synaca. Monf. h. 2. p. 12. f. 1. t. 3. fig. 5. Mill.
Det. t. 102.

Habitat in Syria, Mysia, Cappadocia & ^{tracia}
glaber. Folia sagittata ^{intermedia} auriculis periclyis, oblique truncatis, acutis, pediculis
simplicibus folio dimidio brevior. Pedunculus folio triplo brevior
apice & folioli binis ovatis. Radicelli dichotomi superius divisi
bracteis ovatis ad singulam deorsum. foliola calycis extensa
interioribus breviora omnia laevia oblonga ^{emarginata cum mucis} & ^{trifloris} truncata.
sum truncata dum extensa dilatata bifida in flores nitentes
varietatem foliis magis acuminatis, auriculis longioribus, extrorsum respici
pedunculis f. tenerioribus bifloris bracteis lanceolatis, ^{flowers erect} ex horto potarum
calycis et corolla simili Scammonio