

Convolvulus

sarvensis facies Convolvuli repentis et pedunculati uniflori.

~~Convolvulus~~ ^{Desfont} habeo. Caule pluri

Spuma forte haud optime a Convululo separatur limites enim non
magnis momenti et difficile a se invicem et characteres cognoscuntur
Salcetiam cum convululo conjungit Thunb. et semina quatuor nuda
genus diversum constituant

Dianthus
biflorus

glabrescens
Ponvolvulus foliis cordatis attenuatis acutis, pedunculis axillaribus bifloris, calycibus pilosis
Habitat in Guinea West

Caulis volubilis, teres, villosus, filiformis. Folia petiolata, remota, vix pollicaria, auriculis rotundatis, pinis semis incisis, utroque utroque oculo armato villis adspersa, minutissima muc subter pallidiora obsoleta venosa, mucronata. Petiolus folio dimidio brevior, villosus, tubianescens. Pedunculus folio longior, villosus: pedicelli gemini, alter bracteatus cras & cor, alter tenuior cum rudimento florum duorum. Calycis foliola linear-lanceolata, pilosa. Corolla pollicaris, campanulata.

Protonotaria species West

13-16
capitatus
hippidus

Convolvulus hippidus, foliis cordato-ovatis, floribus capitatis ^{multis}
involucris longioribus, calycibus ovato-lanceolatis.

Habitat in India orientali hinc ^{namque pernes}

Totus hippidus, prostratus, ^{ramis pernes} involucria et calyces: pili longi, distincti,
pernitenti minutis insidentes, foveolae flavae albae.

Caulis ^{pernes} scaber, volubilis, caulis herbaceus, scaber
folia ^{ne foliata} cordato-ovata, ^{bi. tri} persequi pollinaria, acuta, ^{integerrima} filicata, puber
pellidiora, obscure nervosa.

Petiolus folio parum brevior
Petunciuli axillares, ^{solitarii} longitudinis foliorum, absque geniculo #

[Lit. N. p. 29.]

Involucrum pentaphyllum, oblongum, acutum, intus glabrum # 8 loca quinque
in capitulo aggregatis, se se in capitulo

~~(Affinis hypocistis foliis per capitulo multo major)~~

Involucrum pentaphyllum: folioli oblongi longitudine calycium
oblongo, acutum, intus glabrum.

Calycis foliola ovato-lanceolata, acuminata, intus glabra, corolla
triplo breviora.

Corolla 6 pollinaria, pili longi in lineis quinque digestis, hippidus
^{caulis}

77 80

#

Stigma capitatum
castula subglobosa, calyce brevior, longissima, glabra

caulis

Lundæ

(ab 9. Tamnifolia differt, petria, corollis magnis extus hispida nec minutis glabris
foliis calycinis ovatis nec lanceolatis canaliculatis. Fronsa tamnifolia
Burmanni fl. Dyl. forte ad nostram spectat

~~Abster in monte adoo Hrofilis
Tromm tenur per totat
fata nullo, calycis tantummodo subferebat. Petala multilobis, laciniis linearibus
hinc inde dentato saepe in reperta in pennis reflexis. Ramiis subul-
mifloris longioribus petalorum reflexorum petalis hinc petalis. Petala calycis
ma orosa acuta. Corolla rubea lobis lobis acuta pennis linearibus
penigione pulchra instructis albis~~

multilobis
Convolvulus folius 9partitis laciniis linearibus dentatis, pedunculis unilobis

Stolonifera. Consolida folio trilobis subquaque lobis lobis interangulis
oblongis glabris, pedunculis ternis unisifloris, caule proce-
bente.

Habitat in Oriente herb. Dospitali.

Caules herbacei, glabri. Dolia longe petiolata, semi pollicaria,
avenia, crassa, 3 fida lobata: lobo intermedio longiora, oblongo,
inferne attenuato, obtusissimo, laterales breviores, sublobi.

Petiole tri pollicares. Flores ex apice, breviter pedun-
culati, sesqui pollicares, glabri. Pedunculi breves. Calycis
foliola lanceolata.

humilis, Convolvulus

Convolvulus humilis Jacq. Coll. 4. p. 209. Tab. 22. fig. 2.

Habitat

○

Caulis erectus vel. dependens teretes 2-3 uncialis simplicis semis ordo
fi. folia oblonga, obtusa, integerrima, ciliata utriusque herpetata,
uncialia, cymosa petiolata, superiora simplicia. Flores ut illarum solita
ni simpliciter. Calycis foliola ovata-acuminata, herpetata, proaequalia.
Coblis carnis. Capsula pilosa bi-loculari. Stigma bifidum Jacq.

~~forte~~ eadem cum *perfoliata* nostris

Fesili florus - Convolvulus - ^{folius} ~~foliis~~ ^{oblongis} ~~pluribus~~ ^{inferioribus} ~~subspatulatis~~ ^{superioribus}
ovato-lanceolatis, capsula ^{sub} ~~sub~~ ^{superioribus} ~~pelosis~~

Habitat in Hispania.

Caules plures, decumbentes, simplicissimi, teretes, villosi, squamati.

foliis fasciatis, ^{obovatis, acutis, serratis, pubescentibus, glaucis, in nervis} ~~inferioribus lanceolatis, obtusis, dilatatis, glabris, supra~~
ovato-lanceolatis, ^{acuta} ~~pelosis~~, apice cum floribus congesta.

Pedunculi vix ulli. Flores solitarii

Calycis foliola ovata, acuta.

Corolla parva, calycis duplo longior, villosa

Capsula globosa, mucronata magnitudine nesi

abo

huc pertinent }
(Convolvulus Desfont
humilis Gaucum
undulatus Caran
ciliatus Rota Cabal. 1 et 2.

Serpens Convolvulus foliis cordatis dentato angulatis glabris, pedunculis
tanescens, bus quinque floris, floribus umbellatis, caule repente

Habitat in India orientali est herb. Turcorum
Caulis ^{amosus} repens, rami erecti, gracillimos, filicinoscentes. Folia longe petio
lata, vea pallidiora, concava, serrata angulata, glabra, subtus pallidiora,
nervis pelosis. Petioli folio longiores. Pedunculi axillares, petiolo parum
longiores ^{conscientes}, uti petioli. Pedicelli ^{longi, repedi cellati}, quae, umbellati; Calycis folio
la subrotunda, membranacea, super folium parviter am

plicatus Consolvidulus villosus, foliis cordatis ^{subinciso} ~~in~~ ⁱⁿ ~~aequaliter~~ serratis lineatis
subtus nervosis, pedunculis sub bifloris, caule prostrato
Cap. volubilis capensis, foliis orbiculato laciniatis, pedunculis latera-
libus unifloris Buxm. prodr. fl. cap. p. 5.

Consolvidulus plicatus, tomentosus, foliis cordatis, acutis, angulato
serratis rugosis plicatis, pedunculis sub bifloris La Mart. illust.
p. 458.

Habitat in Cap. b. spei Lesb. Thesperi

caulis angulatus, ~~prostratus~~ solia petiolata, semipollucina,
acuta, inaequaliter serrata, subincisa. Pedunculi axillares,
uni v. biflori, semipollucares, inaequali. Calycis lacini oblongi,
acuti villosi.

affinis althoecide

~~annulatus~~ Convolvulus

~~Ved. t. la man~~

capensis. Convolvulus foliis cordato-subrotundis hirsut. incis. lobatis
hirsutis, pedunculis bifloris.

Convolvulus capensis; folus orbiculato-lacinatis, pedunculis
lateralibus unifloris. Burm. fl. prodr. fl. cap. p. 5.
Habitat in cap. b. p. per herb. Royeni.

pelosellofolius Convolvulus

Convolvulus orientalis humifusus *pelosellofolius* Tournef. Cor.

Habitat in oriente.

Pilosus, decumbens. Caulis elongati, teretes. Folia pollicaria, sessilia, lanceolata
integerrima. Pedunculi axillares. Folia duplo longiora, filiformes; bij. triflo-
ri. Flores alterni, parvi: folia duo ad basin pedicellorum. Calycis foliola
lanceolata, acuta, semunquiculata.

Spithameus Convolvulus ^{villosus} foliis ^{cordato} sagittato-oblongis villosis, auriculis rotun-
datis, pedunculis ^{atropatis} subbifloris, caule & abro

Convolvulus virginicus leviter hirsutus et oblongis foliis, flora
maximo albicante Parh. Rayi hist. pl. 3. p. 373. no 146.

Convolvulus spithameus. foliis cordatis pubescentibus; caule villoso,
pedunculis unifloris Lin. Syst. Veg. p. 210. ?

Habitat in Virginia herb. Vaillantii

Caulis volubilis, teres, villosus, et punctis elevatis & abro. Folia pe-
solata, polliciana, obtusissima, integerrima, obscura venosa, utrin-
que leviter, ^{villoso} auricula ^{interior} uniangulata. Petiolus pollicans
set ultra, villosus. Pedunculi axillares, spithamei, p. tenumque
biflori, raro uniflori, villosi: pedicelli bipollicares. Bractea linea-
res, ^{uniquifaster} duo ad basin pedis et duo pedicellorum et duo in altero pe-
dicello ad apicem, villosi. Calyx solidus oblongus, obtusus, andro-
villosus. Corolla glabra, magnitudine Conv. & ammonii

Nunc revera Lin. C. spithameus Lin. est asserere non audeo, cum
hinc et inde differentia nihil certi concludere licet, propter Synon: Solum
modo ansam coniecturae dedit. Vaill. a Pehrereis habuit & recte recordor

Futiculus Convolvulus

Habitat

herb. Desfont.
^{terre des}

^{en can-can-cola}

Volubilis. Rami filiformes, puberulescentes. Folia petiolata, ~~longa~~ ^{longa} pollicaria, basi
subcordata, ^{obtusiuscula cum mucrone brevissimo, subtus subrepens} acuta, pervegemina, ^{que} ~~lenti~~ villosula. Pedunculi axillares, solitarii
uniflori, folio breviora, sesqui ^{pediculi} bracteas duas subulata. Calycis foletola oblonga
obtusiuscula, villosa. Corolla parva, radii omnes villosi

pubescenti. Convolvulus foliis cordatis, acuminatis subtus villosis, pedunculis ~~fr~~
angulatis, fructiferis reflexis, calycibus ovatis

Habitat in Yava herb. Gussonei

Caulis herbaceus, volubilis, superne villosus. Folia petiolata, pollicaria, cordata, acumi
nata, obtusa, mucronata, supra obsolete septemneria, glabra, subtus subvenosa, villosa.

Petioles folio breviores, canescentes. Pedunculi axillares, medio articulati, supra medium
crassiores, fructificante reflexi, angulati, uniflori. Calycis foliolo, ovata, obtusifor
la glab^{ra}. Capsula globosa, glabra, pisp. majores.

ampullacea Convolvulus foliis cordatis trilobisque pilosis, pedunculis brevissi-
mis multifloris, corollis ampullaceis, caule. Calycibusque herbis.

Habitata Yara herb. Guspei

Caulis scandens, herb. Folia petiolata, tri vel quadri pollicaria, cordata, integra vel
triloba, venata, integerrima, acuta, utraque pilosa. Petiolis et calycibus herbis.
Pedunculi axillares, brevissimi, multiflori. Calycis foliola lanceolata. Corol-
la unguiculata, inferne dilatata, superne coarctata ovata. Pedicelli brevi
Corolla ampullacea diagnositur a reliquis.

speciosus Convolvulus foliis cordatis & subtus tomentoso venicis, pedunculo petio-
lo longioribus umbelliferis, calycibus acutis H. kew. l. p. 211.

Samudra Trogam Hort. Mal. 11. t. 61.

Convolvulus nervosus, foliis cordatis nervosis, subtus tomentoso &c, pedun-
culis umbellatis multifloris Burm. fl. ind. p. 48. t. 20. fig. 1.

• Convolvulus speciosus; foliis cordatis ovatis acutis hirsutis, subtus ar-
genteo venicis, petiolo teretibus Lin. Suppl. p. 137.

Habitat in India orientali

Planta speciosa. Caulis teres, tomento mollescentis incanus. Folia petio-
lata, maxima, acuta, nervosa, supra glabra. Petioli longitudine folii. Pe-
dunculus tomentosus incanus, multiflorus. Umbella 3 vel 4 radiis, involu-
crata: involucrium magnum, vel trochylam, foliolis ^{descriptis} ovatis, acumine longo
terminatis, extus villosis, intus glabris, coloratis, venoso reticulatis,
deciduis: pedicelli 3 vel quatuor, involucrii & structura involucrii. Caly-
cis tomentosus incanus: foliola oblonga. Corolla purpurea, radiis quinque
villosis argenteis ad medium ^{extus} villosis et superne radiis quinque argen-
tes villosis

Laciniatus *Convolvulus*.

Habitat in monte vides Comma for herb. huj.

Caules filiformes, prostrati, glabri, ramosi, teretes, purpurei. Folia petiolata, unguiculata, interdum pollicaria, subpinnatis multifida, glabra: laciniis linearibus, angustis. Stipula nulla. Pedunculi axillares, longitudine foliorum, uniflori, superne bracteae duae lineares, glabris. Calycis foliola oblonga, seorsim, obtusa, mucronata. Flores albi, umbones purpurei, unguiculati.

Folia sparsa laciniis subpinnatis
Diversa videtur a mea laciniata

3-9 acuminatus Convolvulus foliis cordatis trilobis, ^{attenuatis} acuminatis, ^{adpressis} pedunculatis atongatis Cal. multifloris calycibusque glabris.

Habitat in Insula St. Eustachii de West

Caulis volubilis, ad lentem ^{adpressis} aenioribus adpressis minutis
folia petiolata, ^{quadrupollicaria,} cordata, triloba, ^{basipollicares tres vel ultra longa} glaberrima, nervosa, subtus
vel integra panem pallidiora, in acumine longo attenuata, acuta, inter
gemma. lobi laterales lanceolati, intermediis ovatis, attenuatis.

Petioles foliis longiores

an. Convolvulus
Dill. Elth.
Fig. 100

Pedunculi axillares, longitudine petalorum. Flores cincti
sque alterni. Pedicelli sequipollicares, sub flore panem
crasposi. Bractea lancea ad basin singuli pedicelli, lanceola
ta, attenuata, tenuissime nervosa, glabra.

Calycis foliola lanceolata, attenuata, pollicaria, tenera,
tenuissime nervosa, glaberrima, interiora duo panem breviora

Corolla magna, campanulata, purpurea, fundo pallido,
radiis sive lanceolatis, attenuatis, ad marginem excurrentibus, pallidioribus.

Stigma capitatum

althaeoides *Convolvulus* foliis cordatis pinnatis sericeis: lobis repandis, pedunculis ^{unifloris} bifloris L. L. V.
pag. 202.

Convolvulus foliis albae Clus. hist. 2. p. 49

C. argenteus, folio albae Bauh. pin. 295.

C. betonica albaeque foliis, repens argenteus Bamel. ec. 312.

C. foliis cordato digitatis sericeis: foliis linearibus: intermediis duplo longioribus
vind. Cliff. 10. Sauroy. Marf. 202.

β. *Convolvulus* argenteus elegantissimus, foliis tenuiter incisus Tournef. inf. 85

C. sericeus Doffh.

Habitat in Europa meridionali, Orientali, Africa collibus, agris &c.

Caulis prostratus pilosus: folia inferiora cordata ^{subsericea} inferiora ^{marginata} incisae, dentata
pinnata, superiora palmata, lobis lanceolatis intermediis dentata. Calycis
foliola 3 pelosa oblonga acutiuscula, 2 glabra ^{pauciflorae} obtusa. Corolla
purpurea, ~~rad. purpurea~~ ante florescentiam pelosa, dein radice apice
pelosa. Pedunculus foliis triplo longior supra medium bracteis linearibus
13. Differt foliis omnibus ^{sericeis} ^{temerunguiculanibus} & quae partibus

alth. Con. foliis cordatis inferioribus cordatis incisae pinnato dentatis, superioribus pal-
matis quinque partibus, pedunculis unifloris

culta est h. Upp. foliis glabronibus inferioribus cordato lobatis lobis angulatis

althoideis Convolvulus Lin. Sp. pl. pag. 22.

Convolvulus sericeus; caules volubili; stemata simplicia; foliis palmato pedatis,
pedunculatis unifloris Cosch. descr. pag. 204.

Varietas hoc Convolvulo althoide tenacior est. Corolla minor. Lobula exte-
rior calycis non petosa, sed pubesca. Vellofitas in foliis densior quam in
C. althoide. Ita vero differentia minus sufficiunt pro specie distinguen-
da, praesertim cum in speciminibus variis in Europa australi et Tuneti-
ca, foliis plus vel minus dissectis varie ludat secundum locum. Lobia
superiora in Convol. altho. omnino eadem sunt, ac in sericeo Cosch. ideoque
que tantummodo ut varietas consideranda.

Journal des Appareils

laciniatus
multifidus Convolvulus villosus; foliis tripartitis: laciniis linearibus latera
libus bipartitis, intermedio pennatifido, pedunculis unifloris
Habitat in montibus Brasiliae dedit Dr. Thonin

Caulis tenuis, villosus, ^{congruus} ^{on} ^{prostratus?} ^{prostratus?}
folia petiolata, pollicaria, tripartita: laciniis linearibus; latera
libus bipartitis, lacinia intermedio bifida, ^{retrosum fremitante} intermedio pennatifido: laciniis linearibus, in foliis inferioribus parum lateribus
subdentatis, in superioribus angustioribus integerrimis.

Petioles seminuqui ^{teretes} ^{lucerna parva crassiores} ^{crassiores}
Pedunculi solitarii, uniflori, longitudine foliorum, villosi

Calycis foli superne bracteis binis linearibus

Calycis foliola oblonga acutiuscula, villosa, ^{semiuqui} ^{quiculata}
vel parum ultra. ^{alba} ^{concolorata}

Corolla calycis duplo longior campanulata, extus lineis 5 pilosis: lobis
apice pa barbato; pili florescentes

~~varietas Con v. althooides~~

~~Convolvulus argenteus elegantissimus foliis tenuiter laciniatis subbipen~~

confer. un. respecto la Martii

4 n. pag. 5

Convolvulus laciniatus foliis tenuiter laciniatis subbipen
natis, pedunculis unifloris, calycis fructus nudiuspulo la
Martii ^{excultor} pag. 3. pag. 546

Crenatus Convolvulus tomentosus subpinnatus; foliis cordato-oblongis ^{obtusis} subpinnatis
fo. crenulatis; pedunculis unifloris
Habitat in monte video Brasiliae Comestor ded. Dr. Therin
Caules ^{herpeticulans} ~~herpeticulans~~ subpinnatis, tomentosus, mollis, subpinnatus.
Folia oblonga, basi cordata, auriculis rectis obtusis, crenato-dentata,
apice subpromota. nervosa secundum nervos sublineata
Petiolus foliis brevior.
Pedunculi solitarii, foliis squantes; versus apicem folia gemina, setacea,
Calycis lobula acutiuscula.
Corolla glabra

eustachiana C. foliis cordatis trilobis, pedunculis bifloris
Gnomon Eustachiana Jacq. obs. 2. pag. 12. tab. 38
Habitat in Insula Eustachii

non vidi

triloba 7 foliis trilobis cordatis, pedunculis trilobis Lin. Sp. pl. p. 229 x

Convolvulus pentaphyllos minor, flore purpureo? Raj suppl. 3 81. Sloan
bot. 1. p. 153. t. 97. fig. 1.

Habitat in America B

trilobus C. foliis inferioribus cordatis trilobis superioribus quinquelobis
pedunculis trifloris Encytop. oculo armato pilis raris

Caulis adpressus foliis pilis raris. Folia petiolata triloba
calyx ^{calyx} ~~lobis~~ intermediis major ovatus mucronatus laterales semi
cordati. pedunculi axillares longitudine petiolorum at
craspori; ~~tri~~ tri vel multiflori pedicelli umbellati angulati
marcati. bractea subulata foliola calycis oblonga acumina
ta pilosa ~~pediculis~~ tuberculo minuti insidentes

----- ~~pedunculis~~ pedunculis ^{tri vel} multifloris pedun ^{culis}
culis ^{culis} angulatis mucronatis calycibus pilosis.

Cal. 6 phyl: foliola 3 externa lanceolata basi emarginata
ba patula semilinearia 3 interna ovato-oblonga
natis pmo externa triplo majore.

Nota 6. simpliciter pericarpio biseriato, sublobata
lobo emarginato: folioli calycinis externa breviora
hamula nulla

Gemmae parvae sub tubo corollae: lobi rotundati Styl. 0.

Styl. 3. lobi gemmarum adpressi tubo corollae
duplo vix subrotundo parvis compressis diametro
subaequali, unilocul. Maxilliformis concipitur
transversale medium per duplo extensum unde fructus
nuncio intus tubo corollae videtur

Caecidiorum

Tapia C. incermis, foliis integerrimis, lateralibus basi antica brevioribus Linn
R.V.

Malis americana Infolia, fructu pomi aurantii infra colorato Comm.

hort. t. p. 129. t. 67.

Apocorodon f. arbor americana triphylos, alii dicitur, poma ferens Plukn
alm. 34. t. 137. f. 7.

~~*Nervala* Schrad. Mal. p. 129. t. 42.~~

Habitat in India

Rami teretes cortice cinereo. Folia ad apices ramorum congeste
petiolata alterna, ternata foliola petiolata, ovata
acuminata, glabra integerrima, nervosa. Vena non
crassa bipollicaria subaxillaria. Peduncululi ad apices
ramorum congesti uniflori bipollicares. Petala bracteata
tuda. Germen subglobosum. Petala unguiculata
calycis foliola ovata parva unguis unguiculata.

— foliis
obtusis

petalis ovatis

hercata & spica simpliciter androgyna linearis, superne mascula, femineis
anfractis; anfractis apice uncinatis aequalibus Sw. prod. pag. 10.
Habitat in Jamaica

Westii

10-19 parviflora

Ipomoea foliis cordatis quinquelobis palmatis, umbellis axillaribus pedunculatis, calycibus capsulisque pilosis.

Convolvulus pentaphyllus minor, flore purpureo Roem. hist. jam. 1. pag. 153. tab. 97. fig. 1.

Habitat in insula. s. Cruce de Rector West.

Caulis volubilis, glaber, a lineis decurrentibus triangularis, lavis.

Folia petiolata, sesquipollicaria, glabra, ^{subtus pallidiora:} lobis lanceolatis, obtusis, mucronatis; laterales breviores, intermediae duo angustiores ultimi extrosus basi gibbosi: intermediae duo angustiores.

Petioles filiformes, foliis longiores.

Pedunculi axillares, petiolo triplo crassiores, foliis longiores, triangulares.

Pedicelli terni vel quaterni, angulati, mucronati, unguiculares, uniflori, basi articulati.

Calycis foliola ovata, mucronata, pilosa, longitudine capsulae.

Corolla parva

(affinis Q. 4. Inloba diversimode differre videtur, caule glabro lavis, nec hirsuto scabro, foliis glabris, quinquelobis, pedunculis plerumque sexfloris)

Cainicus Convolvulus foliis palmatis glabris serrulatis, stipulis foliiformibus palmatis, axillis
tomentosis, ^{calycibus} floribus paniculatis lobis

Convolvulus henneaphyllus, flore purpureo Barrel. Fr. 320.

Convolvulus Cainicus foliis pennatis palmatis serratis, pedunculis filiformibus
paniculatis, calycibus lobis Lin. S. V. pag. 202.

Ipomoea palmata, foliis palmatis, lobis squae lanceolatis, extimis bifidis; pedun-
culis dichotomis Cosm. Def. pag. 43.

Azella dense pilosa, eodem tota planta glaberrima.

Solida septemfida: lobi lanceolatis, serrulatis, mucrone terminati, laterales breviores

res.

Folium utrinque ad basin petioli, structura foliorum caulis:

Pedunculi folio duplo longiores: pedicellis versus medium bibracteati

Solida Calycina glabra, obtusa.

Corolla campanulata

Stigma capitatum, bilobum

Convolvulus egyptius Vestl. gypt. 73. t. 74

Habitat in Egypto

Convolvulus stipulatus foliis palmatis pennatis serratis
pedunculis compressis unifloris calycis mucronato lobis

Mark Encyclop. 3. pag.
Memoria Vestl. Convolv. gypt. 73. t. 74 huiusmodi ad Convolv.
ulum althoorden amandatus

multifidus Q. foliis palmatis lobis septeni linearibus integris, caule
decumbente Thurb. prodr. pag. 35
~~Consulida~~ oleifolius hirsutus, foliis omnibus profunde lacini-
ti subpalmatis; pedunculis paucifloris folio Congoribus Eriyel.
Habitat in Cap. b. p. ei
Pedunculi uniflori

non vidi

Diſſectus Convolvulus foliis palmatis ſeptempartitis dentatoſinuatis glabris, caule pilolo pe
dunculis unifloris ~~L. l. v. pag. 202~~ Jac qu. obf. 2. p. 4. t. 20. Hort. Virid. 2. t. 15. g. l. v. pag. 202.
Habitat

macrocarpi *Convolvulus* foliis palmato-pedatis, quinque partitis, pedunculis unifloris

L. S. V. pag. 202.

C. polyphyllus, flore et fructu purpureis maximis Plum. spec. 1. 7c. 91. fig. 1.

Habitat in America.

~~que partita~~ lobi lanceolato-ovati

folia ~~quinata~~ ^{integerrime serrata} ~~argentea~~, laterales minores. Pedunculis
incrassatis unifloris, alatis. ~~Stem~~ ^{Stem} plii articulatus, plicatus
her.

micronatus Convolvulus (volubilis) foliis palmato-pedatis, lobis ciliatis apice mucronatis pedunculis unifloris. Syst. prod. n. 79. ^{Locum} ~~Bot.~~ Gott. 1789. p. 52
Habitat in Insula St. Jacobi &

Caulis tenuis ramosi. Folia petiolata, foliola quinque profunde palmata
lobi quinque ovato-oblongi, duobus ~~extremis~~ bipartitis. Pedunculi autem
res solitarii uniflori cespitulosi. Corolla pallide purpurei magnitudine
corollae arvensis. Stigma leviter bifidum

paniculatus Convolvulus foliis palmatis: lobis septem ovatis acutis integerrimis, pedun-
culis paniculatis L. S. V. p. 202.

~~β. Pal-modesta Rheed. ^{Mal.} Sp. 39. t. 20. 11. p. 101. t. 49~~

β. Modesta Rheed. Mal. S. p. 30. t. 20. Raii suppl. 374

Habitat in malabari arenosis

varia foliis trilobis: quinquelobis L.

quoad conf. Rheed. n. d.

40-41
tenaxifolius
pusillus

Convolvulus ^{Digitatis ~~quibus~~ foliolis: foliolis} ^{uncanibus}
~~palmatis quinque partibus lobis filiformibus, pedunculo~~

lis subquadris floris
Habitat in India occidentalis dedit dr. Banks

Totus glaber.
Pauis angulatus, volubilis. Folioles quini vel seni pinnatis, angustis pinnis
Folia petiolata ~~repunata~~ ^{Digitatis} ~~laevibus filiformis~~, ^{integerrimis} ~~4 vel quinque floris~~

Nuncioli axillares, breves, pedicelli ut plurimum ~~quatuor~~ ^{quatuor} vel
quinque, hinc rones interdum uniflori

Calyx glaber: foliola oblonga

Stigma acutum

Litr. I. pag. 53.

92

82

3536 ###

gemellus Convolvulus foliis cordatis ^{pubescentibus}, pedunculis bifloris
Convolv. gemellus caule solubili, foliis cordatis glabris, pedunculis bifloris Burm. fl.
Ind. p. 46. Tab. 41. fig. 1. *

Habitat in Java Burman.

Caulis debilis superne pubescentis. ^{exserte} Folia cordata, ^{non} obscure quinque nervia, ^{obtusis cum} ^{micronuda} subtus palli-
diora vix pubescentia, pollicaria longitudine petioli. Pedunculus petioli longitu-
dine superne incrassatus, biflorus. Pedicellus ^{altus} pedunculi fere squaratus, alter
brevior crassior aphyllus, alter venosus medio bibracteatus, maturitate reflexus. Caly-
cis foliola oblonga obtusa vix pilosi. Corolla multoties calyce major

glaber Convolvulus ^{septenatose} glaberrimus, foliis quinatis ^{digitatis}, foliis lanceolatis
pedunculis dichotomis

Convolvulus pentapetalos, flore magno albo Aubl. fl. Guian. p.
130. t. 53.

Habitat Cayenne hab. Juss. et Richardi &

Caulis teretes, laxes. folia petiolata. foliola 5que vel 7. petiolata,
bi 4. tripollicaria, laterales minorae, utrinque acuta, pubes obscura
venosa, obtusiuscula, mucronata. Pedunculi axillares; interdum
longitudine folii vel longiores; interdum breviores, bis dichotome divi-
si, nudi. Calycis foliola semi pollicaria, oblonga, obtusa, mem-
branacea. Corolla campanulata, pollicaris, alba. Stigma bila-
mellatum

glaber Convolvulus foliis quinatis quino
glaberrimus

Handwritten signature or initials

venosus ^{glaberimus}
 glaberrimus Convolvulus (foliis digitatis, quinatis glabris: foliolis petiolatis acuminatis ^{intermedia sub ovata}
 39-40 integerrimis pedunculis multifloris pedicelli umbellati

Patriam ignos forte habitat forte in India Orientali.

Caulis volubilis, teres, glaber intermedia sub ovata

Folia petiolata, Digitata. Foliole quina, petiolata, ~~bipinnata~~, ~~longiuscula~~

by pollicari ^{vel} parum ultra, lateralibus solum minoribus et angustioribus; omnia

acumine semi pollicari terminata, integerrima basi mucronata, ^{utrinque}

varietas foliis ^{lineari lanceolatis} nata, basi acuta, glaberima, venosa, integerrima.

in herb. 4. usq.
 # sub flore
 parum crassiores

Pedunculi folio longiores, teretes, glabri. Pedicelli umbellati, pollicari

caespitales divisi, Solium ^{ovato} cordatum, ~~ovato~~ ^{pollicari} acuminatum, semi-

solitarius ad basin pedicellorum.

Calyx glaber: foliolis ^{ovatis}, margine fere membranaceis, duobus majoribus semi-anguiculaibus.

Corolla fere pollicari in fund. bulbiformis.

Stigma caputatum subbilobum.

91

Accedit ad Conv. glabrum ~~glabrum~~ Aubl. fl. Guian. tab. 53. differ-

foliis acuminatis videtur pedicellis pluribus brevioribus, Corollam tubo diametro non vix attenuatis pollicari nec sursum versus sensim ampliatum

macrochilos Convolvulus foliis digitatis septenis ^{repandis} integerrimis, caule glabro, pedunculis
trifloris L. l. v. p. 202.

C. coccineus heptaphyllus, radice crassissima Plum. fruct. t. ic. 90. f. 1.

Habitat in America.

Caulis glaber. folia digitata, 7na, lanceolata, sinuata, acuminata

Pedunculi plerumque triflori. Corolla coccinea. Burm. 4c: Plum. l. c.
Secundum Burm. sequentia synonyma hujus sunt.

~~Convolv. Americanus heptaphyllus, flore alba, fundo purpureo radice tuberosa~~

^{la}
Convolv. major heptaphyllus, flore sulphurea odorato, speciosus sicut Koen
hist. jan. t. p. 152. v. 96. fig. 3

Sponso heptadaetyla major, siandensis, flore majori campanulata,
calyce membranaceo, seminibus majoribus villosis. Brown h. jan. p.

155.

eriospermus Convolvulus foliis subseptematis digitatis linearibus, pedunculis
Dichotomis, ~~caulis fruticosus~~ seminebus hirsutis, caule fruticoso
Convolvulus eriospermus; fruticosus, foliis digitatis: foliolis suborbis-
nis, linearibus angustissimis; seminibus hirsutis. La Mart. Med. ex.
p. 462.

Habitat in Domingo. herb. Gussonei

Caulis, uti tota planta glabra. Solea petiolata: foliola subsessi-
lea, unguiculata, lateralia minor, integerrima, basi attenuata,
glabra, subtus pallidioribus, obtusiuscula. Pedunculi axillares,
foliis longiores, rigidi. Calycis foliola aequalia, oblonga, obtusa,
Corolla tubulosa, superne parum ampliat^{us}, capsula obovata,
glabra,

~~afanifolius Convolvulus~~

~~Folia uniformi serrata. Calycis foliola oblonga, obtusa~~

i

asanifolius Convolvulus foliis subrotundo cordatis, pedunculis subtrifloris: 6
lobis calycinis exterioribus brevioribus

Convolvulus asanifolius, foliis reniformibus, latis, venosis, nudis; caule
solubili; pedunculus subbiflori. La Mart illust. pag. 460

Habitat in Senegal herb. Fusca.

Caulis teres, glaber, parum ramosus. Rami teretes, glabri. Folia petiolata,
ut bipolliciana et ultra, integerrima, glabra, subtus venosa et
sture venosa. Petioli foliis breviores. Pedunculi axillares bipe-
dniflori: pedicelli unguiculati, interdum mucronati. Calycis foliis
ca duo exteriora breviora, omnia oblonga, obtusa. Corolla magna
bipolliciana, tubo diametro semipollicari. Signa capitatum
d-dymum.

japonicus Convolvulus foliis hastatis lanceolatis: ^{lobis} foliis lateralibus unidentatis, ~~caule volubili~~,
pedunculis unifloris Thunb. fl. jap. p. 85* P. V. pag. 200

Kos et hugh Kromp. La m. ex. p. 856

Habitat in Japonia herb. Royeni

Folia petiolata hastata glabra: Lobis intermediis lanceolatis integerrimis, ^{acutis}, pollicariis; latera-
lis lobi postici a unidentati dente interdum brevi, interdum longitudine dimidia lobis, se mi-
pollicariis. Petioli filiformes, reflexi, glabri, folio triplo brevioris. Pedunculus longi-
tudine folii, filiformis, glaber. Calycis foliicola ovata, acuta integra glabra: Thunb.
L. c.

foliis lanceolatis hastatis acutis, auriculis posticis ~~rotundatis~~
unidentatis, caule simpliciter

^{auricula}
Folia hastata, oblique transversa, saepe bipida. Lobis divaricatis, pollicaria
glabra. Pedunculi uniflori, axillares, longitudine foliorum. Calycis
foliicola oblonga. Cor. magnit. Cor. arvensis. Bractea nulla in pedun-
culis

mitisynotus

crinitus Convolvulus velosus, foliis cordato-ovatis, floribus capitat~~is~~ involucriatis, involucri subpetiolatis, calycibus tubulatis.

Convolvulus crinitus; foliis cordatis, subnudis; ca. petalis hirsutis ^{pinis}, longe pedunc. ulatis, involucriatis, capsula lori La Mark. Illu. Strat. p. 463.

Patris ignota, herb. fuscis

Caulis ^{herbacis,} (e punctis elevatis) scabriusculus. Folia pollicaria, utroque pilis nufescentibus adspersa. Peduncululi axillares, 3-4 pollicares. Flores in capitulo collecti, copiosi, e fusco ferrugineo hirsuti. Involucria oblonga, unguii ularia vel minor.

Domingensis C. foliis cordatis, racemis numerosi secundis, calycis acuto
glabro. Encyrtis

Habitat in Domingo 5

caulis teres glaber. Folia acuta, excepto ^{subtus} costis glabra. racemi breviter fre
quentes vespis similitudinem ramorum longe penduli. foliola calycis
ovata, inaequalia. Stigma capitatum bilobum. Corolla campanulata

15-16

Hesperidus Convolvulus ^{floribus} hirsutissimus, foliis cordato-ovatis, pedunculis umbellatis,
pedunculis brevissimis
Habitat in Arabia orientali in Dahl.

Caulis domnia herba, volubilis,
si j. t. in pollicario, petiolato,
folia cordato-ovata, acuminata, ultra pedicellam multa, attenuata,
integerrima, pubes parum pallidiora.

Petiolus folio brevis dimidia brevior
Pedunculi breves; vir femur quiculares. Pedicelli umbellati, longitudi

ne pedunculi.
calycis foliola lanceolata, acuminata, intus glabra, laxa.

Corolla parva
Convolvulus
(a reliquis foliis integris dignoscitur facile hirsuti

~~Habitat in Convulvulis foliis lanceolatis hastatis obtusis: auriculis subintegerrimis, pedunculis unifloris. caule fruticoso~~

Habitat in Insula Gallia. Thousin fruticoso hamifiliformis ^{hastata}
Planta tenera tota glaberrima caule lavi. Folia lanceolata, apice rotundata
microhata auriculis lanceolatis, acutis in ^{terdum} ~~non~~ latera inferiori denticulo
vix notabili, pollicaria. Pedunculus longitudine foliorum supra medium
foliola bina sterilia, foliola calycina rotundata. Corolla calyce duplo
longior. Petala reflexa.

a japonico differt foliis obtusis. Caule ramoso fruticoso. folia postea
dente vix conspicuo. Calycis foliolas obtusas

erianthus

~~involucratu~~

Convolvulus foliis cordatis ovatis attenuatis, floribus capitatis involucri brevioribus; calycibus lanicolatis.

Convolvulus capitatus; pilosus, foliis cordatis, floribus capitatis, involucriatis; pedunculis petiolo vix longioribus. La Martille Bot. p. 456.

Habitat in Senegal Galam Herb. Lusitani

Caulis ovulo armato adspersus tuberculis minutis, superne villosus, subferugineo canescenti. Folia petiolata, pollicaria, acuta, glabra supra arsena glabra, subtus venosa, vel nervis costa venis petiis non nullis adspersi. Pedunculi axillares, petiolo parum longiores, villosi. Florer in capitulo sessile. Involucrium polyphyllum. folioli oblongi, unguicularibus vel minoribus, acutis. Calycis hirsuti, feruginei, parvi. folioli lanicolato

Dominense Convolvulus

Habitata in Domingo herb. Jusf.

Caulis volubilis, Veris, glaber. Folia petiolata, bipollicaria, cordata, attenuata, obtusa, mucronata, tenuissime venosa, integerrima, costa subtus basi mucronata tomentosa. Racemi axillares, folio longiores, glabri, pedunculati pediculis distantibus bi. s. 3 flori, pedicelli filiformes, unguiculares, etradcati. Calycis foliola lancea-oblonga, obtusa. Corolla pollicaria, glabra

fruticulosus Convolvulus ^{laniccolatus} foliis linearibus basi subordatis subpetiolatis pe-
toliis pedunculisque brevissimis, caule fruticoso
Convolvulus fruticulosus; foliis linearibus laniccolatis, basi subordatis,
petiolis brevibus; ramis floriferis, confertis foliosis La Marti Illud.

p. 251.

Habitat in Canariis Ventenat
Caules 3-4 pedalis
Rami filiformes, teretes, puberulescentes. Colia in ramis floriferis
frequentia, pollicaria, integerrima, ope lentis villosula, subtus
subavenia, obtusiuscula cum mucrone brevissimis. Pedunculi
axillares, solitarii, pediculis parum longioribus, basin versus
4 ubi lato. Calycis foliola oblonga, ope lentis villosa. Corolla
parva, quinqueloba, radiis quinque villosis cum
purpureis alternantibus.

Consobolus laciniatus; foliis veniiter laciniato, subbipinnatis; pedunculis unifloris; calyce fructus nudiusculo La Mark Illustr. p. 493.

Habitat in monte viduo herb. Tussior

Caules foliiformes, prostrati, glabri, ramosi, teretes, purpurei. Folia petio-
lata, semi pollicaria, interdum pollicaria, subpinnato ^{spatiis} multifida,
laxius ^{subpinnatis} glabra. Laciniae lineares, angustissimae. Stipulae nullae. Pedunculi axil-
lares, longitudine foliorum, uniflori, superne bractea duo, lineares, glabri-
usculo. Calycis foliola oblonga, scariosa, obtusa, mucronata. Obolei
albii umbone purpureo, unguiculae res.

laciniatus meus est rarus varietas secundum La Mark secundum L. M. solubilis est.

Tuberculatus Convolvulus
foliis septempartito-palmatis integerrimis, axillis
glabris, pedunculis unifloris

Convolvulus tuberculatus. foliis digitatis, subpedatis, septempar-
titi lobibus; petioli tuberculato asperis, pedunculi unifloris
La Mart. illustr. p. 453.

Habitat in monte video herb. Turici

Caulis teres, 2-3 pedalis. ramis cineris. folia petiolata. laciniis
lanceolata acuta, mucronata, utrinque glabra, simpliciter
venosa, intermedia fere pollicaris, laterales breviores.

Petioli pollicares, teretes, glabri. Stipulae geminae, sessiles; ungui-
culares, squae partite. Pedunculi axillares, longitudine foliorum,
petiolo crassiores, angulati, supra basin articulati. Calycis folio-
la ovata, obtusa, glabra, margine parum scariosa. Corolla sub
campanulata, mediovis, purpurea. Stigma bitotum. Capsula
glabra, laevi unguiculari

Varia ramis tuberculatis petiolisque tuberculatis et levibus

Denticulatum Panicum racemis compositis, spiculis globosis velosis, foliis
ovatis, ciliato denticulatis, vaginis mucronatis hispidis
Habitat in India orientali. ^{terres}
Culmi erecti, stricti, simplices, glabri, striati, ter folia remote
unguitularia, stri patentissima, gla ^{supra} striata, supra glabra, subtus
nervosa, nervis subhispidis, basi ^{int} in infera apice margine tuberculis minutis
in spinularum ^{rigidiusculis} acuminatis ciliata. Vaginae foliorum breviores striatae
flavescentes, tuberculis in strias e punctis series punctis inter
strias peligeris mucronato hispido. Rachis angulata bipollicari
pedunculi capillares, flexuosi, patentissimi in proceris semipollicari
res, ^{3 flori} sursum sex in minoribus 2 flori ultimi uniflori. Spicula pedicella
to remote

nigricans Convolvulus hirtus, foliis cordatis trilobis subtus nives tomentosis, pedun-
culis bifidis.

Convolvulus bicolor hirtus volubilis, foliis subcordatis trilobis, subtus
incanis, pedunculis multifloris La Mark illustr. p. 461
Habitat in Senegal herb. Tus sici

Caulis teres, pilis longis nigricantibus hirtus. Folia petiolata, polli-
cana, basi cordata, triloba: lobi ovati, acuti, intermedio basi con-
tato, apice attenuata, supra pilosa, subvenosa. Pedunculi
axillares, longitudine foliorum, petiolo crassiores. Flores cincti
3. in quingula ramo, racemosi, distantes, uti calycis hispidi. Bractea
duo opposita lanceolata. Calycis foliola unguiculata, lanceo-
lata subulata.

Chinensis Convolvulus, pilosus, foliis cordatis lobis parallelis, pedunculis sub
bifloris, folioli calycinis cordatis

Convolvulus sinensis; hirtus; foliis cordatis, acutis; pedunculis submulta
floris, brevibus; calyce cordato La Mart. illustr. p. 458

Habitat in China herb. Tussioi

Caulis vix armato adspersus punctis minutis, & lobis vix sculis; pilis
albidis, prosetim & uerue vestitis. folia 2-3 pollicaria, basi sinu
obtus, attenuata, acuta, utrinque pilis raris adspersa, ~~subtus~~
venosa, integerrima. Patentes sesqui pollicares, pilosus. Peduncu-
li axillares foliis breviores, pilosi, 1-2-3 flori, basi ~~bractea~~ duo subu-
lata. Calycis foliola cordata, attenuata, acuta, pilosa, ciliata. Corol-
campanulata, unguiculata, raris pilosa.

pilosello foliis. Convolvulus foliis lanceolatis sessilibus, pedunculis bifidis
caule ^{prostrato} decumbente piloso.

Convolvulus orientalis, humifusus, Pilosella foliis Tournef. Cor.

p. 1.
Convolvulus pilosello foliis; foliis lanceolatis, integris, sessilibus,
margine pilosis; pedunculis elongatis, laxe ramosis La Mart. Illustr.

p. 455

Habitat in Oriente herb. Fusioi et Musci

et Conyion

Caulis teres, pilosus, ramosus. Folia pollicaria, integerrima, utrinque acuta, pilosa. Pedunculi axillares, foliis duplo longioribus
bifidi in medio foliola duo semiunguicularia, bifida. Flores
unicivisura sessilis, 4-5 in singulo ramo, remoti, subsessiles. Bractea
duo ad basin singuli calycis. Calycis foliola lanceolata,
acuta, semiunguicularia, villosa.

Adansonii Convolvulus foliis lanceolatis sagittatis auriculis divaricatis,
stipulis geminis linearibus, calycibus mucronatis

Convolvulus Adansonii; foliis hastatis linearibus, stipulis geminis
pubescentibus, calyce mucronato La Mark. Illustr. pag. 459

Habitat Senegal herb. Guisii.

Caulis repens? villis raris adpersus. Folia petiolata, fere tripolliciana
auricula linear-lanceolata, acuta, integerrima, glabra, arena. Petio-

stipulae un-
guiculares

lus sesquipollicianis, glabris. Pedunculi axillares, solitarii vel gemi-
ni, recurvi, uniflori, longitudine petioli. Bractea sub medio
pedunculi, subulata. Corolla sese calycis foliola unguicularia, ovata
obtusae, tuberculis aliquot adpersa, uti Corolla glabra. Corolla
sesquipollicianis.

capitatae *C. pilosae*, foliis cordatis, floribus capitatis involucentis, pedun-
culi petiolo vix longioribus line:

Habitat in Senegal

~~Totus pilosus - Caulis teres. Folia acuta bipolliciana long. 3-4
petiolorum. Pedunculi axillares solitarii floris terminales
copiosi sespiter valde villosi. Bractes 6-7 ovatae acutae in-
moderate. C. quales longitudine calycis. foliola calycis angusta acuta.~~

~~pilosus foliis cordatis ovatis attenuatis, floribus capitatis, corollis involu-
entis oblongis brevioribus, calycibus lanceolatis~~

Javensis Convolvulus foliis lanceolato-hastatis; auriculis lanceolatis, pedunculis
li foliis brevioribus chordatis

Habitat in Java herb. Musc.

Raules procumbentes, glabri. Folia petiolata, ~~lanceolata hastata~~, sesquipollucina,
glabra: ~~auriculis lanceolatis~~, integerrimo. Pedunculi axillares, solitarii, uni-flori
foliis brevioribus, chordatis. Calycis foliola oblonga, obtusis glabra.

abraceatus Convolvulus foliis cordatis oblongis acuminatis, pedunculis
petiolo brevioribus abraceatis

Convolvulus abraceatus; foliis cordato-sagittatis, postice obtusis;
pedunculis petiolo brevioribus abraceatis La Marck. Illustr. p.
451.

Patna ignota herb. Desfontaine.

Species C. Sculi - Caulis herbaceus, Tenax, sesquipetalis, villosus.
Folia petiolata; sesquipollicaria, remota, acuta, integerrima;
lobi rotundati, aevia, enervia, juniora villosa. Petioli longi-
tudine fere folii. Pedunculi axillares, solitarii, petiolo duplo
breviores. Calyces ralloi pilosi. foliola ovata, duo exteriora parva
latiora. Corolla magnitudine Conv. pentapetaloidis, squae fido
glabra, alba.

Capitatus Convolvulus

Habitat nest-Gus

Caulis volubilis, pilosus; oculo armato tuberculis minutis, superne villosus subfermeque
caerescens. Folia petiolata, pollicaria, cordata, ovata, attenuata, acuta, glabra, supra
arsenea, subtus venosa, pilis nonnullis in costa et nervis. Petioli pilosi, folia triplobe
vires. Pedunculus axillaris, petiolo parum longior, villosus. Flores in capitulo
sessiles. Involucrum polyphyllum: folioli oblongis, unguicularibus vel mucronatis
acutis. Calycis dispartiti, fernegenei, parvi: folioli lanceolatis. Corolla involucris brevior
res

chenopodioides Convolvulus villosus, foliis ^{oblongis} ~~ovatis~~ ^{induso serratis}, floribus subsessilibus

Convolvulus chenopodioides; villosus, foliis ovatis, serrato-sinuatis, floribus solitariis subsessilibus La Mark illustr. p. 452.

Patna ignota herb. Tusproi

Caulis herbaeus, saepe prostratus, se pilis a uti tota planta e pilis albidis
rescens, teres. Folia petiolata, pollicaria, remota, obtusissima
nervoso-venosa, basi acuta. Petiolus semipollicaris. Pedunculus
brevispimis, tribracteatis. Calycis foliola ovata, attenuata, acuta.
Corolla angusta, tubulosa
Volubilis secundum La Mark

asarifolius *Convolvulus*

Habitat herb. Tusc.

Rami teretes, glabri. Edia petiolata, bipollicaria, cordato-subrotunda, integerrima, glabra, subtus obscure venosa. Petioli folio breviores. Pedunculi axillares, brevis
Semi triflori: pedicelli unguiculares, mucronati vel glabri. Calycis foliola exteriora
duo breviora, omnia oblonga, obtusa.

patens Convolvulus foliis lineari subsessilibus, pedunculis foliis longiori-
bus apice bibracteatis subuni-floris.

Convolvulus patens; filiformis, suberectus; foliis lineari-bus, mi-
cro-natis; pedunculis patentissimis, foliis longioribus - La Martre
Illustr. p. 453

Habitat in Carolina Richard.

Caulis volubilis, ^{herbaceus} filiformis, villosus, haec parum ramosus. Folia
brevis sive petiolata, pollicaria, acuta, basi brevissime mucronata
basi obtusa, integerrima, interdum dente uno altero, supra
oculo armato pilis raris decumbentibus adspersa. Pedunculi
patentissimi ~~interdum biflori~~ Calycis foliola ovata, acuta, glabra

raro biflori

~~erioppermus Convolvulus.~~

~~Habitat hede Hupai~~

~~Fruticifer, glaber. Solia petiolata, ^{trata} digitata: foliola subsplia, unguiculata
linearia, lateralia minora, glabra, integerrima, basi attenuata, subtus pallidiora,
obtusiuscula. Pedunculi axillares, folio longiores; dichotome divisi, rigidi.
Calycis foliola aequalia, oblonga, obtusa. Corolla tubulosa, superne parum am-
pliata. Capsula obovata, 9 lobo.~~

Guianensis Convolvulus foliis cordato-ovatis subtus tomentosis, pedunculis elongatis, floribus corymbosis subsuperstitis, calycibus ~~longis~~
Convolvulus Guianensis foliis oblongis, hirsutis, e viridi cineris
 floribus parvis in capitulum collectis Aubl. fl. Gu. pag
 136. Tab. 52.

E Cajenna misit de von Rohr.

Caulis volubilis, Ramis teretibus, purpurascens, villosis, striatis

Folia petiolata, bipollicaria et ultra, integerrima, arena, ^{non} mollissima
 vasa, supra ad lentem subullosa, subtus villo densi ^{mollissima} ~~formam~~
~~topo~~, mollissima.

Pili undique in planta sicca ferruginei.

Petiolus folio dimidio brevior.

Pedunculus axillaris, spithameus, teres, villosus, scaber, apice
 flexuosus. Pedicelli ^{submis} breves ^{utrinque} ramis affigati. Folium lanceolatum
 ad basin capituli. Bractea lineari, longitudine calycis.

Calycis foliola lineari-lanceolata, pilosissima tomentosa, uti bractea

Corolla lobi acuminati

Stigmata duo reflexa.

Domingensis Convolvulus foliis cordatis obtusis, pedicellis racemosis ^{sub} trifloris.

Convolvulus domingensis; foliis cordatis; racemis numerosis, secundis; calycis acuto glabro La Marti illustr. p. 457

Habitat in Domingo herb. Fusconi

Caulis teres; glaber. Folia petiolata, bipollicaria, attenuata, mucronata, tenuissime venosa, integerrima, costa subtus basi inaequali-tomentosa. Racemi axillares; foliis longiores; glabri; pedunculi pariter distantes, bi s. triflori. Pedicelli filiformes, unguiculares, bracteati. Calycis foliola linear-oblonga, obtusa. Corolla pollicaris campanulata, glabra. Stigma capitatum bilobum.

Domingensis Convolvulus foliis cordatis obtusis, pedicellis racemosis trifloris.

glaber Convolvulus

Habitat herb. Guss.

Caulis volubili, teres, glaber, uti tota planta, lani. Folia petiolata, septenato-digitata
foliola petiolata, bi- & tripollicaria, lateralibus minoribus, integerrimis, utrinque ac-
uta, subtus obscure venosa. Peduncululi axillares, folio longiores; dichotome divisi,
nudi. Calycis foliata fere semipollicaria, oblensa, obtusa, membranacea.

nitidus Convolvulus foliis oblongis acutis supra villosis, subtus sericeis

Convolvulus nitidus; foliis ovalibus nitidis, subtus albo-sericeis;
pedunculis unifloris, petiolo brevioribus. La Mark illustr. p.
44 452.

Habitat in Philippinis herb. Fussia:

Rami teretes, incani. Solia petiolata, bipollicaria, remote nervosa,
asenia, integerrima. Petioli pollicares, incani. Pedun-
culi axillares, sex semipollicares, medio articulati. Calyx
foliola ovata, sericea, tria extensoria unguiculata. Corolla
sesquipollicari, extus villosa, sericea, intersectis radiis
quinque lanceolatis, glabris.

~~nitidus Convolvulus foliis oblongis acutis, subtus sericeis, supra~~

Convolvulus glaber Aubl.

Habitat Cayenna Les Ruth.

glaber, volubilis. Folia petiolata, quinato-dentata: foliola petiolata intermedium bipollicaria: lateralia minor, integerrima, obtusifolia cum mucrone, sulchi venosa. Rami axillares bis dichotomi, pediculis brevior. Calycis foliola oblonga, obtusa, membranacea. Corolla pollicaria glabra, campanulata.

japonicus Convolvulus foliis lanceolatis hastatis acutis, auriculis postice
unidentatis: foliolis calycinis obtusis

Nos et Hudsoni vulgo Siragawa Kompp. Am. Exot. glac. V. p. 856

Convolvulus japonicus; foliis hastatis lanceolatis: lobis lateralibus
unidentatis, pedunculis unifloris; caule volubili Thunb. fl. jap.
p. 85.

Habitat in Japonia herb. Royeni

Caulis filiformis, simplex, glaber. Folia petiolata, glabra: auricula

bivariata, oblique transversa, semipollicares, saepe bifida

Petioles folio triplo breviores. Pedunculi longitudine folii, filiformes.

† Calycis foliola oblonga glabra. Corolla magnitudinis C.
arsensii.

† abactenti

glaber ~~Convolvulus~~ foliis digitatis quinis glabris integerrimis, caule glabro pedunculis trifloris

~~Convolvulus pentaphyllus, flore magno glabro albo Aub. fl. Gu: Tom. p. 130. Tab.~~

~~53.~~

~~Habitat in Guiana~~

~~Caules plures. Folia digitata & foliola quinaria, inaequalia, lanicolata, acuta
glabra integerrima. Petiolus longus. Flores racemosi. Calycis foliola oblonga
acuta glabra. Corolla alba stigma est bilamellatum cuspidatum Aub. l. c.~~

volubili

non vidi

Cynosu Convolvulus foliis cordatis acutis omnibus glabris, folioli calycinis oblan-
gis obtusis vix duobus exterioribus majoribus.

Habitat in India orientali

Caulis volubilis, subfruticosus, superne lignosus, teres, ope lentis sub-
villosus. Folia remota, petiolata, palmata, ^{lamella uti adulescenti} utrinque glabra, veno-
sa, Petioli integerrima. Petioli folio breviores, subcanescentes ante.

Pedunculis axillaris, solitariis, petiolo brevioribus, medio bracteati bi bra-
teati: bractea decidua, superne parum crassior. Calycis foliola subio-
racea, unguiculata glabra, duo exteriora latera et longiora. Corollae
campanulatae, tripollicaris, glabra. Stigma capitatum,
bilobum.

Differt ab hypocrateriformi corollis campanulatis, a filifolio foliis non
rotundatis nec venellis indianis.

affinis filifolio

~~Convolvulus~~
Moximus

Convolvulus foliis cordatis subtrilobis attenuatis lobo ^{postico} divaricato po-
stice rotundato, pedunculis 5-quefloris calycibus globosis.

Habitat in India orientali.

Caulis herbaceus, volubilis, tenax, uti tota planta glaber. Folia petiolata
pollicaria, basi sive triangulari cordata: lobi laterales parvi ovati, #
obtusae cum acumine brevi. Pedunculi axillares, longitudine folii
5- flori: flores pedicellati, subumbellati

potia ut
geroimi

Subtilobatus Convolvulus ^{glaber} foliis cordatis subtilobis: lobis partibus duarum catis rotun-
datis, integerrimis, pedunculis ^{quin} ~~sub~~que floris, calycibus glabris.

Habitat in India Orientali.

Caulis herbaceus, volubilis, teres, uti tota planta glaber. Folia petio-
lata, pollicaria, basi sinu inferne utrinque dentata ovato
brevi subtiloba; lobus intermedius attenuatus, obtusus, mucronatus,
basi sinu triangulari cordata. Petioli foliis breviores. Pedun-
culi axillares, solitarii; apice pedicelli basi bracteis brevissimis sub
involucrati. Calycis foliola oblonga subsessilia. Corolla pollicaria

affinis plataniifolia

involueratus ~~Convolvulus~~ folus cordato-hastatis pubescentibus, pedunculis
subtrifloris, calycibus bracteatis. Wild. spec. pl. pag 845
Habitat in Guinea

W. A. C.

Strigosus. Convolvulus foliis subsagittato-lanceolato ^{pelosi} villosi, caule herbo ¹ repente, pedunculis multifloris

Habitat in India Orientali

Caules longi, filiformes, herbaei, teretes. Sola petiolata, remota, ses-
qui pollicaria, acutiuscula infera basi sinu brevi subsagittata, auriculis
rotundatis, superiora basi rotundata, utrinque tuberculis minutis adspersi-
quibus insidet pili longi adpressi pallide flavescens. Petioli herbi. Pe-
dunculi axillares, herbi, tripl. Longitudine foliorum triflori vel bifidi,
pedicellis lateralibus bi & trifloris unum solitario in divisa. Flores parvi.
Calycis foliola oblonga, obtusa, glabra.

retifolius Convolvulus foliis palmatis quinquelobis glabris dentatis, caule piloso, pedunculis
multifloris ~~mant. 203. f. Burm. f. Indrag. 45. tab. 10. f. 1. Mant. 203. * S. V. p. 202.~~

P. similis; Bryonia alba foliis villosis. Pluk. Alm. 115. t. 25. f. 3.

Habitat in India Orientali herb. Guss.

Caulis pilosus. Folia quinqueloba ad medium cum divisa; laciniis acuminatis dentatis
filiis ex albo pallida. Pedunculi longitudine petiolorum, pilosi bifidi, pedicelli
erecti multiflori racemi byssitis lanudo. Calycis villosi. Stigmata duo globosa
vermicosa. Burm. f. c. basi pauca magis alba

Caulis vero hispidius. Folia petiolata, tri-pollicaria vel minor, 5-queloba
lobi ovati ~~dentati basi truncati~~, venosa juniora hirta, aetate fere glabra. Petioli
ubi pedunculi ^{et calyx per} hispidi. Pedunculi triflori. Calycis foliola oblonga, unguicula
na, obtusa.

angularis Convolvulus foliis cordatis quinque lobis integerrimis villosis,
caule herbo.

Convolvulus angularis. caule volubili foliis cordatis quinquan-
gularibus tomentosis, pedunculis trifloris Burm. fl. Ind. p. 46
Tab 19. fig. 2.

Convolvulus angularis. foliis cordatis quinqueangularibus
integerrimis villosis pedunculis multifloris Lin. Mant. 203

Habitat in India orientali.

pili pauc flave
center niti ca
Caulis herbaceus, ^{3-4 pollicaria} teres. ^{pollicaria} folia ramosa, inferiora petiolata,
suprema sessilia, juniora villosa, superiora conescentia
lobi ovati, attenuati. Pedunculi axillares, solitarii, ple-
rumque trip triflori, interdum bi uni flori, herb. Calycis
foliola linearia, semi pollicaria, obtusae pilivari herba.
Corolla calyce triplo longior, aurantii coloris.
Varietatem memorat Burmannus et 4 foliis glabris et terre

hirsuta Mussonda foliis calycinis

viti-folius Convolvulus foliis subcordatis lobatis glaberrimis lobatis, lobis den-
tatis. caule piloso.

Convolvulus simili Bayona albo foliis villosis. Pluch. alm. 119. t. 25

fig. 3.

Convolvulus viti-folius palmatis, quinque lobis glabri dentatis, caule
piloso, pedunculi multiflori Burm. fl. Ind. p. 45. t. 10. fig. 1. Lin
Mart. 203.

Habitat in India orientali.

Similis Con. angulari fere in omnibus, nisi quod folia adulescentia
minus villosa et lobis dentatis. Pedunculi plerumque triflori
et caulis etate fere glaber
Stigmata duo globosa Burm.

angularis Convolvulus foliis cordatis quinqueangularibus integerrimis villosis, pedunculis
multifloris. Mant. 203. Burm. f. v. p. 200

Convol. angularis caule volubili, foliis cordatis quinqueangularibus tomentosis,
pedunculis trifloris Burm. f. ind. p. 46. tab. 19. fig. 2. *

Caules lignosi. Folia subsessilia cordata quinqueangularia, angulis obtusioribus,
integerrima, pilis ex rubro splendensibus sparsa. Pedunculi longitudine foliorum
triflori aliquando uniflori. Calyx pilosus. Corolla calyce longior, au-
ranti coloris Burm. f. c.

varietatem et Java memorat Burm. f. c. major foliis glabris, petiolatis, cordatis capsulisque duplo
magis
foliis subsessilia non vid.

aquaticus Convolvulus subvillosus, foliis linearibus obsolete cordatis, pedunculi
unifloris foliis brevioribus, caule prostrato

Convolvulus aquaticus; foliis oblongis pubescentibus alternis, pedun-
culi axillaribus unifloris, caule prostrato Walp. fl. Carol. p. 94.

Habitat in Carolina Bose.

Caules elongati, prostrati, filiformes, villosi subiniani. Folia petio-
lata, vix pollicaria, inferius ^{ima} minus oblonga, superius linearia,
basi obscure subcordata, obtusa mucronata, supra avenia, subtus
nervosa, pedunculi axillares, solitarii, uniflori, foliis longior-
patentissimi, apice bibracteati. Bractea brevis, setacea. Calycis
foliola oblonga, acuta. Corolla magnitudine C. pentapetaloidis,
radius quinque villosis. Stylus bifidus.

~~nitida Convolvulus~~

~~Habitat herb. Guss.~~

~~Rami teretes, iniani. Folia petiolata, bipollicaria, oblonga, acuta, remote nervosa, ovata, integerrima, supra villosa, subtus sericeo nitida. Petioli pollicares, iniani. Pedunculi axillares, uniflori vix semipollicares, medio articulati. Calycis foliola ovata, sericea, & nã exteriora unguiculata. Corolla sesquipollicaris, extus villosa, sericea, interjectis planis radiis quinque lanceolatis glabris~~

latiflorus Convolvulus foliis cordatis glabris, axillis tomentosis, pedunculis
subtrifloris, corollis hypocrateriformibus maximis

Convolvulus amplissimus foliis cordatis, flore albo maximo
Plum. Catal. p. 1.

Convolvulus latiflorus foliis cordatis glabris, pedunculis subtrifloris,
corolla hypocrateriformi maxima La. Mart. Illustr. 459

Habitat in Domingo herb. Fuscaei.

Rami teretes. Solia petiolata, 4 pollicaria, acuta. ^{venosa.} axillis Scholarum
tomentosis, Pedunculi longitudine foliorum, axillis tomentosis.

Pedunculi axillares, petiolo crassiores; 2-3 flori interdum uni flori
Calycis foliola 3 exteriora lanceolata, attenuata, 2 interiora oblonga
obtusae. Corolla tubi cuspidatae perno anserinae; limbus radiceque
lanceolatis, jusco marginatis. Capsula magnitudine nucis?

Convolvulus latiflorus foliis cordatis glabris, pedunculis subtrifloris,
corolla hypocrateriformi maxima La. Mart. Illustr. p.

latiflorus Convolvulus

~~crinitus C. foliis cordatis subnatis, capitulis hirsutis pinnis longe
pedunculatis involucriatis Enc:~~

~~Habitat
Caulis herbaceus~~

pilosus, foliis cordato-ovatis, pedunculis per floribus capitatis involucriatis
involucri oblongis, pedunculatis foliis longioribus.

red. mult.

non vidi.

Oenotheroides Convolvulus foliis linear-lanceolatis canescentibus, pedunculis
subsolitariis unifloris bracteatis, calycibus lanceolatis, ~~caulis fruticoso~~

Convolvulus Oenotheroides fruticosus, erectus; foliis linearibus ca-
nescentibus, pedunculis axillaribus solitariis erectis unifloris
bracteatis, calycibus lanceolatis glabris Len. Suppl. p. 137.

Habitat in Cap. b. spei heb. Proveni 5

Caulis lignosi, teretes, erecti, superne canescentes. Folia digitalium ses-
qui. Primi juniores folioque Venella incana. Folia sesquipolli-
cana, acuta, laxa. Pedunculi solitarii, raro gemini, brevis, simi, an-
gulati. Bractea bina, alterna, subulata. Calycis foliola acuta,
marginem membranacea. Corolla infundibuli formis, bipollicaris,
flava.

Convolvulus

Habitat herb Ventenat

Caulis volubilis. Folia pollicaria

habes no 1

floridus Convolvulus foliis oblongo-lanceolatis basi attenuatis, subsimplicibus
ramis floriferis pedunculoque paniculatis H. New. 1. p. 214.

Convolvulus floridus; fruticosus prostratus canis, foliis lineari-lan-
ceolatis glabris, thymo terminali composito Lin. Suppl. p. 136

Habitat in Canariis ad oppidum St. Crucis

Caules lignosi, procumbentes. Rami erecti, stricti, canis. Folia brevis-
sime petiolata, digitalia, venosa, ope lentis vellis brevissimis adpressa
obtusae, basi emarginatae, mucronatae. Pedunculi ex axillis foliorum
superiorum, ramosi. Flores parvi. Calycis foliola ovata, acuta sericea.
Corolla dilute rubra, radiis quinque extus hirsutis.

prostrata ~~Convolvulus~~

Habitat

herb. Ruth.

~~Pedunculati rari biflori~~

~~Caulis filiformis, solubili villosus~~

habes eadem ac patens

Scoparius *Convolvulus* foliis linearibus ^{sessilibus} pilosis, caulis terribus, pedicellis trifloris, caule fruticoso, ramis virgatis.

Convolvulus scoparius, fruticosus, erectus, glaber, ramis virgatis, foliis sessilibus linearibus, racemo terminali, pedicellis subtrifloris
Lin. Suppl. p. 135.

Habitat in Cavanis ad oppidum St. Onis &

~~Scoparius~~ *Spartea* vulgaris. Caulis teres, glaber, erectus. Rami
simplicissimi, erecti, folia remota, gracilia, pollicaria et parum
ultra. Racemus terminalis: pedicelli solitarii, remoti, plerumque
triflori, rarius uniflori, bracteati: & lori intermedii sessilibus. Calycis
filicis, oblonga, acuta, subsessilis. Corolla albo, calycis radius quinque
hirsutis
Lignum album, durum, stolis radiantibus. An Lignum Rhodium
officinarium Lin. l. c.

Scoparius *Convolvulus* foliis linearibus pilosis, caulis terribus, pedicellis subtrifloris

patens. P. filiformis suberectus, foliis lanceatis mucronatis pedunculis patensiformis, foliis longioribus. Enigil.
Habitat in Carolina.

Caulis volubilis terribilis parum ramosis. Lentes villosus uti reliqua
pediculi brevissimi planta. folia ^{acutis, brevis sume mucronatis} subsessilia ^{obtusis}, ^{pubescentia} ^{interdum} ^{dente} ^{uno}
altero. Pedunculifolios longioribus vix apicem brevitate. Foliole
acuta glabra ^{calycis orata}. Corolla extus villosa

supra oculo armato pilis raris recumbentibus flavis et albis adspersa

pedunculiflori

martiniensis Convolvulus. foliis lanceolatis ² oblongis glabris, foliolo calycinis extra
nombro maximis, caule repente. subsolubili

Convolvulus martinicensis. caule repente, radice caetera foliis ellipticis
~~facq. pl. Am. p. 34. glabris. pedunculis unifloris, foliis superantibus~~
~~et aequ. fist. Stir. Am. p. 26. tab. 17.~~
Convolvulus martinicensis, foliis ellipticis, caule repente subsolu-
bili L.

Habitat in Martinica umbrosis, humidis.

Caules subsolubiles, repentes, glabri. Folia oblonga, ^{simpliciter venosa} meo ronata, bipol-
licaria vel parum ultra. Petiolis brevissimis. Pedunculis tripolli-
caris, unifloris, superne bibracteatis. Calycis lobula 3^a caetera non
maxima, serosa, laevissima, duo interiora multo minor, lanceo-
lata, acuta. Corolla alba

crinitus Convolvulus.

Habitat herb. frus.

Caulis volubilis, pilosus, et punctis clavatis scabriusculus. Folia pollicaria, cordato-ovata, utrinque pilis rufo-entibus adspersa. Pedunculi axillares, 3-4 pollicares. Flores in capitulis, corollae, et pilis fuscis ferrugineis hispido. Involucrum foliolis subpetiolatis, oblongis, unguiculatis vel minoribus. Calycis lacinae subulatae.

an eadem cum crinito vel hispido vel copulato nes.?

medium Convolvulus foliis lanceolatis basi dilatatis calycibusque sagittatis, pe-
dunculis foliis brevioribus, calycibus semisagittatis auriculis dentatis
Convolvulus medium foliis linearibus hastato-acuminatis: auriculis
dentatis, pedunculis unifloris, calycibus sagittatis, caule volubili. Len.
Spec: pl. p. 210.

Habitat in India Orientali in Madagascar Commerson Herb. Jussieu.
Totus glaber. Caulis ^{glaber} purpureo-eri; a lineis densis retibus a petiolo tetra-
gonus. Folia breviter petiolata, bipolliciana, mucronata, integerrima,
glabra, subvenosa: auricula ovata, attenuata. Pedunculi axillares
solitarii, foliis basi villosi, inferne bracteodius lanceolatos, supra
bracteis crassiores, angulati. Calycis foliola 3a exteriora, semi-
polliciana, aenosa, attenuata, mucronata, basi 2-3 dentata.
Corolla calycis parum longior

medium Convolvulus foliis linearibus lanceolatis sagittatis. Auriculis sagittatis
pedunculis foliis brevioribus, calycibus sagittatis

pilosello folios? Convolvulus

Habitat herb. Fus.

Caulis vero, pilosus, ramosus. Folia lanceolata, sessilia, pollicaria, utrinque acuta, integerrima. Pedunculi axillares, solitarii, elongati, quinquepollicares, medio foliolo
2. linearia, semiunguicularia, cum pedunculo 2 floru, Bracteae deni geminae par
vae et demum flores 2-3. alterni. Calyci foliola oblonga, acuta, semiungu
icularia

quinq; flosi Convolvulus glaber, foliis cordatis acutis, lobis rotundatis divarica
tis, pedunculis brevissimis quinq; flosi
Habitat in India Orientali.

Caulis herbaceus; teres. Cilia petiolata, remota, ^{integerrima} bipollicaria, obsole
te venosa. Petioli longitudine folii. Pedunculi brevissimi: pedi
celli tres; interme angulati, intermediis pollicari, ~~tres~~ uniflori
ebracteati; laterales biflori, duo semipollicaria, duo triplo brevio
res, singuli uniflori, basi bracteis duobus minutis. Calycis foveola
unguicularis, rigidiuscula, fusco-flavescentia, oblonga, duo
exteriora acuta, 3a interiora obtusissima mucronata. Corolla
pollicaris, glabra, subcompansulata; limbus quinq; fidus

Chenopodioides C. villosis, foliis ovatis, serrato sinuatis, floribus solita
nis subsessilibus La Marti Enc.

~~Habitat in fructu stultorum~~
~~Stem~~ ~~et~~ ~~radice~~ ~~albidus~~. Caulis tenuis solubilis & teris. Folia
inqualiter serrata ^{inverso} dentata pollicaria. Petioli folio dimidio
brevioris. Pedunculis brevissimis bracteatis. Siliola calycis ova
ta ^{attenuato} ^{acuta} corolla angustotubulosa. Semina ~~trigonica~~

inter unguis

na red:

alici folius Convolvulus hirsutus, folius omnibus profunde laciniatis
subpalmatis; pedunculo paucifloro folio longioribus La Mart.
Illustr. p. 461.

Habitat in Cap. b. spei

Stoloniferus ~~Convolvulus~~ ^{9ab} foliis quinquelobis, lobis oblongis integerrimis glabris
* ~~pedunculis ternis caulis procumbente, pedunculis ternis~~

Habitat in Orient. herb. Desfont.

Caules ~~procumbentes~~ herbacei, glabri. Stipulae longe petiolatae, semipollucariae
~~avenae~~ ^{crassa} ~~gruppae~~
Spido lobata: lobo intermedio longiore, oblongo, inferne attenuato, obtusissimo
pino: laterales breviores, subbilobis: lobi oblongi, glabra avanco, integerrimi
crassa. Petioli tripollucari. Flores ex axilla, breviter pedunculati, semipollucari
res, glabri, terni. ~~Receptaculo~~ ^{bracteae} ~~in~~ ⁱⁿ ~~flori~~. Calycis perianthia lanceolata
Pedunculi