

*Convolvulus*

ochraceus Convolvulus foliis cordato-subrotundatis subacuminatis, pedunculi folios  
brevioribus, calycibus ovatis, caule herbaceo subpubescente

Habitat in graminosis Guinea Thonning

Caulis filiformis, teres, hispidus vel glaber, saporis subpulso. Folia lobis

~~foliosa rotundis~~ Folia petiolata, lobis rotundatis, obscure mucronata, venis  
80-nervis, ut ciliata, subtus pallidiora, venis leviter pilosis ciliis,

coeternum glabra. Pedunculi solitarii, longitudine petioli, superne

bibracteati, apice incrassati, fructiferi magis incrassati, cernui.

Calycis foliola obtusa, obscure mucronata, ut pubescentia. Corolla

magnitudine C. arvensis ochracea, fundo purpurascens, campanulata.

Stigma capitatum bifidum. Capsula globosa, glabra,

biloculari, quod rivalvi; loculis muciperis. Semina glabra

Thonning t.

*Convolvulus folios cordatis*

Dentatus <sup>C. convolvulus</sup>  
C. foliis hastatis glabris auriculis dentatis pedunculis multifloris

Habitat in India orientali et herb. Siam.

Caulis volubilis teres glaber. Folia petiolata pollicis una laevia  
intermedia lanceolata acuta integerrima. Lateralis rotundata  
quinque dentatis dentibus inaequalibus. Petiolus foliiformis peduncul  
lus petiolo duplo crassior pedicelli tres laterales biflori longiore tenui  
ori

heptanthus Convolvulus foliis hastato-lobatis: lobis lateralibus oblongis, pedunculis brevissimis,  
Corollis <sup>parvis</sup> extrusis, capsulisque villosis.

Habitat in Cyprus Herb. Fusidi

Pauli volubilis, Veris, villosus, canescens. Folia petiolata, 1-2 pollicaria, hastata,  
lobo intermedio lanceolato vel ovato, acuto; laterales oblongi, rotundati, aequi  
subtus pallidiori, juniora margine et nervis villosa. Petiolus villosus, incanus,  
foliis parum brevior. Pedunculi axillares brevissimi, subseptemflori. Flores  
parvi. Calycis incanum, pilosi, uti bracteae, f. diola lanceolata. Capsula, ut d.  
nulla extus villosa.

*Suffruticosus* Convolvulus: caule erecto villosa, foliis angusto lanceolatis  
pedunculis unifloris foliis longioribus Desfont. fl. Atl. pag.  
175 tab. 40.

Habitat in Monte Atlas ad Fontaine  
Caules fruticosi

Desfont  
~~metiniquata~~

*obtusifolius Convolvulus*

Habita in Cisterciensibus Americis Septentr. Richard.

Caulis repens. Pediculi axillares, sesqui-pollicares, petiolo brevioris. Calycis  
foliola oblonga. Corolla sesqui-pollicaris

habes

*Dellenia* G. foliis cordatis integris lobisque floribus solitariis subsessilibus  
Caryop. 3.

Diel. Kalm. tab. 11. fig. 93

Habitat in Africa?

Totum a pilis brevibus albidis, canaliculatis

non vidi

*Sesifolius* <sup>lygatus</sup> <sup>subsessilibus</sup> *S. foliis lanceolatis basi dilatatis saepe auriculis denticula-  
tis, folioli calycinis ovatis*

Tala - neli Rheed. mal. 11. p. 113. V. 55.

*Convolvulus hastatus* foliis linearibus hastato - acuminatis  
auriculis denticatis, folioli calycinis simplicibus. La  
Mart. eneyt. 3. p. 542.

Habitat in Andra orientali

Caules glabri striati, purpurei. Folia sessili pollicum  
attenuata glabra denticulis auricularum subsessilibus  
Pedunculis supra medium breviteratis. Corolla  
albido flavescens.



*Hypocrateriformis*. L. foliis cordatis, corolla hypocrateriformi, limbo quin-  
quafido: laciniis emarginatis Enc.

Habitat in India orientali

Folia coriacea vix acuta pollicaria. Petioli angulati. ped uniu-  
li axillares solitarii vel gemini uniflori longitudine petio-  
li non superne incrassati in medio bracteis brevis linearibus lanice-  
ratis folia calycis brevis obtusa ovata. Corolla tubus  
bipollicari Ca mark

1 flor

non vidi

Hypocistisiformis Convolvulus

Habitat herb. Aust.

Caulis fruticosus, teres, flexuosus, inanis. Folia cordata subrotunda, supra glabra  
obscure remote nervosa, subtus niçana, pollicaria

habes certe

Convolvulus

Habitat in Cap. b. spec. herb. Raynii

Caulis volubilis? angulatus, villosus. Folia petiolata: inferiora cordata, oblonga  
erosa, villosa, <sup>pollucana</sup> semibracteata basi sine obtusitate. Lobis intus arcuatis; superiora  
quinq; fida: laciniis linear-lanceolatis, remote serratis, laterulibus minoribus  
superiorum integerrimis. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, folio opposito  
graciles, supra medium bracteato. Calycis galeola oblonga villosa acuta  
affinis ~~Althoorda~~ <sup>est</sup> ~~et forte eadem~~

althoordes her

specimen herb. sub nomine varietatis cap. Burm. Distincta  
planta ab althoorda

aggregatus *Q. folius palmatis 7 lobis pelosi, flombus aggregato Linn. fl.  
cochin. pug. 109*

Habitat in Cochinchina

Caulis perenni volubilis teretis lycopodium. Lobi ovati acutissimi  
si cetero rami. Flores magni albi. Pedunculis communis elonga-  
tibus. Flores septem. Cal. communis 12 phyllis campanulatis foliolis  
ovatis oblongis inaequalibus pelosis 10 floris. Perianthium foliolis  
lanceolatis. Corolla spica, laciniis pelosis. Capsula & locularis 2 preme-  
stigma capitata. Linn.

Secundus Convolvulus

Convolvulus secundus; foliis cordatis acuminatis integerrimis, pedunculis  
secundis longioribus, floribus umbellatis Fl. Peruv. 2. pag 10. Tab 117. fig

a.

Habitat in Peruvia collebus arenosis

Pubescent. Caulis <sup>20</sup>prostratus, herbaceus, teretes, diffusi, ramosi. Folia bre-  
viter petiolata, cordata, integerrima, acuminata, emarginataque, subtus  
albicansia. Pedunculi folio duplo longiores, erecti, secundi, teretes, api-  
ce incrassati, multiflori, subumbellati. Bractea subulata, persistens  
in pedicelli. Corolla cocculca Fl. Per. l. c.

quod ut secundum denominata fuit non perspicuo

Folia inferiora emarginata cum mucrona reliqua acuta solum mucrona  
nervo terminata. Ped. his vel 3 bifidi cum pedicello in duas sive laterales  
+ n. flori. calycis lobula oblonga acuta

Crenatifolius Convolvulus

Convolvulus crenatifolius; foliis sagittatis crenatis, pedunculis longis, floribus umbellatis. Fl. Per. 2. pag. 10. tab. 118. fig. a.

Habitat in Peruvia collebus. ☉

Pubescens. Caulis volubilis, teres, ramosus. Folia pedicelata, sagittata acuta, crenata, nonnulla a medio ad apicem integerrima. Pedunculi axillares longe <sup>pedicellis</sup> umbellati, <sup>basi tripliciter parvis</sup> ~~umbellatis~~ 5-11 flori; teretes, superne incrassati. Bractea subulata, parva in pedicellis. Corolla apice pilosa. Fl. Peruv. 1. c.

calycis foliola oblonga obtusa  
folia subtrepanda

prope umbellaturam

*Convolvulus*

*Convolvulus africanus* vulgaris facie flore minimo Kaji herb. 3. p. 375.

Habitat in Africa herb. Kuf.

Similis *C. farinoso* foliis brevioribus. Caulis volubili, villosi. Folia petiolata, cordata subflagittata, basi acuminata, acuta, reticulata, subrepanda: auricula subrecta supra glabra, subtus ovato armata villosa, obscure simpliciter venosa. Pedunculi axillares, foliis longiores, 2-3 flori, villosi. Bractea sub pedicelli. Flori parvi farinosi. Calycis foliola oblonga, lanosa, mucronata, glabra.

*Consolidula*

*Convolvulus urosaricus* scandens per amoniam folio subrotundo flore albo  
umbone nigro Herm. parad. bot. ad fin. Raji hist. 3. p. 374. no 54?  
an ib. 3. p. 375. no 53.

Habitat in America herb. Mus.

Caulis basi ramosus, volubilis, villosus. Folia petiolata, cordata, oblonga, pel-  
liciana, pinnam acuminata, integerrima; auricula denticata, utrinque  
villosula. Petioli sesqui polliciana. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori,  
unguiculares. Calycis foliola villosa, ovata, acuta. Corolla parva. Cap-  
sula pisa pinnam majores glabra.



*Linan-folium Convolvulus.*

Habitat in herb. 4usj.

Caulis teres, volubilis, glaber. Folia unguiculata, breviter petiolata, linearia, glabra, crassa, avenia, enervia, mucronata. Peduncululi axillares, solitarii, folio longioris, triflori. Flores parvi, glabri. Bractea minuta ad basin pedicellorum lateralium. Calycis foliola glaberrima, ovata, mucronata.

*Convolvulus repens* La Mark.

Habitat herb. Rus.

Caules repentes, folia petiolata, pollicaria, oblonga, retusa, pappiis vix sagittata, glabra  
venosa. Petioli 2-3 pollicares. Pedunculi axillares, petiolo parum breviores; medio  
bracteis minutis. Flores pollicares. Calycis foliola oblonga, obtusa, glabra.

Est Plumieri a eadem ac repens mea.

memoria P. folius canicollatis villosis Aubl fl. Gu  
Habitat in Guiana

non vid.

*Convolvulus*

Habitat in America boreali herb. Vent.

Caulis tener, villosulus, teretes, volubilis. Folia brevissime petiolata, usque  
pollicaria, cordata, oblonga, integerrima<sup>glabra</sup>, mucronata, pubescentia, arenaria.  
Umbella pedunculata, 6 flora. Pedunculi <sup>capillares</sup> folio longiore; ramorum uniflori,  
capillares. Corolla pilosa

rami bifidi 2 flori laterales 1 flori in medio in medio. Calycis foli-  
co oblonga acuta

an humistratus Walt.

no 2

scab.

an Tenellus ex Mart. minime vero concipit  
cum figura Planch.

tenellus C. folus oblongo ellipticis obtusis mucronatis subsessilibus, pedun-  
culis foliis longioribus subsessilibus Eric.

Pluch. 7-166 fig. 4

Habitat in Carolina

Caulis filiformis. Folia integerrima basi interdum sine pedun-  
culata. floes campanulati parvi.

Unlobus C. foliis cordatis, villosi lobis lobis ovatis acutis. Thunb.  
prodr. fl. cap. pag. 35  
Habitat in Cap. b. p. ei  
pedunculis unifloris caule volubili.

an *Ipomoea bicolor* Lamour.  
non vid.

*acetosella foliosa* C. leviter mucronata, foliis hastato trilobis: lobis  
lateralibus subrotundis - angulatis, pedunculis brevibus subbifloris  
Encycl.

Habitat in Insula Francia

Folia fere pectiniformia squamulicaria cum petiolo, petioli et pedun-  
culi frequentius mucronati. flores parvi campanulati calycis dimidi-  
majoris. foliolo calycis ovata obtusa

glaber pedunculi axillares, triflori, petiolo breviori. Flores parvi. Calycis folio-  
la oblonga, obtusa herb. Thourin

valentinus - Convolvulus

Habitat in regno Valentino herb. La Revellere le Paut  
Prostratus. Caulis pelosi, incani. Stipula petiolata, unguiculata, ovata. Lacinia  
supraglabra, subtus pelosa. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, villosi, uti  
calycis, superne foliis & linearibus. Calyx lanceolatus. Corolla conv. tan  
fabrii cui affinis



Convolvulus

Convolvulus ramosus indanus folio pulifello Bauhin. p. 294.

Habitat herb. musci

Caulis erectus, paniculatus, canescens. Solaes p. p. l. polliciana vel minor, lanceolata,  
obtusis, villosa, arenia. Pedunculi laterales, solitarii, uniflori, unguiculares.

Calycis foliola oblonga, brevis, acuta. Corolla purpurea, conv. caetab.

10

Convolvulus

Convolvulus americanus sagittand folio, floribus concoloris carnis farma-  
ti Raji hist. 3. p. 374. no 50.


Habitat in America herb. mus.

Caulis volubilis, teres, glaber. Folia tripollicaria, cordato in rostro elonga-  
ta, acumine obtusissimo, emarginato, mucronato, glabra, venosa. Peduncul:  
axillares, folio brevior, quinque flori. Flores umbellati. Calyx <sup>totiflori</sup> bracteae ovatis  
acutae, lateralibus biflorae. Calyx glaber, pyramidatus, pentagonus, angu-  
li acuti: Bobola ovata, acuta, margine undulata. Petioli folio brevio-  
res

*Stipulacius consolida*

Habitat in b. Lus.

- Caulis volubilis, filiformis, glaber. Folia quinquepartita: lacinus incisus serratis glabris, pollicaria. Petioli longitudine fere folii. Stipula foliaceo, quinquepartita, utrinque uncta, incisus, ut unguiculares. Pedunculi axillares, uni flori, petiolo longiores, superne bractea duo foliolata. Calycis foliola ovata, acuta, margine undulato dentato, parva



*Convolvulus*

Habitat in inula Borbonica herb. mus.

Caulis herbaceus, volubilis, pubescens. Folia petiolata, cordato-sagittata, sesqui-pollicaria, obtuse remote serrata, acuta, supra glabra, subtus villosula, acuta mucronata, venis sine venosa, auricula dentato sinuata. Peduncululi axillares, solitarii, pedicellares, longitudine petioli, bi- & tri-flori. Calyx foliolis oblongis, acutis. & Coros parvi, unguiculares.

Convolvulus

Habitat ad nos Sibiriæ australi herb. Müpsi

Caulis volubilis, glaber, angulatus. Folia petiolata, pollicaria, hastato-lanceolata, obtusa, emarginata cum mucrone, glaberrima arena: auricula lanceolata, acuta. Pedunculi axillares, uniflori, supra medium bractea duarum minuta, opposita. Calyx glaber: foliola oblonga, obtusa, submembranacea.

Corolla convolvuli arvensis  
ar. Varietas Conv. arvensis

Convolvulus

Habitat in Puerto Rico herb. Kuzf.

Caulis teres, volubilis, glaber. Folia petiolata, 4-5 polliciana, cordato-lanceolata, obtusa emarginata, venosa: auricula oblonga, divaricata, apice rotundata, glabra. Petioli congesta adina folii. Pedunculi longitudine petioli, rigidi, teretes. Pedicelli c. 5: umbellati, pollicares, involucriati: foliola involucrii semipolliciana, ovata in apicem acuminata. Calycis foliola ovata, austa semipollicari. Corolla 7-8 pollicari.  
an Convolv. ruber Enem.

*Lupinus Convolvulus*

Habitat hort. Parf. herb. De font.

Villofus. Caulis volubilis. Folia petiolata, sesqui pollicaria, cordata, obtusa mucronata, integerrima. Petiolus longitudine folii. Pedunculi axillares; foliariis, petiolo breviores 1-2 flori. Bractea superiorne 1-2, lineares. Calyx villosus feniceus, semipollicaris: foliola cordata, attenuata. Corolla purpurea, glabra, magnitudine fere *C. purpurei*



acuminatus Convolvulus folios hastatis lanceolatis

Habitat herb. fus.

Caulis pubescenter. Folia sesquipolliciana, mucronata, supra glabra, subtus vixulo  
armato <sup>pilo uno alterove</sup> <sup>angulo subrotato, attenuato, intermedio</sup> <sup>diffusa simpliciter venosa, sursum sensim minor, infra</sup>  
gemma. Peduncululi axillares, solitarii, folios duplo vel triplo longiores, uniflori,  
rarius biflori. Bractes duas setaceas in medio. Calycis foedera membranacea,  
obtusata  
varietas foliis angustioribus, auriculis lineariibus

*Convolvulus oleifolius* P. Lamour.

*Convolvulus argenteus angustifolius umbellatus*, partim erectus, partim supinus.  
Tournef. Cor.

Caulis ramosus, villosus: rami teretes, fricci. Folia sessilia, <sup>vel mucosa</sup> pollicana, linearia,  
senesca, arena subtus obscure nervosa. Pedunculi superne aggregati, breves. Caly  
ces hirsuti

an modo varietas *Pneoni*?

marginatus C. foliis cordatis acutis lobis rubro marginatis, ped  
erogel.

Rheed Mal. 11. v. 53.

Habitat in Malabarā nī  
flores 7 o. infundibuli formos. Calycis brevis acuti.

Eadem fide cum maximo

non vidi non vidi

Arenarius Convolvulus Symb. bot. p. 1. pag. 18.

Gaudet caule volubili ex observatione. In West Indiae ~~et~~ ~~proven~~  
in prima sectione generis collocandus. Stigma capitatum  
~~Stigma capitatum~~  
Habitat quoque in insula St. Crucis

umbellatus Convolvulus - L. Mark

Habitat herb. Guss.

Caulis solubilis, teres, glaber. Sola petiolata, 3-4 pollicaria, cordata, oblonga, acuta, utraque  
glabra, subtus venosa, costa et nervis purpurascens. Petioli folio breviores, apice tomen  
tosi. Pedunculi axillares, longitudine petiolorum, superne villosi - Tomentosi canes  
centes: pedicelli pollicares, 6-vel plures. Calycis foliola glabra, oblonga, obtusa, mar  
gine membranacea

amen videtur diversa

*Viguiera* C. foliis cordato serratis acutis caule anguloso, pe-  
dunculis & rayis ~~multis~~ unifloris laxis. fl. dupl.

Habitat  
volubilis

non vidi

oleo foliis C. fruticosus pensilis, foliis linear-lanceolatis, floribus capitis  
10-umbellatis, terminalibus, calycibus lanceolatis Engelm.  
Habitat in Oriente. 5 ad A Desfont

o Ceras cum. Ceraso confunditur  
affari Ceraso

~~vide~~

argenteo

ammanii C. feneus, foliis linearibus <sup>longis</sup> lanceolatis, pedunculis acillatis  
longe bracteatis, calyce acuto Ereyd.

Habitat in Sibiria

Planta sericeo argentea caulis erigitur 4-6 pollicariis vltis herbis  
et erigit ramus. folia radicalia sequipollicariis caulina longiora.

Rad. C. arvensis parum raris - pedunculi acillati filiformes  
superius medium bracteati folia calycis ovata. Corolla campanulata

Compositus ramus erigitur argenteus minimus Am. vlt. p. 5: 26

ammanii



caelestis Convolvulus foliis cordatis acuminatisque pubescentibus: pedunculis elongatis  
umbellatis trifidis. Torr. prodr. pag. 14.

Habitat in insula Tanna.

Plantam sub hoc nomine C. caelestis a Fabricio accepi qui eam a Dorreriis habuit  
si versa foliis non acuminatis sed obtusis, pedunculis bipollicaribus tri-  
floris, floribus lateralibus sessilibus basi bracteis geminis lanceolatis subre-  
ctis calyce longioribus, intermediis pedicellatis ~~pro~~ aphyllis  
foliola calycina lanceolata acuminata subpelosa

Tiliifolia Grenia foliis cordato subrotundis subtus canis pedunculis axillaribus subquater

nis

Habitat in India Orientali

Rami pubescentes canescentia. Folia ex parte sequens Tilia supra glabra nervis  
et magnitudine  
quingue nervis; subtus incana

quadripartiti  
parviflori

foliis cordato oblongis mucronatis, pedunculis ramosis  
si multiflori brevibus quasi verticillatis Lencip.

Plum. Fr. tab. 94. fig. 2.

Habitat in Donaujo.

Caulis ramosus. Folia obtusiuscula, basi subcordata subtomentosa  
petioli breves. Pedunculi axillares copiosi foliis breviores. Flores  
campanulati parvi purpurascens, profunde 5fido. Capsula 4 loculari

a verticillato Lin. diffinguit <sup>autem</sup> a verticillatum nodiflorum nomen  
non vidi <sup>qua nostra pubescens dicitur</sup>

*pentaphyllus* C.

humifrutici P. foliis oblongo-oratis idemque emarginatis, pedunculis axillaribus  
trifidis, caule prostrato Vechi Walt. fl. Car. p. 94.  
Habitat in Carolina

Stylos bifida

non vidi

formosus. C. flui sagittati ~~per~~ caule prostrato, floribus involuero depresso Walp  
flor. carol. pag. 93.  
Habitat in Carolina

non vidi.

*Convolvulus*

*Convolvulus maritimus* repens angusto & oblongo folio Banc. H. 1132.

Habitat

herb. Desfont

Caulis plures, spithamari, subramosi, peduncululi axillares 1-2 flori

lineatus secundum Desfont

*Salvia foliosa*. C. foliis lanceolatis serratis, breviter petiolatis, breviter petiolatis;  
calyce angulato La Marti Enc: 3. p.

Habitat in Domingo

glaber Caulis volubili tereti folia utraque acuta 24 pollucina  
petoli breves. Pedunculi axillares solitarii folia breviores versus  
apicem tribracteati. Foliole calycina utraque acuta

Species omnino delenda, cum e 2<sup>bris</sup> plantis non modo generis et classe diversis con-  
flata pessimo errore la Martini. Flores in caule absque foliis pertinent ad Con-  
volv. rotundifolium, planta autem foliosa ad plantam toto celo diversam fide Martini  
Guspei

pedun 1 flori

~~non~~



ciliatus Convolvulus

Habitat herb. Lus.

Caulis volubilis, filiformis, teres, glaber. Folia semipollicaria, sagittata, canaliculata, obtusa, mucronata, integerrima; auricula ovata, acuta, integerrima, glabra venis de nervosa, arenis. Petioli longitudine fere folia. Pedunculi folio longiores, superne bractea duo, subulata, uniflori. Flores pollicares glabri. Calycis folio la membranacea, oblonga, mucronata, glabra, ciliata. Corolla purpurea, tubulosa.

4nomia

4nomia

grandiflorus Convolvulus

Convolvulus maximus amplissimo folio cordiformi, flore maximo Plum

Habitat in Aemena herb. Suran. apud Turf.

Caulis angulatus, glaber. Folio petiolato, 3-4 pollicaria, cordata, obtusa cum  
nervi vena, integerrima, simpliciter venosa, subtus villosula. Petiolus longitudi-  
ne foliorum. Pedunculus axillaris, pollicaris, uniflorus? Calycis foliola  
subrotunda, glabra. Corolla 3-4 pollicaris, Campanulata, tubo brevi

est frons volaceo