

Conyza.

Pomyza magellanica

cuneifolia Con. fruticosa glabra, folis cuneiformibus versus apicem den-
tatis, floribus axillaribus et terminalibus subcongestis ha-
Menth Enayil.

an Con Engevon Vincunatum Lin

Habita. in Brasilia et ad fretum magellanicum 5

Ramosissima. habitus Benth. halmifolia et folia utroque glabra
et minor, superne 5-7 dentata sessilia. Pappus ferrugineus, foliola
calycis margine subsinosa et subulcata.

Droica Conyza foliis ellipticis glabris integerrimis trinerviis, corymbis terminalibus
compositis diffusis.

Habitat in Montserrat in Nyas.

Calycis herbaceus, erectus, crassitie penna cyneo, angulatus, oculo armato
pulvere sulphureo quasi resino adspersus.

Folia petiolata, alterna, frequentia, palmaria, ^{pollicibus duos vel tres lata} acuminata, acuta, basi
attenuata, integerrima, utraque glabra, venosa, trinervia, nervi
apicem haud attingentes, supra punctis irregularibus cinereis immo-
ta, subtus parum pallidiora.

Petalis
Corymbis ad apicem, compositis, diffusis, multifloris. Receptaculi angu-
latis: particulis alternis. Folium lanceolatum ad basin singuli
corymbis partialis

Calyx peso duplo major, imbricatus, hemisphaericus: folioli oblongi,
acuti, villosi, scilicet

Flores quatuor quatuor examinari, foemineae

Stylus corollula dimidio longior

Pappus femineus calyce longior

(Habitus Conyza, flores ^{cullos} hermaphroditi non vidi, nec in specimine satis
certo observare potui nisi flosculi trifidi

elleptica *Coryza foliis elleptici* ^{arab.} integerrimis glabris spicis bifidis
secundis foliosis

Habitat in America meridionali v. Mexi.

Rami teretes villosi subtomentosi creant folia palmata
subtus obsolete venosa acuta. Spicis in apice ramulorum
flores purpurei.

Lespedeza Coryza foliis ellipticis lanceolatis integerrimis glabris acutis utraque acutis
spicis axillaribus secundis, floribus solitariis

Habitat in Montserrat in Bryan in insula St. Crucis ad West

Rami teretes, superne meani.

Folia petiolata, alterna, tripollicaria, elliptico lanceolata, basi apiceque
acuta, integerrima, utraque glabra nisi subtus in costa, venosa, plana, venis
fere nervosa, ut venosa

Petioles unguiculares, subsessiles.

Spica axillares, pedunculata, patentissima, longitudine foliorum. Flores soli-
tariis, distantes, basi folio parvo.

Calyx imbricatus, villosus; magnis squamis lanceolatis

Pappus cinereus, calyce longior

secunda *Coryza* foliis ellipticis utraque acuti ^{denticulatis} vellosi, spicis terminalibus
liberis lateralibus propteribus secundis

Habitat in America meridionali 1844.
Pauli ramis superne pubescentibus ramis & longis alternis
foliis breviter petiolata. Sesquipedalana. Callosifolia
subarenaria. Flores superius ~~etiam~~ ^{inter} foliis inferioribus remotis
vel basi folio lanceolato magnitudine pisi. Squama caly-
cis lanceolata margine membranacea

Congra

N^o 104. Montfermé

penicollis Conyza foliis linearibus strictis margine replicatis
subtus tomentosis, panicula fastigiata La Martk Encyclo-
ped. 2. 86

Elechrysum etc. Loba Mus: 1. p 30 Tab. 27. fig. 3

~~Conyza Canescens L.~~

Habitat.

Caulis simplex striatus. Folia digitalia, floris purpureis.

Pappus albus

Coryza

Habitat in St. Domingo herb. Desfont 5

Tridet ramis frequentibus, prostris. folia sessilia, frequentissima, unguiculata
truncata, tridentata apicis, obtusiuscula, glabra, rigidula. et ter terminalis,
sessilis, glaber.

Vix nova est. Aliud specimen foliis integerrimis oblongis ramis annulatis
glomeris axillaribus solitariis pedicellatis, pedunculis terminalibus triflo
ris

Squamulosa Conyza

Habitat ad Terram Leonam Herb-Thouinii

Caulis fruticosus? ramosus. Rami villosi, canescentes. Folia petiolata, 3-4 pollicaria, lato lanceolata, acuta, integerrima, avenia, subtus pallidiora, utraque glabra. Corymbi terminaliter, compositi, pectenter. Pedicelli adpressi squamis minutis linearibus. Calyx hemisphaericus, vix villosus: foliola ovata, acuta. prope odonitum collocanda

Conyza

Habitat Capna herb. Desfont.

Caulis herbaceus, erectus, teres, villosus, striatus. Folia breviter petiolata, superiora
sessilia, pollicaria, utrinque subpilosa, integerrima. Flores axillares remoti
solitarii vel terni. Calycis foliola subulata, villosa, apice flavescentia

Aquilata Conyza

Habitat in Penn herb. Fusca

Caulis herbaceus; teres, superne tomentosus; ramosus; rami oppositi. Folia petio-
lata, opposita, 2-3 pollicaria, ovata, acuta, basi subtransversa, dentata, supra
glabra, obscure venosa, subtus tomentosa, incana, subtriplicinerviâ, venosa.
Petioli vix pollicares. Stipula parva, ovata, subtota ^{ramorum} utrinque ad basin petio-
li, subtus tomentosa. Corymbi laterales et ter miniales, patentes. Calyx obova-
tus, imbricatus: foliola ovata, obtusa, subtomentosa. Corollula radii ligulata,
tubo oculo armato callophlo, longitudine calycis, dissi profunda squae fidi.
Stylus longus. Pappus oculo armato denticulatus

Conyza?

Habitat

Cavanellas Herb. Guss.

Caulis 6 pedalis, ramifera: rami tenues villosi - canescentes. Folia petiolata, opposita, ovata acuta, villosa, serrata, suprema sessile, integerrima. Pedunculati ex supremis axillis et apice, 1 in flori. Calyx hemisphaericus, latus: foliella lanceolata. Pappus albus

pinnifolia Conyza

Habitat

hebr. Gusf.

Facies Bauh. indica. Rami teretes, striati, alterni, villosuli. Folia petiolata, alterna, sempollicaria, velle oblongo-ovata, utraque acuta, venosa, glabra, costa subtus villosa, integerrima vel remote dentata. Corymbi decompositi, Calyx oblongus, imbricatus, villosus, flavescens: ~~filice~~ foliola ovata, acuta.

Congea?

Habitat in monte ^{Comneston} rideo herb. Guss.

Caulis herbacuus, adscendens, glaber, subteres, uti petioli, folia et peduncululi
nigro punctati. Folia in petiolum attenuata, pollicaria vel ultra, gla
bra, tenuissime trinerviâ, arenia, mucronato remote denticulata. Co
lymbi ex axillis supremis et apice, simplices. Calycis squama lineares, pro
mo resiccate brevior

Compressa Congra

Habitat in Pene Dombey herb. Aust.

Caulis erectus, ramosus, superne compressus, inferne: rami alterni. Folia
petiolata, alternis, lanceolata, inferne attenuata, villosa, cinerea, extor-
sum remote obsolete dentata, obtusifolia, submucronata. Corymbi et axilli
supremi, supra decompositi. Flores sessile in capitulo. Calycis subtuberculati
parvi, imbricati: foliola ovata, acuta, margine villosa. Corollae foemineae plu-
res tubulosae, stylo vix crassiores. Stylus bifidus longus: hermaphroditici solitarii
in centro, stylus indivisus.

Semulata Coryza

Habitat in Brasiliã herb. usf.

Rami teretes, glabri, striati. Folia petiolata, sparsa, bipollicaria, ^{remota,} ovata, attenuata, acuta, tenuissime venosa, subtriplicinervia, utraque glabra, tenuiter serrata. Petioli semipollicares. Corymbi decompositi. Eolum lanceare ad basin ramorum. Calyx glaber: foliola lanceolata, oculo armato superne margine tenui membranacea subdentata. Pappus purpureus

fricata Conyza

Habitat herb. Quos.

Caulis angulatus, alatus: a loco glabris altero latere altero tomentoso. Folia
sessilia, tripolliciana, lanceolata, acuta, serrata, supra tenuissime venosa,
subrugosa, subtus incana, remote nervosa. Spica terminalis, cylindrica, alba
nuda, crotchi digiti intermedii, lanata. Flores confertissimi

Spathulata

C. foliis ovatis subspathulatis petiolatis serratis
nerviis, floribus paniculatis
Habitat in India orientali

Caulis herbaceus superne alternatim ramifus-
pedalis et ultra superne paucis villosis. Sili-
caulinea ovata basi in petiolum e folio decurren-
te alatum acuminata ^{acuta} ~~caulinea~~ ^{caulinea} ca-
mea lanceolata. Conyza ^{est} apice in ramis
num subcomposita pediculi filiformes paden-
tis primi villosi ^{caulinea} flores parvi calycis
villosi folioli subulatis

Planta a Konigio saepe missa sub nomine
Conyza cinerea, in herbario Lin: aservatur
sub nomine Conyza Sennerii descriptione
vero Lin: minima cum ~~non~~ mea planta
quadant.
variat foliis paucis magis villosis.

amplexicaulis *Coryza foliis oblongis ovatis dentatis amplexicaulis* San-
dibus, pedunculis unifloris La Martk

an *Coryza minor* India orientalis Nelaque Malabarom
Plukenetii Raji Suppl. p. 152.

B. humilior caule superne ramosissimo foliis subinopis
minimo flae.

an *Erigeron obliquum* Lin.

Habitat in India orientali

6-8 pollicari glaber ramosus, folia inaequaliter
dentata

michi haud not

glandulosa *P. foliis ovatis* ^{subrhombicis} ^{scabris} ^{scabris} petiolatis crenatis, crenas glandulosa mucronatis, flombui terminalibus

Habitat in India orientali

Caulis herbaceus, erectus, superne ramosis striatus, ramulosis superne a punctis minutis scaber, ramosis.

folia petiolata, alterna, ovata obtusa, sesqui pollicaria utraque punctis minutis exasperata. subtus pilis raris pilis adpressis adspersa simpliciter venosa crenata crenis mucrone obtusa terminatis basi integerrima. Pedunculis versis ramorum axillares et terminales plerumque biflori

prolifera Con. ramis apice prolifera, foliis ovatis dentato-angulo
si in petiolum angustatis, corymbis confertis Ternatalibus

La Marti Encycl

an jonchus solubilis javanicus Rumph. Amb. 5. pag

299. tab. 104. fig. 1.

Habitat in Java

Caulis herbaceus s. abrupculus, corymbosis s. p. Ternata
tus. folia parva

Figura in Rumphio haud bene quadrat cum
differentia La Marti

videtur vel aliud esse quam varietas caneris.

Folia ovata, dentata, basi acuminate herb. L. Martii

ser. specimen herb. Mus. officini est sinense et vel exorsal Eng. obliqui varietas

Caulis villoso. Folia oblonga, basi attenuata, subtus villosa. Flores laterales
pedunculati, solitarii, superiores 2-3. Calyx villosus. Foliole lanceolata acuta
4a herb. Mus.

nomine

melastomoides Conyza ~~fruticosa~~ foliis oppositis ovatis dentatis trinerviis
supra nudis ~~nyctis~~ subtus tomentosis sericeis La Martk. Encyclop.

^{peru}
Habitat in Insula Bourbonis 5.
flores in Corymbo terminali

Chenopodii folii Conyza foliis ovato deltoidibus inaequaliter serratis
mollibus, racemulis caulem et ramulos terminantibus
La Marche Egypt.

Habitat in Insula Bourbonia

Tacit. Enger. Caulis herbaceus ramifus superne villosus

Folia petiolata adpressa glabra flores albi sessiles
17. folius latioribus ovato-subrotundis

non vid.

ferrulata pinnis foliis ovato-lanceolatis basi latioribus acute
serratis petiolatis glabris, corymbis ramosis. Ver. meridionalibus
La Martii Encycl. p.

Am. Nan. Patjia Rheiden Mat. 10. Tab. 62. var. vredo

Habitat in Brasilia

Caulis herbaceus teres ramosis glaber 2-3 pedalis. Folia
trinervia. Calyx glaber. pappus ferrugineus

michi ignota

Innervis. *Coryza* foliis ovato-lanceolatis integerrimis glabris
Innervis: caulibus alternis ramis suboppositis La Mart.
Encycl.

Habitat in Brasilia

Caulis herbaceus glaber ramosis. Tolia breviter petiolata
acuta. Calyx glaber imbricatus. Pappus purpureus
calycis longior

non vidi

amiflora

C. foliis subrotundis ^{perfoliatis} & serratis pubes incanis, pedun-
culis terminalibus foliosis.

Habitat

● Fortes

Planta digitalis, caules filiformes ^{sub}ramosi nani. Folia
frequentia, thymi magnitudine pubes nuda basi ovata men-
to terminata ovata, e nerva. Pedunculi longitu-
dine rami foliolis 3-4 remotis ovatis

Herb. X
Comps

excellentis Conyza foliis divariatis inaequaliter denticulatis petiolo
brevi, racemis axillaribus basi foliorum: Terminali paniculato
an Platin. 1407. 177. fig. 1. ? quae Conyza bifoliolata hinc est.
Habitat in Insula Francia

Similis Con-lacina, foliis glabris basi non lyratis.
Caulis pubescens striatus per squamulis. Folia pubescentia
brevia. Flores parvi. Calycis villosi purpurei.

michi non nota
~~Conyza bifoliolata~~

~~michi hinc nota~~ ~~Conyza bifoliolata~~

lanata

*P. folius lanceolatis integerrimis, sessilibus subtus
conymbisque terminalibus lanatis*
Habitat in Tafala Transi 103

supra rugosi

Rami teretes glabri nudi transverse rugosi crassitie
penne asperis. Folia ad apicem rotatum
confertissima in rosam expansa bipollicaria
basi semper angustata subtus ^{anti} ~~lanata~~ juniorum
basi supra et basi lanata. Peduncululi ex apice 3
^{umbellati}
4, folios breviores lanati 3 vel ⁴ 5 f. d. florum
3-5 sessilibus. Squama calycis oblonga hispida oblonga

an heliotropii folia la Marti

Salicifolia Coryza foliis lanceolato-linearibus integerrimis supra
glabris subtus pubescentibus subtus nervosis venosis

Coryza salicifolia foliis lanceolato-linearibus integerrimis
superne vix pubescentibus subtus tomentosis venosis
La Martinière Encycl.

β-foliis angustioribus

Habitat in Insula Bourbonis &

rami teretes, superne villosi. folia sparsa subpetiolata
utriusque attenuata profertim basi, & polluciana frequentia
subtus vix tenuibus transversis pubescentibus pediculi
ex axillis supremis et apice, flores in Corymbis compositis.

19-20 *Conifolia* ^{*Coryza*} ^{*perpetua*} ^{pedunculis} ^{calycibus unistomis}
foliis linearibus, corymbis terminalibus, caule fruticoso

14 *foliifolia* ^{*Coryza*}
Habitat in Insula Bourbonna-7

Corymbis compofiti

13. *Truxa* ramis ² ^{capa} ^{foliorum} ^{inferne} ^{scabris}, glabris superne versus apicem sen-
cis. ^{subtilia angustis} *Folia* ^{linearibus}, ^{approximata}, pubescentia, usque ad tripollicana subtus
subtilissima striata, supra folio exarata. Pedunculi ^{pericli} versus apicem fastigiati
basi uti etiam pedunculi ^{naturales} folio linearibus instructi. Flores sessiles in capi-
tulo hemisphaerico. Calyx ^{chlamydeis} imbricatus squamo ² ^{steroni} lanceolato virides
nerviisculi, interiores duplo longiores, glaberrime rubris pallide rubra inar-
nata longitudine flosculorum. ~~Estes~~ ~~folia~~ ~~perpetua~~ ~~linearibus~~, hermaphroditici
solitarii vel gemini in medio.

Coryza foliifolia

foliifolia

Coryza foliifolia 13

genitellodes
opuntivides

Coryza
Engelm frutescens ramis anicipitibus articulatis: articulis squama
hab. in Brasilia monte ^{castrorum} _{artemis} video

descriptio
ad sequentem
part. instituti
et differentia

Ramosissimus Ramis subdichotomi, ~~aut~~ glabri, articulatis
articulis linear lanceolatis anicipiti lateribus foliaceis super
ne parum ciliatis. Squama foliacea ^{marginis} oblonga ad basin
articulorum minuta & cuspidata. Ela ramulorum.

Flores in apice Ramorum plerumque tres sessiles

Cal. imbricata Squamula calycina oblonga margine membranacea

genitellodes *Coryza* ^{caulibus} caulibus prostratis aphyllis alatis subglabris, alis
articulatis interruptis Squamula brevi terminatis, floribus
sessilibus lateralibus alternis La Martk Encycl. pag.

Ramambaya Pifo 70

Habitat in Peru

Rami sparsi & in quatuor alati: ala alterna, interrupta glabra. Squamula mi
nuta loco foliorum. Flores laterales sessiles, solitarii. Calyx obrutus,
^{imbricatus} foliolo ovata acuta herb. 4. 21.

Flores radii omnino tubulosi: ideoque non Engelm potius *Coryza* vel
Eupatorium

Corolla radii tubulosi hermaphr: apparent ideoque accuratius examinanda

articulata Conyza ramifera internodiis alata, foliis oblongo- ellipticis
articulis brevioribus, floribus paniculatis La Martk. Encycl. pag

Habitat in Brasilia

fruticosa, ramuli apice glutinosi

vide in generis descr.

Lycopodioides Conyza folus subulatis imbricatis glabris flombus solitariis
terminalibus sesquialibus

Conyza lycopodioides fruticosa, folus subulatis imbricatis adpres-
sis, flombus solitariis terminalibus La Martk Ency
Habitat in Insula Bobonis 3

Rami caespitii fere pennis anferas. Ramuli aggregati
vestiti. latis fere 13. Eolia coriacea ramulos tegentem
triquet^r subulat^r pubtus utroque sulco. semunquicilari
Saiies proterea vel Brunis
Dedit Thour

byoides Conyza fruticosa prostrata, foliis linearibus confectis subtus rariis
ramulis flore sessili terminatis La Martk. Eni:

Habitat ad fretum magellanicum 3

^{humilis}
ramuli Arbutiula ramosa, ramis radiceantibus decumbentibus ramulor.
confectis subtus villatis apice rariis. ^{interiorum ostio?}
~~ramis~~ exilis. folia numerosa confertissima Calyx tubicylindricus

supra plane. Cus 6-8 floris. squamis linearibus oblongo tomentoso
subtus utrinque
que sili.

- of Corbus terminalibus sessilibus solitariis

Coryza retusa. Coryza foliis cuneiformibus apice dentatis parte
ficientibus corymbis axillaribus terminalibusque

Coryza retusa, foliis ovato-cuneiformibus retusis extimo mar-
gine crenatis pubescentibus, floribus globosis corymbosis ter-
minalibus axillaribusque La Martk. Encycl.

Habitat in insula Probona

bipedalis. Pani pubescentes, superne foliosi. Folia

Sparsa, ^{crassiuscula} in apice ramorum saepe approximata, basi
in petiolum attenuata bi-3 pollicaria extensa

fere pollicem lata ^{obtusissima} versus apicem et apice ipso
ferrate dentato-serrata supremam sub pedunculis corymbi

minora angustiora integerrima saepe linearia, ^{omnino} ~~la~~ ^{la} ~~scaria~~
obsoleta ⁵⁻⁸ ~~caerula~~ ^{nera} ~~velis~~ ^{velis} raris adpressis. Corymbi compositi pedun-
culis communis longitudine fere folii. Flores par-
vi squamæ oblongæ, marginæ piano

Coronopus Conyza foliis lineari lanceolatis obtuse serratis glabris sub
renatis

Conyza coronopus villosa, foliis lineari lanceolatis serratis serris
duri oblongis sursum versis, floribus globosis corymbosis termina-
libus la Marti. Enc.

Habitat in Insula Rodriguez

Rami teretes. Folia sparsa versus apices ramorum
approximata, petiolata, crispifolia, basi versus atte-
nuata integerrima dein ^{profunda} serrata serris obtuse
distantibus, anthera obsolete sub 4 nervis supra
secundum nervos lineata bipollucaria. Corymbi
terminales flores parvi

16 *arguta* *Coryza*
~~*arguta*~~ *Coryza* *affinis* *ofus* *foliis* *lineari* *lanceolatis* *glabris* *seratis*
paniculis *lateralibus*
hab. in *brasi.* *monte* *video*
Rami *tenues* *glabri* *vertes*
Folia *alterna* *sespita* *lineari* *lanceolata* *basi* *parum*
angustiora *glaberrima* *coria*, *serata* *seraturis* *acutis* *remo*
trifidulis, *pellucida*
legura *Drosera* *Panicula* *axillaris* *ramulorum* *Folio* *duplo* *Coryzæ*
~~*legura*~~ *unif.* *Pedunculi* *filiformes* *glaberrimis*, *squamis* *minutis* 3-4
in *Pedicellis*
foliorum *lanceolata*, *glabra*.
Corollula *radii* *tubulosi* *numerosi* *Stylo* *duplo* *breviore*
Pappus *albidus* *longitudine* *calycis*

an *Coryza* *madagascariensis* *de* *Monte*

14 ^{manifestum} ~~Cenore~~ Engyon suffruticosus foliis linearibus margine scabris floribus racemosis
linearis Conyza habitat in Bononia

Caulis suffruticosus, teres glaber ramosus

Folia lineana in Ramulis junioribus ^{teretia} congesta, lineana ^{lesse} ~~oblonga~~ acuta
lineata infero margine scabra inferiora lineata facie Euphorbia

Floris terminalis racemosi, bractea ad basin et alia in medio pediculi
li canaliculata

Palyx soleolis oblongis 12. glabris.

Stylus radii tubulosi, stylus corollula duplo longior

Pappus ferrugineus calyce longior misero proo visus glandulis pellu-

entis praeditus

an Conyza lineanifolia

Lineariifolia Com fruticosa glabra, foliis lineariibus integerrimis, versus
basin angustatis, racemulis brevibus terminalibus, foliis La Mart.
Encycl.

Habitat in Insula Bourbonia;

Arbustula ramifera. Folia versus apicem 1-2 linae dentata
pollicaria. Calyx glaber. Pappus ferrugineus

Spicata Conyza caule simpliciter, sessilibus, foliis decurrentibus
ovato-lanceolatis serrulatis subtus tomentosis, pappi termi-
nali densa integra ha Mark. Det. 2. pag. 93; Cav. W. 1.
pag. 8. tab. 42.
Habitat in Armenia calidior.

myrsinetes. *Coryza* foliis lanceolatis ^{sub} bidentatisque glabris
floribus terminalibus congestis pubescentibus

Coryza myrsinetes, fruticosa, foliis lanceolatis bidentatis, floribus
globosis minutis subcongestis terminalibus. La Mart. Encycl.

Habitat in Domingo;

Internodius ramorum sparsim subangulati. Folia
frequentia unguiculata, basi attenuata ac utrinque
avena nervosa interdum altero margine tantum
dente, interdum utroque sesquis apicem floris parvis
globosis.

Dichotoma Ch. 17 proliфера, dichotoma, glabra, foliis linearibus planis serratis
scabris sculis, pedunculis corymbosis squamosis hirs. her. Suppl.
p. 359. Jacq. coll. 1. pag. 44.

an Jacq. pl. rar. in. cent. 1. 47. v.

Arnicae: Con: foliis cuneiformi-linearibus obtusis crenato-dentatula
tis glabris Hort. Kew. 3. pag. 182.

Habitat in Teneriffa
anthera bifida

parvifolia Cynza foliis oblongis subtus plerumque integerrimis, corymbis
lateralibus terminalibusque

Habitat

Rami sparsi tomentosi. Sola plura et tuberculo
• unguiculata basi attenuata crassiuscula
avenia. Pedunculi superne iniani parviflori
triflori

rupestris

Congra

rupestris foliis pinnatis sub dentatis caulibus fruticosis
tomentosis, pedunculis elongatis unifloris. L. S. V. p. 752. Mart. 013

Congra tomentosa foliis hastato lanceolatis, amplexicaulis, dentatis,
vis, confertis, subtus tomentosis const. Defor. pag 14 p. 017.

Maxime affinis C. stabili, folia vero versus basi minus attenuata
ad infundibulum dilatata. Pedunculi breviores, coarctati, squama
una ad vel altera lanceolata, non vero ~~stabilita~~ setacea. Folio-
la calycina externa ovata, apice fusca, intermedia linearia, obtu-
sa, dorso linea fusca, in saxatile autem foliola omnia lanceo-
lata, acuta. Rami densissime tomentosi utriusque, etate ~~glabris~~
^{pias sequentes} ~~glabris~~. Culta differt a spontanea foliis duplo latioribus
^{in foliis} ~~plantis~~ margine non revolutis; longitudine ~~pedunculorum~~ in
spontanea tantummodo ~~pollitiorum~~.

Congra tomentosa, foliis foliis crenatis Shaw ex.

176 tab 176

Habitat in Arabia et Barbana

Folius linearibus lanceolato subtriangulatis
subtus incanis pedunculis elongatis unifloris squamis
ovatis obtusis

Saxatilis Conyza foliis linearibus subdentatis, pedunculis longissimis unifloris
caule suffruticoso Lin. S. V. pag

Helichryso Sylvestri, flore oblongo seminis Bauh. pinx. 123. tab
123. Prut. 65

Helichrysum capitulis singulis brevibus Monf. hist. 3. p. 87
f. 7. tab. 10. fig. 16.

Habitat in Italiis Graecia Carinthia, Valeria Palostina &
Caules inani tomentosi striatissimi. Folia in petiolum
attenuata vix pollicaria superiora angustiora linearia
integerrima: inferiora lanceolata denticulata omnia
subtus inani, acuta. Pedunculi terminalis filiformis
interdum gemini medio et superne squamula minuta
notati

subtus tomentosi
foliis ————— inferioribus denticulatis superantibus
integerrimis, calycum pedunculis longis seminis unifloris
calycum squamis linearibus lanceolatis

^{sericea}
sericea Christ albo sericea, foliis lineantibus canaliculatis, ramulis apice pa-
niculatis in Suppl. pag 360.

sericea Conza. foliis lineantibus filiformibus caulibusque tomentoso-seri-
ceis, floribus paniculatis. Hort. Kew. 3 pag 103.
Habitat in Canariis

Sordida Conyza foliis linearibus integerrimis, pedunculis longis trifloris, ^{sub}caule suffruticoso
L. Mant. 466. L.V. pag. 752.

Stoechas citrina altera Lob. u.

Ageratum aliud quondam. Dalech. hist. 770.

Echinopsium sylvestre angustifolium, capituli conglobati B. Pin. 264.

Stoechas citrina affinis, capituli parvi raris Balch. h. 3. pag. 156.

Stoechas citrina spuria, longioribus foliis Barrel. u. 368.

Gnaphalium sordidum *fruticosum*, foliis linearibus, pedunculis subtrifloris,
calycinis squamis lanceolatis Hort. Clef. 401. Spec. pl. 1193.

Habitat in Gallia Narbonensi, Italia, Barbaria ad rupes, muros &

Tota Yonestaosa incana. Caules numerosi, erecti, teretes, simpliciter semiper
dales. Folia sessilia linearia ~~an~~ angusta margine revoluta, frequentia

~~in~~ integerrima, acuta, erecta bipollicaria, foliola plura congesta in axillis
Pedunculis ~~lateralibus~~ ^{superioribus} terminalibusque longis & locis longe pedunculati ~~ovati~~

Pedunculis ~~lateralibus~~ ^{superioribus} unis. bifloris floribus pedicellatis, terminales triflori
floribus sessilibus lateralibus horizontalibus. Squamae calycinis nitide
splendentes, ovatae medioque subfusca.