

Copy

axillaris
varia

^{infernibus} Con. foliis obovatis de-
^{fractis} inequaliter dentatis petiolatis nudis
sivulis, floribus axillaribus terminalibusque
Habitat in India orientali

profectum aprie

Caulis herbaceus, erectus, ^{fractis} villosus. Folia alterna

^{ovata basi attenuata, petiolata} ^{adulteriora utrinque}
^{dentibus aequo majoribus} ^{adspersis aliis minoribus}
^{venosa} ^{otulo} ^{armato} ^{illis raro} ^{rara} ^{adpresso}: superiora et
^{basi in} ^{integerrima} ^{max}
pedunculorum lanceolata basi acuta integerrima exteri-

um dentibus utrinque 2-4. majoribus ^{ramosis} nullis minoribus,
vel integerrima villosa. Petioli villosi. Pedunculi
axillares solitarii biflori diphyllyi terminaliter
plures Calycis folioli subulati

Longa axillaris, foliis obovatis inequaliter denticulatis
petiolatis, racemis axillaribus basi folioli, terminaliter
paniculato La Martre Encycl

Calyx purpureus. Folia superiora oblonga ^{petiolatis} herb. 4us/

herb. ceste

negosa Con-strictior, foliis cuneiformibus serratis villosis rugosis
trilobatis, Pedunculis villosis unifloris, floribus radiatis
Hort. Kew. 3. p. 104.
Habita in Insula St. Helena 5

non vidi

obtusifolia Conyza L. Mack

Habitat in Pam herb. Guss.

Rami glabri, crassitie fere penno ^{subimbricata,} cymae, ciliolati: ramuli subrecti vel ^{fric-} illati, stri-
ti, glabri. Folia sessilia, frequentia, unguiculata, subobovata, subcoracea, venis
me venosa, et serrulata, basi versus integerrima. Pappus Veroni nalis sub
sessilis. Flores hemisphaerici. Calycis foliola oblonga, obtusa, glabra. Pappus fusco
purpurascens

Scandens C.

Habitat in St. Domingo & Leb Desp.

Rami teretes tomentosi, unicani, scandentes. Folia petiolatis, alternis, pollicariis, ovata vel oblonga, supra villosa, nitida subtus tomentosa, unicani, mucrona minuto terminata, denticulis minutis remotissimis. Corymbi axillares et terminalis, pedunculati, tomentosi, unicani heder.

Passiflora hispida

Coryza

Coryza novo Hollandia angusti rami maximi foliis Dampierii et. B. Feb. 4.
Fig. 3. Rapi her. 226.

Habitat in nova Hollandia herbi Desfont.

Caulis fruticosus, ^{herb}superna tomentosus, incanus, ramifusus. Rami fraxij, patentes,
incani. Folia semipollicana, linearia, margine revoluta, subtus subincana,
acutiuscula. Flores axillares, solitarii, sessiles. Calycis foliola oblonga,
obtusata, apice villosa. Pappus infersens.

solubilis Conyza

Habitat in St. Domingo herb. Ruth. Labeo.

amplexicaulis Conger

Habitat in Carolina Richard.

Caulis herbaceus, superne ramosus.

pycnostachya Conyza

Habitat in Cardena Richard.

Folia lanceolata, decurrentia, denticulata, supra glabra, avenia, subtus canino-
tomentosa. Spica terminalis, densa, pollice crispior, tripollitana, cylindrica.

habeo

Coryza

Habitat ad Senegal Herb Desfont.

Caulis fruticosus, ramosus, striatus, pubescens

habes

bananoides Conra

Habitat ad Senegal herb. Neuh.

Caulis fruticosus, ramifus: rami villosi. Folia amplectentia, villosa
serotina serrata. Corymbi dei compositi.

Pongra

Habitat ad Senegal herb. Ruth.

Folia oblonga, basi attenuata, bipollicaria. Caulis villosus, crassipes
pennis aspernis. Pongra lateralibus simplicibus

Heterophylla Conyza Lamour.

Habitat

Commun. herb. thuf.

Caulis teres, sulcatus, villis adpressis, scaber, superne in pedunculos floriferos divi-
sus. Folia petiolata, semipollucina, ovata, villosa; subtus canescentia, subarenaria,
inequaliter serrata; rudimenta ramulorum in axillis. Panicula terminalis, patens.
Calyx villosus, minor quam in *C. chinensi*: foliola lanceolata. Flores purpurei
si non fallor habeo

Dichotoma Conyza

Habitat in Canariis herb. Desfont

Caulis fruticosus, dichotome ramosus: Rami teretes, glabri. Folia sesquialtera, linear-lanceolata, integerrima. Corymbus terminalis, simplices. Pedunculi villosi viscosi: ^{bracteae} ~~foliola~~ calycis subulata, frequentisima. Calycis foliola linear-lanceolata, apice ciliata

Sagittalis Conyza la mork

Habitata in monte video. Commerçon herb. Guipoi.
Caulis ramifus, alatus, glaber. Folia bipollicaria, lanceolata, glabra, remote
denticulata, obscure simpliciter venosa, basi versus entezymma. Flores ter-
minales, aggregati in corymba confesto breviter pedunculati.

madagascariensis Comyza la mar¹²

Habitat in Madagascaria Comma. herb. frusp.

Rami angulati, glabri, alterni, fastigiati. Folia petiolata, tripollicaria, lan-
ceolata, utrinque acuta, glabra, venia, obtuse nervosa, extrorsum remote
seriata. Petiolus unguiculari. Cymbi decompositi, patentes. Bracteoli
neari ad ramificationes, inferiores ^{superiores} ~~sublonge~~ ^{oblonge} obtuse, fusciscentes, glabre
maxime membranaceo, subdilatato. Calyx hemisphaericus, parvus. Pappus
rufescens.

Deliotropis folia Conyza La Mart

Habitat

in insula Bourbonia Commer. Sub. Aus.

Tota viliis longis adpressis. Rami varices, insipide panno caprina. Folio sessile, 4-5 pol
linearia, semiamplexicaulis, extorsum remote subserrata, avenae, obscure nervosa
subcanescentia, supra scabiuscula. Peduncululi terminales. Corymbi compositi. Flo
res hemisphaerica, magnitudine Eng. aeri. Calycis foliola linearia, villosa, subaequalia.
Pappus reflexus

magellanica. Conyza foliis lanceiformibus glabris integerrimis subtidentatis,
floribus lateralibus solitariis sessilibus

Conyza magellanica, fruticosa glabra foliis minutis ovato-lancei-
formibus obsolete tridentatis, floribus lateralibus solitariis ramulorum
terminantibus. La Mart. Encycl.

Habitat ad fretum magellanicum.

Planta humilis ramis prostratis diffusis. Folia crassiuscula
utriusque planta glabra, numerosa, conferta, Thymi parum
majora. floris in apice ramulorum caespitibus.

Confer Chrysosoma cuneifolia Jacq. coll. 3. pag. 2070
tab. 22. fig. 3.

37 *Helianthifolia* *Erigeron* foliis ovatis ^{glabris integerrimis} acuminatis trinerviis, floribus corymbosis
Tricorne Gouss. Amer. merid. Torreyth.
Caulis herbaceus erectus vix glaber
Folia alterna, petiolata, ovata acuminata, glabra, punctis
venis lucidis ^{mutantia uti folia Helianthi, nolliciana} trinervia integerrima
Petiolus brevis
Corymbus ^{terminis} est axillis supremis, et terminalis pauciflorus
Calyx oblongus pyramis calycinis aridis, ovatis,
Pappus albus.
Coville radii nudi.

more inter *Conyza*

oleifolia Conyza folus lanceolatis integerrimis utraque fomen
topi, caulis simplicibus apice corymbose La Monk
Encycl

Conyza orientalis pumila incana oleo folio Tournef. Cor.

23

Habitat in Armenia

Caulis herbacius 7 8 pollicans tomentosus. Folia sparsa
vix pollicaria. Calyx oblongus squamis ovatis subglabris
pappus purpureus

~~non vidi~~

Coryza

Helicrypus fruticum foliis utrinque viridibus flore singulari Tournef.
Infl. v. h. pag 452.

Habitat in sicca herb. Nepi 3

Caulis fruticosus, ascendens, inferne ramosi, pedunculo elongato terminali,
glabri, uti tota planta. Folia frequentia, sessilia, pollicaria, linearia
remota denticula vel integerrima, acuta. Pedunculi squamula una
alterave adpressi, uniflori. Calyx foliula linear-lanceolata, acuta
si ubi
affinis fastati, an ejus varietas?

habeo

Compositae aegyptiaca fenicioni folio Vaillant

Baccharis aegyptiaca fenicioni folio Leppi

Habitat in Aegypto Libi Mus

Tacca Buphtalmi grasscolens. Folia inferiora subpinnata, superiora
obtus. dentato pinnata, terminalis oblonga, obtusa pinn

Coryza

Habitat in Cap. 6 spec. herb. Thunbergii
Caulis fruticulosus, ramosi: rami incani. Folia subpetiolata, frequentia, cuneata
vix pollucaria, supra glabra avenia, subtus tomentosa incana subnervosa apice
te dentibus 3-4 mucronatis. Corymbus terminalis. Calyx subovatus, imbricatus:
foliolo linear-oblonga obtusa, incana
an 13 antheris vel tantum antheris

amplexicaulibus

pauciflorum (folia lanceolata basi remotè denticulatis basi angustatis
pedunculis unifloris

Habitat in India orientali

superne pilis plurimis
longis
nervi

Caulis herbaceus, erectus, et raris villosus. Folia basi versus
nervum ^{semper} angustiora, apice acuta, base villosa, denticuli oblongi
denticuli obtusi, pedunculi primum ternales 1. vel 2. cum
ramo ulterius exiscente, monophylli uniflori pilosi
calycis foliola subulata pilosa

alopecuroides Con. foliis deciduentibus ovatis serrulatis subtus tomentosis,
spica terminali densa basi interrupta La Martk. Linc.

~~Habitat in Martinica & Brasilia 4~~

Coryza alopecuroides Helenii foliis caule alato Plum. Jacq.
w. tab 98. fig. 1.

Habitat in Martinica, Brasilia 4

Allo caulis altero latere tomentoso altero glabro, flores omnes
interdum distantes.

non vid.

Cupressiformis Conyza glabra, foliis ovatis quae reflexam imbricatam
floribus terminalibus solitariis

Conyza cupressiformis fruticosa, glabra, foliis minutis obovatis
carinatis quadrifariam imbricatis, floribus solitariis terminalibus.
La Martre Encycl.

Habitat ad fretum magellanicum 5

absque flore speciem Cupressi dices ramospina
runda tota glabra rami frangi ramuli appressorati toti
tenui foliis parvis crispis triquetris nitidis conicis
in tegimine. flores cylindrici facie Athanasia
flori. Calyx gl. squamis obtuso

Pongea arborescens Forst.

Habitat Herb. Musci

Rami teretes, glabri, ciliati, folia subulceata, sessilia, sesquipedalia
nervi, glabra, venosa, subnuda, obtuse dentata, basi versus integerrima
super lineata. Conymbi terminales, compositi. Flores parvi
diversa a Linnei

entoides Conyza Lamk

Habitat

hab. Tuzpai

Rami teretes, inani: ramuli copiosissimi, pollicares, sparsi. Folia sessilia,
semiunguiculata, linearia, obtusiuscula, copiosissima, supra glabra, subtus
incana, margine reflexa. Flores ex apice ramulorum, sessiles, solitarii.
Calycis foliola lanceolata, tomentosa. Pappus purpureus

Thyoides Conyza foliis lanceolatis bifariis imbricatis bifariis ~~conduplicatis~~

Habitat in Pen 5. Schumacher

Vernis flore refert exacte Struthiolam. Totus textus foliis ramis ^{argatis} tomentosis ^{subcongestis}. Folia
amplexicaulia, bifaria imbricata, lanceolata, conduplicata, lanaliculata
carinata extus glaberrima intus tomentosa, semunquiculata. Flores sessiles
parvi foliis parum longiores. Pappus subperispermus

Conyza Thyoides fruticosa foliis amplexicaulis ovato-acutis
carinatis compressis distiche imbricatis, flentibus solitariis sessi-
libus lateralibus. La Mart. Encycl.

bifoliata Compositae foliis ovalibus dentatis, pedunculis diphyllyis,
bracteis oppositis

Eupatoria Compositae, integro Jacobo folio molli America
no Pluk. n. alm. 140. Tab. 177. fig. 1.

Habitat in India

Caulis villosus, fruticulus. Folia polliciana, inaequaliter denti-
culato-serrata villosula. Pedunculi capillares villosi
axillares 1-2 flori foliis brevioribus medium diphylly
terminales corymbosi. Glabra corymbis villosa pterica

thyoides Comra

Habitat in Pene herb. Tusf.

Rami teretes, tementi pi, incani: ramuli frequentes, alterni, bifarii. Folia embri-
cata, serrata, bifaria, obtusa, caninata, estus glabra, nitida, supra incana, margi-
ne deorsum alba. Flores axillares, solitarii, alterni, sespiter

Cupressiforme Conyza

Habitat

herb. fus. 5

Rami teretes, glabri: ramuli frequentissimi, sparsi, quadrifloram imbricati.
Folia vasa, parva, ovata, obtusa, glabra, serrata. Flores terminales ramorum,
solitarii, oblongi, glabri. Calycis foliicula ovata, obtusa.
Tota planta glutine viscosa mucante fœt