



Commes.

Rami squami subumbriati, subulati a basi foliorum proeffente, apice
quater no proliferi. Conyctis simpliciter herb Desfon

Conyza marilandica Rich.

an Engeron camphoratum Wedd Rich.

candida *Conyza* foliis ovatis tomentosis, floribus terminalibus confertis, lateralibus foli-
turiis

aster tomentosus luteus, verba sic folio Boerh. sic. 60 Tab. 31. fig. 2.

Conyza cretica glutinosa, foliis molli candidissimo tomentoso Tournef. Corol. 33.

Taribosa cretica incana, integro limonii folio Barrel. icon. 217.

Conyza foliis ovatis tomentosis, floribus confertis, pedunculis lateralibus terminali-
busque L. Sp. pl. pag. 1208. L. V. p. 752.

Habitat in Creta

Tota planta tomentosa incana papposo. Folia caulis semipedalis tenuis subsimplex.
Folia radicalia petiolata ovata sequi pollicaria integerrima. Caulis paucis
minoribus oblonga. Pedunculi laterales subsessile integrati laterales ^{et} uniflori soli-
tariis foliis breviores foliola duo subsessile ~~et~~ longitudine florum ad basin calycis
Flores terminales plures conferti. Calyx tomentosus foliolis imbricatis lineariibus
obtusis.

anast radiata radio brevi recurso len.

candida Ca- folis ovatis tomentosis, floribus confertis, pedunculis late
vulgaribus Vermenalebusque. Len. S. V.

Aster tomentosus Luteus, verbasii folio Boer. pi: 60 Tab 31

fig. 2.

Coryza cretica fruticosa, folis molli candidissimo tomentoso

Tournes. Cor. 33.

Jacobaea cretica iniana, integro Lemonii folio Bar. ii.
tab 217.

Habitat in Creta

huic
vicia

venosa

^{petiolata}
Integerrima Planta tota tomento densa hirta. Folia radicalia
plura, longe petiolata ovata obtusa bipolliciana
caulina remota oblonga. Pedunculi axillares et longi-
tudine folii uniflori folia duo parva ad basin calycis
squame calycinis ovata

hirsuta *Corypha* foliis ovalibus integerrimis scabra subtus hirsuta

Lin. Spec. pl. pag. 1209 *

Habitat in China

Rami tomentosi hirsuti. Folia petiolata ^{basia angustiora} bi-
trifolia. Folia subtus dense villosa pubescentia supra
a punctis piliferis, oculo armato videntur scabra

Corymbi terminales pauciflori pedicelli ut supra
mo lanceolatis calycis villosi tomentoso

latis
lanceolatis

purpurascens. Compositus foliis ovato-lanceolatis serratis subtomentosis, caule sub
herbaceo, inferne simpliciter superne corymboso, floribus ovatis Lw
^{Prod. pag. 112}
Coryza major odorata Sloan her. 1. pag. 250 Vat

152 fig. 1.

Coryza / Brown jam. 318.

Habitat in Jamaica ☉

Caulis erectus floratus, leviter tomentosus. Folia petiolata

diffantia bipollicaria subovata leviter tomentosi

Peduncululi superne axillares et terminalis. Corymbi
compositi calycis leviter tomentosi foliolis ovatis subtrilobatis

afteroides
~~Javanica~~

Coryza foliis lato lanceolatis subserratis, corollis radiatis, calycibus saepe arrostis
L. Sp. pl. 1206. S. V. 752.

Affor mantandicus, pharmaciae capitulis, flore albo, baillandis montpelienfi
in folio et effigie Pluk. mant. 29.

Habitat in america septentrionali 4.

Habitus affinis *Corymbis* subfastigiatus. Flores ^{radiati} procedenti radiati

non vid.

Anthelmintica Conyza foliis ovata² lanceolata¹ inequaliter serratis scabris floribus
paniculatis festigatis

Cata Sibiriangam Rheid. Mal. 2. p. 39. t. 24.

Conyza indica, Vinya aurea folio, magno flore purpureo sicente Vaillant act.
358.

Rabiopa conyzoides, foliis latis dentatis, femine amaro lumbicos eiecante
Burm. Zeyl. 210. t. 95

Baccharioides Flor. Zeyl. 410 +

Con. anthelmintica foliis lanceolato-ovatis scabris, pedunculis unifloris, caly-
cibus squarrosi L. Sp. pl. p. 1207. f. v. p. 753 * Retz. obs. pag. 1. pag. 20.

Habitat in India O

Caulis erectus ramosis villosis purpureo maculatus. Folia petiolata ovato
lanceolata inequaliter serrata in petiolum basi attenuata, vixosa
fiatruiscula. Panicula paniciflora ^{in apice ramorum} ~~in apice~~ ^{superne} ~~in apice~~ ^{caecras satis} ~~in apice~~ ^{foliis unice instructis}
Pedunculus solitarius caulem terminat. Calyxis squarrosi
exteriores linearibus viridibus flore longiore laevibus interio-
ribus longitudine flosculorum. Corollula omnes tubulosi her-
maphroditi Retz. l. v.

Pedunculus

Squamosa Conyza foliis lanceolatis acutis, caule ~~herbaceo~~ corymboso, calycibus
Squamosa H. B. K. 257# S. V.

Conyza Camer. Epit. 612.

Conyza major vulgaris Bauh. pin. 265.

Habitat in germania, Belgii, Anglia, Gallia Danis Suecia

♂
Caulis erectus crassitie pennis arboris (in cultu) purpurascens
villosus superne corymboso ramoso. ramis fasciculatis
Folia lato lanceolata obtusata denticulata, inferora
subpetiolata, venosa subtus pubescentia. ramorum florifero
nim angusta integerrima. Pedunculi et pedicelli tomen
tosi intarsi squama calycino exteriore ovata interiore
linearis apice colorata

~~Asteroides~~ ~~Polyspa~~
~~Sphaerogla~~ Polyspa

pubesca Conyza foliis oblongis subdentatis ^{sub} petiolatis, pedunculis lan-
tū pubifloris Lin. ~~man.~~ pag 113.

Sonchus volubilis Rumph. amb. s. p. 299. Tab. 103. fig. 2

Habitat in India

Herb. velle ^{vani} adspersi. Folia basi cuneata, subpetiolata, rari-
pulis adspersa perituni 3-4: utroque acutis dentatis non
scabro, utroque vندی. Pedunculi superne, axillares
lanati 2-3. 4 flori, calyce ante expansionem lanati

— utrinque

non vdi.

patula Con. foliis ellipticis serratis subtus villosis, calycibus subglo-
bosis: folioli lanceolato-subulatis, ramis patulis Hort. Kew 3.
pag. 174.

Serratula foliis oblongo ovatis obtuse dentatis, caule
ramoso patulo, calycibus subrotundis mollibus: Mill.
T. 165. Tab. 247.

Habitat in China O

Caulis striatus ramis patentibus. ^{remota} Folia inferiora petiolo
to ^{omnino} glabra superiora ^{sub} fusca integerrima supra glabra
subtus canescentia pedunculi ^{2 gemi} superne in ramis 2 flori
unicui reliquis parum longior. flos albus biflorus
villosi canescentes. quamvis calycis lanceolata villosi
margine membranacea

valde affinis videtur Con. pubesca

Chinensis *Coryza* foliis lanceolato-ovatis reflexis serratis subtus tomentosis, floribus termi-
natis congestis. L. Sp. pl. p. 1209. S.V. pag. 753

Habitat in China

raro plures quam tres flores simul congesti Lin.

~~Caulis ^{perpetuus} fistulosus altera ^{perpetua} ~~et~~ ^{et} ~~in~~ ⁱⁿ ~~apice~~~~

non vidi

non vidi

bifrons Conyza

foliis ovato oblongis amplexicaulibus Linn. S. V.

Eupatoria Conzordei maxima canadensis, foliis caulem am-
plexicaulibus Plukn. alm. 141. V. 07. fig. 4.

Habitat in Canada

non vidi

Scabra Conyza foliis oblongis subdentatis sessilibus scabra pedunculis
unifloris elongatis Lin. Mant. pag 113. ✓

Habitat in India

Folia utrinque scabra, dentibus utrinque 4. f. 5. Pedunculi articu-
latis, versus apicem ramorum, uniflori. Demum folia biplo-
conyzae hinc

nunc ignota

Cinerea Conyza foliis ^{oblongis} ~~ovatis~~, apando ~~fractis~~, floribus paniculatis, corollis cylindricis
calycis duplo longioribus ~~hinc~~ L. V.

Eupatorium angustifolio ber mudense, floribus glabrescentibus.

Senecio india, foliis ternis crenatis Burm. Zeyl. VII. tab
96. fig. 1.

Oler serophenum Rumph. amb. G. V. 14. fig. 1.

Habitat in India orientali.

Specimen herbarii Dubium

auntia *Coryza* foliis dentato sinuatis, auriculis sub-decurrentibus Lin. Suppl. p. 367.
S. V. pag. 753.

Habit in India orientalis sub humidis.

Folia radicalia reliquis majora, rigidiora, glaberrima obovata, venis rubris, grosse
ferrata, inter serraturas undata. Folia caulina oblonga, sublancoolata, mollia
villosa, apice ferrata, medio sinuata, basi subpinnata, margine omni serrato
dentata, subdecurrentia: pinnis duabus sive tribus foliaceis patulis, subdentatis
utrinque parum infra folia. Caulis erectus rigens, pedalis ~~nubecundus~~ inferne
nubecundus hirsutus simus, superne candidus pilosus ramosis: ramis erectis, simplicibus.
Flores vesperis apicem caulis, pedunculati sparsi vario modo. Pedunculi
sepe uni flori capsulari una cum calyce hirsutissimi. Calyx ovatus foliatus
linearibus, apice patulis, exterioribus latioribus, interioribus in cylindrum con-
formatis. Flores albi; floretulis minutis: radiis linearibus minutis. Pistilla longiora
erecta. media inter Balichan et Coryram Lam. odor planta *Rachyos* foetida,
sed gravior Lin. Suppl. l. c.

24-25 Conyza foliis decurrentibus lanceolatis serrato-dentatis nudi, pedunculis unifloris,
caule fruticoso.

Conyza caule alato ~~Boiss. def. pag. Cat. pl. Arab. pag. 119. n. 495.~~

Caulis fruticosus, erectus, striatus glaber uti tota planta. Petioles et pedunculi
alati, dentato-sinuatis crispi.

Folia, decurrentia, remota, lato-lanceolata, serrato-dentata, sesqui-pollicia

Pedunculis ad apicem ramorum, ~~longis~~ ^{vel} 2 ~~vel~~ 3, semi-pollicares, uniflo-

sq. 2^o Calycis tubo lineari-lanceolato, longitudine radii

crispata Conyza foliis lanceo decurrentibus ^{lato} lanceolatis serratis glabris, pedunculis uni
floris, caule fruticoso.

Conyza caulis alato Borstl. Bot. pl: Arab. pag. 119. n. 495

~~Caulis induratus, erectus, glaber, ^{lato} alato, ~~caulis~~ ^{striatus, ramis} ~~caulis~~ ^{caulis} ~~caulis~~; alis dentato-pinnatis crispis
^{decurrentibus lato}
Folia ~~remota, lanceolata, serrato-denta, glabra, sesqui pollicaria~~~~

Pedunculi ad apicem pauci 2-4. ^{lanceolata} semipollicares, uni flori

Squamis calycinis linearibus glabris longitudine radii

24, 24 rugosa Coryza foliis decurrentibus ellipticis serratis ^{crenatis} subtus tomentosis, floribus axillaribus
pedunculatis capitatis

juvata Com. Habitat in Brasilia.

• Rami lignosi e foliis decurrentibus alatis; alio integerrimo altero latere
glabro, altero tomentoso uti rami.

Folia latolanceolata, ~~seriata~~ ^{crenata}, rugosa, supra glabra, ^{nuda} subtus tomentosa
se quipollitana.

Pedunculi ex alis supremis, longitudine foliorum, tomentosi.

Flores congesti in Capitulum.

(Folia in virgata ~~et decurrentibus lanceolata linearia sunt, differunt proterea in flo-~~
~~in floriferis quo in fructu elongata alapeiuroideam, Helenii folio,~~ ^{re pendentia}
maxime tamen affinis. Accedit ad Coryzam ~~alteram, foliis Helenii arguta~~
caule alato Plum. ⁱⁿⁱ Catal. pl. amer. p. 9. Icon. tab. 98. fig. 1.

Coryza juvata caule simpliciter ^{sub} fruticoso, foliis decurrentibus ovato
lanceolatis serratis subtus tomentosis spica terminali densa cili
ga la Martk Enc.

24. 25. rugosa ~~Quercus~~ foliis decurrentibus ellipticis serratis subtus tomentosis, floribus ^{glomeratis} ~~capitatis~~
pedunculatis.

virgata Con. foliis lanceolatis serrulatis decurrentibus, caulebus virga-
tis, floribus sparsi congestis Lin. S. V.

Ponyra altera, foliis helenii angustis, alato caule Plum. spec.
9. ii. 90. fig. 2.

Helichrysum caule alato, floribus spicati Roan. jam.
125. hist. 1. p. 206. tab. 152. fig. 5.

Gnaphalium virgatum Amon. Acad. 5. pag. 405.

Habitat in Jamaica, Carolina &

Caule erecto, ramoso e foliis decurrentibus. Vena
gono alatis in ano tomentosi ala altero latere
magis tomentosi. Folia bi-3 polliciana attenuata
ca tomentosa oblate supra nervis glabrata

Floris in spica terminali elongata per interval-
la glomerata Squamo calycino tomentoso lam-
irolato

decurrens Pongzo
Caryza decurrens

foliis decurrentibus lanceolatis serrulatis, floribus axillaribus ^{superioribus} sessilibus glomeratis superioribus sessilibus. P. V. pag. 753.
C. decurrens foliis decurrentibus lanceolatis serrulatis, caule subdichotomo, floribus axillaribus sessilibus glomeratis. L. Sp. pl. pag. 1206.
Habitat in India O.

Todius filaginis

Caulis ascendens versus radicem bifidus uti etiam in summitate singuli ex his in apice, tomentoso villosotomentosus et foliis decurrentibus alatus. Folia basifrequentia lanceolata, supra villosa viridia subtus tomentosa frieca, serrulata folia summa pollicaria. Flores ex omnibus axillis ad medio caulis usque ad apicem inferioribus ^{subglobosis raris} glomeratis in capitulis ⁶⁻⁷ parvis inferioribus brevis pedunculati superiores sessiles uti etiam in dichotomia superioribus capitulum in apice utriusque ramus sesquipedalis sessile in dichotomia

examinandum num cum consimilibus generis proprium constitueret delat
nuncia Richard

~~Adolfo Conza~~

caneſcens *Coryza* foliis linearibus, panicula ſubſtygiata L. Suppl. p. 367. S. V. p. 752.

Habitat in C. bono ſpei

Tota incana ^{inani vili, minutis adpreſis} vili, minutis adpreſis. Caulis ſubſimplicis, teretes ſtriati, ramis lateralebus
brevibus. Folia linearia digitata, margine revolutis reflexa ſutras tomentosa. Panicu-
la terminalis ſtygiata ~~Foliolis~~ ^{Foliolis} ~~minutis~~ ^{minutis} ~~adpreſis~~ ^{adpreſis} squamis minutis ad basin pedicellorum.
Calyx tomentose imbricatus foliolis linearibus, flore et pappodimidis brevioribus
Flores purpurei L. Suppl. l. c.

Coryza unifolia La Mart. huius forte ſpecies conferat
Laba mus.

Linifolia *Coryza* foliis linear lanceolatis integerrimis, corollis radiatis L. Sp. pl. pag. 1205 S.
V. pag. 752.

Aster americanus albus, merzei arabum et affinis foliis, florum petalis
reflexis Pluk. Alm 56. t. 79. fig. 2.

Habitat in America septentrionali

non vidi