

Coprosma

1. lucida & pedunculis compositis
2. foetidissima & floribus solitariis

Lucida C. pedunculis compositis Len. Suppl. pag 170. \* L. V. p. 274

Coprosma lucida Torr. n. gen. 69.

Habitat in nova Zelandia

Rami teretes glabri, in atriati. <sup>glabra integerrima</sup> Folia petiolata

~~rami~~ <sup>rami</sup> oppositi, <sup>obtus</sup> ~~obtus~~

manu ovalia acuminata. Stipula interfolia solitaria

utrinque attenuata. Pedunculi axillares folii

combinant folia, acuta. Pedunculi axillares folii

terii oppositi, diphylli, divisi sed unicolori terminati

floribus capitatis. Pappi longissima pumilis

Phyllidi

*Loetida Coprosma*

Habitat herb. Mus.

rami teretes, glabri, oppositi. Folia versus apicem ramulorum, conferta, unguicula  
lana, petiolata, oblonga, obtusa cum mucrone, basi acuta, glabra, arenia,  
suctui obsolete nervosa. Stipula membranacea breves.

*Caragana Poprosma*

Habitat herbarum Mus.

Rami teretes, flexuosi, glabri, apice compressi. Folia petiolata, b. j. tripollicaria, elliptico-lanceolata, pinnis acuminata, subcoriacea, obsolete venosa, utrinque glabra pallide viridia, margine subtus flavescente. Stipulae breviter acuminatae.

foetidissima & glomulis solitariis Lin. Suppl. p. 170

L. V. p. 274

Coprosma foetidissima Forst. nov. gen. 69.

Habitat in nova Zeelandia

non vidi