

Ponthonus?

1. oblongus C. capsulis fusi formibus membranaceo angulatis, foliis ovatis, serratis
superioribus inferioribus
2. rotundifolius C. capsulis tetragonis: foliis subrotundis aequaliter serratis
3. trilobulatus C. capsulis trilobulatis trivalvibus Inquetris: angulis paucis, foliis oblongis: serratis inferioribus scabris caule glabro
4. verticillatus capsulis linearibus membranaceo alatis tridentatis foliis ovato-attenuatis: serratis ^{capsalibus} inferioribus scabris, caule pubescente
5. tridens C. capsulis linearibus tridentatis scabris, foliis lanceolatis serratis inferioribus scabris
6. obtusus C. capsulis oblongis triangularibus trivalvibus perspicillatis serratis
superioribus, foliis cordatis: serratis inferioribus scabris
7. plicatus C. capsulis linearibus compressis bivalvibus, foliis lanceolatis ovatis
lanceolatis aequaliter serratis
8. ~~capitatus~~ ^{capitatus} C. capsulis primariis pilosis mucronatis, foliis oblongis glabris
obtusis serratis aequalibus

Scandens

flexuosus

10. capulani C. capsulis subrotundis depressis rugosis, foliorum serratis
inferius petalis

11. japonicus C. capsulis rotundis glabris, foliis de cordato ovatis acumi
natis duplicato serratis

13. hispidus capsulis subrotundis lanatis, foliis ovato oblongis sub
tus incano tomentosis crenatis

10. ~~10~~ hirtus C. capsulis testis subulatis cauleque pilosis, foliis oblongis
aequaliter serratis. (inter pleurostemon et angustif. colleriodos)

12. javanicus C. capsulis subrotundis hispidis, foliis ovato lanceola
tis aequaliter serratis.

Scandens

Gaires Corithonis capsulis teretibus laevibus; foliis lanceolatis glabris equaliter
ferratis

Habitat ad St. Martha Dom. v. Robt

Primi Tenues glabri laeves.

Folia petiolata, alterna, fere sesqui pollicaria, basi subovata, apice acuta
v. s. equaliter serrata, utrinque glabra subnervosa, a venis.

Petioles unguiculati, pubescentes. Stipulae setaceae.

Pedunculi laterales, suboppositi foliis, plerumque solitarii, interdum gemini,
petiolo breviores et crassiores, glabri.

Capsulae teretiusculi, glabri, laeves, bipollicares, acuminatae.

acutangulus Conhous

Habitat herb la Martini
Folia ovata, serrata infero lobata

Bivalvis Portensis

Habitat in India orientali? herb. Guss.

Caulis prostratus, inferne ramo uno alterove, villosus, teres, superne canescens.
Folia petiolata, semipollicaria vel parum ultra, oblonga vel lineari oblonga,
aequaliter serrata, serraturis obtusis infimis absque seta, subtus pallidiora, seta
caulis villosa, supra glabra. Stipulae setaeae - Pedunculi axillares, solitarii, uni-
flori, unguiculares, villosi. Siliqua semipollicares, teretes, compressae
bivalves, acuminatae, et loculares: juniores incanae.

10 japonicus C. capsulis rotundis glabris, foliis duplicato serratis Thunb. jap.
pag. 274 f. v. p. 501.

Habitat in Japonia

a) Textus vulgo Gamma Butki et Gamma Butki's Kompam.

ex. s. p. 844

flore pleno p. Gamma Butki alter Kompam. ex. pag. 845

Habitat in Japonia

Caules frutescens glaberrimi alterni, angulati, rugati.
Folia alterna plura saepe ex eadem gemma, subcordata
ovata valde acuminata infuso serrata, serraturis serratis
acutis pubescentibus, nervosa villosa inprimis nervis pubescentibus
hypoglaucis. Flores terminales foliis anis breviter pedunculati.
Stipulae subulato setosae.

ovatis attenuatis

12 hirtus & capsulis oblongis cauleque pilosis, foliis oblongis aequaliter serratis

L.P. Gacyn Hort. 3. 8. 50.

Conthomus, folio ulmi, major. Plum. spec. 7. 11. 103. fig. 2.

Habitat in Aenonia meridionali

Caulis pilosus vix ramosus. Folia sesquipedaliana profunde serrata
serraturis infimis absque feta. Petioli, uti fructus subulato hirti

Peduncululi axillares. Strobilo brevioris biflori vel uniflori pedi-
celli reflexi. Calyces hirti. Capsula vix subulato pilosa
bipediculari

Capsulis

vix subulatis pilo cauleque pilosis

10 herpilius C capsulis subrotundis lanatis, foliis ovatis obtusis tomentosis
equaliter serratis Lin. b. V Jacq. hort. 3. t. 57.

Quorumma fructus chamædryfolia, fructu lanuginoso major et minor
Plum. gen. 36. ii. 104.

Habitat in America meridionali 5

Caulis ramosus. rami teretes tomentosi. Folia petiolata, alba
ovato-oblonga, nerva supra lineata, vena mollis, subtus
Stipulae pubi nervosa venosa incana, serrata vel obtuse serrata, obtusa
lata bipolliciana ^{top. prope lat.} pedunculi axillares, folio brevior pedicelli
plures umbellati calycis uti pedunculi tomentosi. Capsula
mutantis peso majoris stis longi pilosi lanata

forma incano tomentosi ^{crenatis} ~~crenatis~~ foliis ovato-oblongis subtus

fasciculati
~~angusti folii~~

4-5

Conhorus ^{subsessilibus} capsulis oblongis, pilosis mucronatis ^{subgeminis} ~~capulis oblongis~~

foliis lanceolato-oblongis, glabris obtusis, serratis aequalibus
Euphrasia affinis Indiana, melisso turcica & foliis alternis,
capsulis pubescentibus trifariam junctis Plukh. amalt.

pag. 85. tab. 439. fig. 6.
Habitat in India Orientali

Rami teretes, glabri.

Folia petiolata, oblonga, angusta, utrinque glabra, pubescentia;
petiolis ^{per se unis inferioribus non petiolatis}
capulis utraque congeneribus.

bracteae geminae vel ternae, subsessilibus ad latus folii, vix unguiculatis, pilosis cineris, tri-valves.

Conhorus fasciculati. capsulis conoideis lanatis, fasciculatis subsessilibus,
foliis oblongo ellipticis petiolatis basi mucosis La Mart. Encycl.
Tom. 2. p. 1. pag. 109

170
177-170

17 javanicus C. capsulis subrotundis hispida, foliis ovato-lanceolatis aequaliter serratis
Burm. fl. Ind. pag. 123. Tab. 36. fig. 3.

Habitat in Java

Caulis herbaceus glaber. Folia petiolata glabra attenuata, serrata
canina. Stipula lanceolata, petiolo pubescente. Flores in supremis
axillis subverticillat. Calycis anfracti

6

affluans & capsulis oblongis triangularibus tri-valvis fere sulcatis fere cu-
frudatis, foliis cordatis serratis infemi setaceis Lin. Mant. 565 & h
p. 501. Jacq. hort. 1. 4. 05

Crotonis amer. carpinifolii sextuplex capsula longiore Plukh
t. 127. fig. 3

Triumfetta subvillosa, foliis rotundioribus undulatis atque denta-
tis, prostratis in setas inermes Brown. jam. 232. t. 25. fig. 1.

Habitat in America calidioribus
Rami tenues purpurascens, villosi. Stipulae petiolatae pollicia-
ri subtus scabriuscula, nervosa, serratura infima inter-
dum absque seta. Stipulae setaceae. Pedunculi axillares
solitarii breves. Capsula unguiculata, supiformis. C. angulata
angulis compressis. Styli 3 bifido. Capsula dentes tres. Dura
cataphora

— sub cordati

Plukh t. 127. fig. 3. an huc bene pertinet

7 Filiquosus. C. capsulis lineantibus compressis bivalvibus, foliis lanceolatis
aequaliter serratis. V. Peysson. Galien. hort. 3. v. 59. Spec. pl. pag. 2464

Corchoni folio ulmi minor Plum. spec. 17. v. 103. fig. 1.

Corchoni affinis chomodngos folio, flore flammulo, seminebus atris qua
Drangulis duplici sine Diospofiti Sloan hort. 1. p. 145. v. 94. fig. 1.

Habitat in America meridionali &.

Corchoni cortex Lea. Am. ac. 5. p. 390.

Caulis erectus, ^{paniculatus} basi glaber ramiflorus. Rami albertini. Folia
petiolata, alterna glabra attenuata, trinervi bipollicari
vel minoribus ^{subtus papilloso} ~~subtus papilloso~~ infimis absque pta. Stipula setacea
Pedunculi articulares triflori breves, floris pedicellati. Capsula
tripollicari. Flores vernalis apetalis tetrandri calycis tetra-
phylo; autumnalis pentapetalis polyandri, calycis pentaphylo.

Folius ovato lanceolatus

9 capsulari @ capsulis subrotundis depressis rugosis, foliorum serratis inferius
serratis his. ^{l. v. pag. 5014} ~~theod. fig. 214~~

Ganja sativa Rumph. amb. 5. p. 212. t. 70. fig. 1.

Alcea octoria f. *conchona americana*, prolongi foliis, capsula serra
ta subrotunda brevi Planch. alm. 10. t. 255. fig. 4

Habitat in India @

Pauli Yau glaber. Folium petiolato ovato lanicolato attenua
to in peltisana serrata serratis inferius in peltis duabus
elongatis, utraque glabra. Petiolo subulato in peltam atte
nuato pedunculi axillares sub triflori vel uniflori.
Capsula magnitudine fere cerasi longitudinaliter sulcata
municata

flexuosus C. foliis subcordatis ovatis punctatis ^{replicato serratis} cuspidatis, caule flexuoso
Habitat in Ait. Jor. den.
Habitat in Japonia

serratus P foliis oblongis serratis cuspideatis ramis glabris Thunb in
art. bot. ber. Lind
Habitat in Japonia

non indi

scandens C. foliis ovatis setaceo serratis oppositis, caule ramis que flexuo-
sis scandentibus Thunb in Act. Soc. Linc

Habitat in Japonia

non vid

5. Indens & capsulis linearibus dentifidulis scabri, foliorum serratis
inferius setaceis Mart. 566. & T. V. p. 501. Burm. int. 123. & 137. fig. 2.
Cochlos americanus, angusto barbato folio Pluken. phyt. 4. 127. fig.

^{4.}
Habitat in India

~~Burm. int. 123. & 137. fig. 2.~~

Caulis lani. v. r. Tripulo tripartito setaceo. Folia lineata
lanceolata, undato- serrata dentibus setaceis. Capsulis linearibus
stylis 3. bifidis truncatis etc.

Solus lanceolata

non vidi

3 Trilocularis & capsulis trilobulatis & trivalvibus. Triquetris: angulis bifidis
dissectis foliis oblongis: serratis infimis setaceis Len Mant. 77 et
566. + N. p. 501. Gouan. bot. 2. 8. 173.

Habitat in Arabia O

Caules ^{lores} erecti ramosae pedales folia ovata oblonga lanceolata
lineata, nuda, superiora basi infimo dense setaceo. Pedunculi
suboppositifolii bifidi, biflori. Calycis angulati. Siliqua striata
angulis lacinia exanti, apice simpliciter. Trivalvis Trilocularis

Conchone ostuans Gouan. de pr. pag. 107.

— folis ovatis

1. *Clitoria* C. capsulis oblongo ventricosi, foliis serratis inferius setaceis Mant
565 + s. v. pag. 501

Corchorus plinii Baub. pin. 317.

Corchorus Com. hort. 47. Y. 12

Habitat in Africa, America &

caulis erectus palmatis subsimplicibus. Folia petiolata ovata glabra
pollicaria vel ultra, nervis villosa. Stipulae setaceae. Capsula
superioribus vix pollicaria, fulvata antheris membranaceis obtusa
subperpetua dentata

interdum subrotunda

2. rotundifolia C. capfuli

foliis subrotundis aequaliter serratis

Habitat

○

Cauli exili inferne ramo usque alterove pubescenti; Sol. pithamoni.
Folia petiolata alterna remota subrotunda trinervi, utraque
glabra pollicaria vel ultra, subtus venosa. Petioli longitudine
foliorum. Hipula setacea. floret axillares subglobosi. Capsula
tetragona?.

an modo varietas olitorum

4 urticifolius: C. capsulis linearibus membranaceo alatis tridentatis, foliis ovatis
attenuatis glabris ^{aequalibus} serratis inferius ~~statis~~ caule pubescente

Habitat

Cauli superne pubescenti uti petioli. ^{attenuata} Folia 3 pollucaria fere
urtica urentis nervosa venosa utraque pili raris nervis ^{pluribus}

~ subter pallidiora ^{pedunculata ad latera petioli. Germina pedunculata capsula glabra}
venae pubescenti ^{membranis fere bifidis ad basin decurrentibus}
superne induratis 3 bifidis subulatis
Stipula fetacea