

Marcella Vand. forte hujus Cordia  
generis Michx.

- 1. myrica C. foliis ovatis oblongis ovatisve integris subtirenatisque glabris, paniculis lateralibus <sup>acutusculis lobis</sup>
- 2. polygama C. foliis ovatis attenuatis integris glabris, paniculis dichotomis <sup>lobis</sup>
- 3. spinescens C. foliis ovatis acutis serratis scabri, petiolis spinescentibus
- 4. schistena C. foliis oblongo ovatis repandis integrisque scabri vellosi
- 5. grandiflora C. foliis ovato-cordatis integerrimis glabris lobis, cymis

Dentata <sup>Dichotomis</sup>  
gera stantibus C. foliis lanceolatis lobis, panicula terminali, calycibus

<sup>Coelom striatis</sup>  
macrophylla C. foliis ovatis oblongis villosis sesquipedalibus integris super  
na serratis integrisque

longata C. foliis ellipticis integerrimis lobis <sup>glabris</sup> supra nitidis

patagonula C. foliis oblongo-lanceolatis utrinque glabris: superioribus serratis ramulis pilosis

micrantha C. foliis ellipticis lanceolatis integerrimis membranaceis venosis  
cymis dichotomis latis

nitida C. foliis lanceolato-ellipticis, integerrimis venosis membranaceis supra  
Chrysothyllea nitida, corollis filamentis basi laevibus  
elliptica C. foliis ellipticis acuminatis coriaceis integerrimis glabris, dupli-

acuminatis.

obovata C. foliis obovatis obtusissimis glabris integerrimis

callosica C. foliis cordato-oratis integerrimis, calycibus interne tomentosis

reticulata  
acuminata

C. foliis verticillato ternis obovatis acuminatis integerrimis

venoso-tetralatis glabris

retusa C. foliis aggregatis cuneiformibus retusis tridentatis

Q Pallorocum dicitur genere a Richardo sub nomine Palloroc  
ca. aubl. dicitur credit a Browni nudi <sup>ei</sup> tumen dicitur  
mucronatus Guio ~~alio~~ nives.

*C. macrophylla*, *reticulata*, *calophylla*, *Dentata* vid. *Eloy* 4.

opaca.

Cordia foliis ovalibus supra leviter subtus subtomentosis extrorsum  
obsolete crenatis.

Habitat in Guinea Frut.

Rami teretes, superne sordide cinerascetes, apice bifidi. Folii petiolatis, bi-  
p. In pollicaria, ovali subrotunda, supra vix venosa, exhibitione nigra,  
minime nitida, orculo armato adspersa pilis raris binis adpressis; subtus  
nervosa, simpliciter <sup>veno</sup> ~~nervosa~~, flavescens villosa subtomentosa, mucroni  
tenui terminata; petiole brevis inter singula crenata. Petioli unguicula  
res flavescens villosi. Pedunculus in divarico, pollicaris, dichotome  
ramosa. Calyx tubulosus, flavo tomentosus, dentibus setaceis. Stamina  
corolla longiora

acuminata  
reticulata

Cordia foliis oblongo-ovatis venoso reticulatis. Bubtus nitidi acumi-  
natis glabris, corymbis dichotomis

Habitat in Martinique Asert

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, alterna, tri-4 pollicaria, utrinque  
venis exstantibus, integerrima. Pedunculi erecti, ternales. Calyx  
tubulosus, leviter tomentosus, laxis. Corolla parva: laciniis limbi ob-  
longo. Stamina longitudine corollae.

*Corvix* Linn.

*Calli Deronanthium* monophyllum, tubulatum, centum, stratum, herossteph.

*DR* *Tubus* infansitiformis - vir calyce longior  
verus faucem dilatatus. *Similis* patet

*filamus*, irregularis, vir quinquefidus -

*SEM* *Intersecta* 5 long, tubine fauces corolla.  
*anthera* oblonge, imbricantes.

*PTM* *Forma* subrotundum. *Stilus* stamini-  
bus longior, dichotomus, laciniis itam nicho-  
tomis, stigmata obtusa. -

*SR* *Frangula* rupea, glabra, succulenta.

*Arbor* in suis magnitudinis: *Stamens* inermis,  
gravidus, ramis thictis, verius extrorsum laterem  
stricte, villosi, ciliati, divergentes, laxi -

*Solia* petiolata, alternis, ovata, vir contacta,  
acuta, nervosa, superne scabra, postice glabra,  
*petalis* sulcatis.

*Corumbus* terminalis, magnus, compressus

*filiculis* sparsis multifloris:

*Stems* majusculi, emodi, albi, occidui.

*Uter* haec, in paller, cura *Dei* *Rehri*  
ex munda *Luraphavica* haec in semine  
altata jam progrediunt in horto inula *Sto*  
*Crucis*. - *Sto* aut amos ad *attributionis*  
pauca *Sto* *Sto* present.

*Carmonia heterophylla* Caran.

Habitat herb La Revell. Le Paut 3

Basies Ebre<sup>buxi</sup> ~~cordifolia~~. Rami superne villosuli, tuberculati. Folia vix pollicaria, cuneata, petiolata, plura ex eodem tuberculo, arena, enervo, extrosum 3 vel 4 dentata, supra squamis albis mucrone terminatis subtus pilis raris. Pedunculi ex eodem tuberculo ac folia, folio brevior, filiformes, triploni. Calycis pilosi.



nodosus Callaenicus

*Cordia Callaenicus*

Habitat in Guana herb Richard

Truncus 6-12 pedalis. Caulis tenax, dichotome ramosus: ramis divaricatis sub  
dichotomis in clavam tumentes; in dens in nani, pelis aureis hirti, uti petio-  
li, costa subtus, pedunculi et calycis. Folia 3<sup>ra</sup> vel 4<sup>ta</sup>, breviter petiolata. In-  
fra sphaerica, tantisper depresso aut pomiformis, alba, pelis rigidis flavo-cantibus  
hispida. Pulpa succosa, subviscosa, saepe leviter saccharata affinito fibrillis  
ramosis adherens. Ovipitulum rugosum, transverse ovalis, pro parte quae firmi-  
pressio, 110 digitis quatuor manus aperta, 3 p<sup>o</sup> tuberculis in areola parte fund  
3 loculi qui ab obtentibus nucleis non grandefacti sunt. Nucleus ovalis et  
tanquam depresso, pellicula alba, <sup>opota</sup> shell coriolum maximum inversam  
retinet. Radicula maxima contra ad apicem nuclei. Cotyledones inversi  
Paniculu dichotoma Richard

Podia

*Ehretia microphylla* foliis cuneiformibus obtusis superne sicabris  
punctatis pedunculis brevibus axillaribus subuni flori La Moine

p. 425.

Dioica Cordia. foliis subrotundo-ovatis acuminatis subdentatis, glabris laxis  
paniculis dichotomis diffusis, floribus dioicis

Habitat in India Orientali &

Rami teretes, glabri. folia petiolata, alterna, 4 pollicaria, obscure ve-  
nosa, utraque laxis, extus remote obscure dentata. Panicula  
terminalis, pluries dichotome divisa: rami paniculae divisiati.

4 glabri Flores copiosissimi, brevissima pedicellati. Calyx campanulatus, glaber,  
laxis, vix semianguiculans, 5quefidus: lacinis rotundatis. Cor. 5que  
partita: lacinis cuneatis, apice reflexo. Filamento 5que, medio la-  
cunam inserta, basi villosa, corolla longiora. Stylis non vid.

medium Convolvulus

Habitat in Madagascaria Commes. herb. Turf.

Caulis glaber, purpureo cerni, 2 lineis decurrentibus a petiolo tetragonis. Folia bracte  
petiolata, bipollicana, lanceolata, mucronata, glabra, subrepens, basi dilatata, sagitta  
ta: auriculis oratis attenuatis, integerrima. Pedunculi axillares, solitarii folio  
breviores, uni flori, basi villosi, inferne bracteis duo lanceolata, supra bracteis uno  
fior, angustior. Calycis foliola 3 extenora, semisagittata, attenuata, repens, mucrona  
ta, semipollicana: auriculis 2-3 dentatis. Corolla calyce parum longior

*Cordia parviflora* foliis oblongis ovatisque scabris, serratis. Floribus cymosis parvis. A. N.

Deci: pag. 85.

Habitat in Nova Hispania &

rebus Cordia

mucronata la Nees

Tomentosa Cordia L. M.

Habitat herb. Guaf. 5

Rami teretes, flavo-tomentosi, opice aggregati. Folia bis tripollucaria, elliptica-lanceolata, alterna, supra obsolete nervosa, avenia, villosula, scabra, subtus venos-reticulata, subtomentosa, acuminata, acuta, plerumque versus apicem dente uno alterove remoto. Cyma terminalis, dichotome ramosi: rami divaricati. Flores ultimi sessiles. Calyx campanulatus, in anis

credo quod inter Rokni nup. adest

afriana Cordia

Sebesten Propter Alpin Egypt.

Habitat in Egypt herb. Aesf.

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, 3-4 pollicaria, ovata, cordata vel subrotunda, integerrima, subtus venosa, reticulata supra, supra levia, obscure nervosa. Panicula terminalis, dichotoma. Calyx persistens, subrepandus, glaber.



exaltata Cordia

Habitat hest la Martini

Rami glabri, scabri, fusci. Folia petiolata, oblonga, tri vel tripolliciana, obtusa  
cum mucrone brevissimo, integerrima, tenuissime venosa, scabriuscula. Cyme  
terminalis, bifida, patens. Calycis corpanculati quinque dentati.

*Splendens Cordia*

Habitat Cayana herb. Desfont.

Rami teretes, scabrisquili. Folia per parva approximata, spithamea et ultra  
ovata-oblonga, brevissime petiolata, acuminate, acuta, vix exerrima supra venia  
nitidissima, remote nervosa lineata, levissima, subtus scabriuscula, subcosta  
ta, venosa, scabriuscula. Pedunculi terminales, plures, pollicares, bis vel ter di  
chotomi. Flores sespiles, secundi, approximati. Calyx levis, parvus, subdentatus

Lincoln Solon

*buxifolia* Cordia

Habitat in St. Domingo herb. Desfont

Rami teretes, glabri, cortice cinereo, superne villosuli, laevi. Folia petiolata, alterna,  
peltata, cuneata, integerrima, supra scabra, subtus villosa. Corymbi terminales  
subdichotomi

*Heterophylla Cordia*

Habitat. Capana herb. Desfont.

Rami flavescenti villosi-tomentosi, dichotomi, superne tetragoni. Folia brevia petiolo  
4a, per paria remota, alterna, utriusque spatium ovato-oblongum attenuatum,  
interdum extus obsolete remota dentatum, alterum cordatum triplo minore, ac  
minutum, integerrimum, omnia utraque villosa, mollia, aures subtextia, supra obli-  
qua nervosa, subtus villosa, paleae transversim venosa, acuminata terminata.  
Pedunculi in dichotomia 2 apice. Cyma bina vel ter dichotoma, flavescens tomen-  
tosa. Calyx parvis, tubulatus, laxis. Germen tomentosum. Stylus dichotomus  
flos pedicellati

Cynoglossum orientale, angustifolium, flore minimo, filamentibus longis do-  
nato Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. mus.

*buxifolia* Codia

Habitat in Domingo Superioribus herb. 4 usq.

Caulis ramosissimus: Rami sparsi, glabri, apice villosi. Folia petiolata, alterna, vix semipolluciana, obovata, integerrima, supra glabra, punctis albidis scabra, arenia, enervia, subtus villosula, obscure venosa. Racemi ex apice ramulorum, simpliciter vel bifidi. Calyx tenuissimus & coracanthus, quinque-dentatus. Stylus bifidus.

nodosa Cordia

Habitat herb. Gu.

Rami teretes, fusci, pilis rarisimis adpressi. Folia petiolata, opposita, fruticosa et ultra, acumine fere pollicari terminata, acuta, elliptico ovata, venosa glabra, laevi.



*Cordia*

Habitat ad Senegal herb. Fus. 4

Rami teretes, glabri. Folio petiolata, alterna, sesqui polliciana, oblonga, utrinque obtusa, integerrima, glabra, sicabruifcula, arenia, subtus venis venosa. Panicula dichotoma. Calyx campanulatus, margine subsquelobis.

Calyx 1 phyllus, 4 dentatus. Cor. 4 petala, Stamina 400 duo longiora. Germen concium. Stylus brevis Stigmata 3.

alferis *Cordia officinalis*

ferrata Cordua?

Habitat in India orientali herb. Lusf. 5

Rami teretes, glabri, cortice fusco purpurascente. Folia petiolata, bipollicaria et ultra,  
alterna, ovato-oblonga, venis pinnatis venosis, utrinque glabra, supra ovato armata pilis raris  
pilis ad presens, subtus pallidiora, venis pinnatis ferratis, acuminata, glabra acuta.  
Petioli semipollicares. Racemi terminales subdichotomi, glabri, erecti. Peduncululi  
velloso. Stylus unicus. Hyma bifidum  
an Erechtu?

manuscript

*Subcordata* Cordia

Habitat in Ggle Prasin herb. Guss.

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, 3-5 pollicaria, subcordato rotundata, mucronata, apice saepe subretusa, venis ferme venosa, utrinque laevia, glabra, integerrima, subtus ad costam et nervos villosa. Petioli bipollicares. Pedunculi ad apices semipollicares, ter vel quater dichotome divisi, petiolo breviores. Calyx tubulosus laevis, glaber, dentatur. Corolla Cor. Sebestena.

ni fallor habeo.

Senegalensis Cordia

Habitat in Senegal herb. Guisf.

Rami teretes, glabri, purpura f. enter. Folia petiolata, alterna, tri-pollucaria, ovato-oblonga, glabra, venosa, basi, in petiolum, acuminata. Petioli sesqui-pollucari.

Panicula lateralis, dichotoma. Cal. 3 f. pedus. Cor. semiquadrifida. Stamina 4. germen 1. stylus 2. <sup>trifidus</sup> ~~trifidus~~ arbor 20 pedalis Guisf.

Dominicae Cordia

Habitat in St Domingo i. e. b. Gus.

Rami angulati, villosi, scabri. Folia petiolata, saepe spithamea, cordato-oblonga, acuta supra nervis venis finis, asenea, glabra, et punctis elevatis numerosissimis scabra vima, subtus venosa, villosa, pallidiora, scabra. Pedunculi terminales, villosi, scabri. Flores paniculati, erecti. Calyx semi pollicari, femineus, scaber, tubi lobus, qui quadrantatur.

obliqua Cordia foliis subrotundo cordatis nervoso venosis obliquis Wed.  
phyt. 1. p. 4 no 16 tab. 4 fig. 11.  
Habitat in India orientali 5.

michi cymat





monorica Cordia foliis subrotundo-ovatis dentatis venosis scabris; corym-  
bis axillaribus minoribus Wed. spec. pl. pag. 1072  
Cordia monorica Proxb. pl. Corom. 1. p. 43. Tab. 50  
Habitat in sylvis Indis

non vid.

Monouia Cordai foliis ovatis remote serratis paniculis axilla-  
ribus dichotomis

Cordia monouia Roxb. plant. Coromand. tab. 378

officinalis Cord. foliis ovatis acutiusculis superne inaequaliter serratis  
italyae subislandico leri La Mark T. leri: pag 420 tab. 96 f. 3.

Pommel. herb. 1. 8. 72

Habitat in India orientali

muchis hanc nota

afriana Cord. foliis subtundis - ovalebus integris, panicula 1es murali,  
calycibus tustratis; d. n. p. nucleo tinguetur La Mart. T. E. pag. 422.  
Habitat in Agypto.

*Cutera* Cord- foliis ovatis obtusis superne crenatis corymbis lateralibus  
terminalibusque, calycibus decem striatis. La Mart. T. En. 421  
Habitat in Pen. herb Thourin  
Quodam mysterio esse credit auctor et munime

*Passiflora lutea* Lamby.

Flor. luteo

namidi

Domingensis Cord. foliis ovatis integris apertis subtus albiviridibus panicula  
terminata, calycibus cylindricis La Mart. T. E. pag. 421  
Habitat in Domingo I.

non vid.

exaltata Cord. foliis ovatis basi acuti apeni corymbo terminali, flentibus  
quinquefidis La Meish V. Enc. pag. 422.

Habitat in Guiana &  
Arbor exalta.

non ind.

longata Cord. foliis ovatis venosis nitidis, paniculis lateralibus flammatis  
inferne villosis La Mark. T. C. pag. 422.

Habitat in Barbis ? 5

Corolla hypocrateriformi vel subcampanulata

est ne fallor mica nitida à la Doue habuit La Mark ex Insula St. Thomæ

~~non vidi~~



India Cord. foliis ovatis petiolatis nudis; floribus pauciculatis, tubo corollae  
nunc inclusis ha. Mart. T. E. pag 422.  
Habitat in India 5

non vidi

subcordata Cord. foliis subcordatis integris superne lobatis calycis cylindrico  
La Mart. F. En. p. 421.  
Habitat in rupibus Provenus 5.

*Pinexis* Cord. foliis oblongis obtusis ad axillas nervorum villosis, paniculis foliis  
brevioribus. La Mart. T. E. pag. 423.

Habitat in China &c.

foliis Cord. indivis folia angustiora

non vidi

cordata E. umbella ~~sp. da~~ dichotoma, involuclis cordatis serratis, foliis pinnatis  
lobis serratis ciliatis, capsula verrucosa Scopoli flor. Carn. pag. 431.

nodosa Cord. foliis subternis ovato-oblongis acuminatis: sa. multis. nodosis. hippi-  
dis, calycis barbato La Mart. T. Enc. pag 422.

Cordia collaris Aubl. fl. qu. p. tab. 16.

Habitat in Guayana

nodosa collaris La Martini

nervosa Cord. foliis alternis oppositisque ovato-oblongis acuminatis  
nerviis, corymbo brevi, bracteis subulatis La Mark. T. En. pag 422.  
Habitata Guana? &  
Folia magna nuda subter nervosa

~~non ali~~

eadem ac Chrysophylla Robini habeo certa

prædensi Bromus panicula erecta subperpetua, speculi oblongi novem  
flori, aristæ rectæ gluma brevioribus La Mart. T. Enc. pag. 193.  
Habitat in Europæ præti siccis

myxa C foliis ovatis supra glabris, corymbis lateralibus, calycibus decem

stratis

Prunus Sebestena, longiore folio maderaputana Plin. alm. 217. f. 3.

Sebestena ~~forestis~~ domestica Alp. Egypt. 30. Bauh. pin. 446

Sebestena domestica f. myxa Com. hort. 1. p. 139. t. 72.

15 Vidi maram Rheei. mal. 4. p. 77. t. 37

Sebestena Sylvestris alpini

Habitat in Aegypto Malabaria & ramuli purpurei laves

Rami teretes glabri cortice cinereo fere. Folia petiolata alternata  
ovata, vel oblonga obtusum vel acutum utraque glabra

integerrima vel subrenata venosa, membranacea bipollicaria

Quarta supra interdum adpressa puncta alba. Panicula ex

apice ramorum tandem lateralis dictotoma lassa. Calyx

campanulatus glaber in quot quot vidi laves absque striis glaber longitudini

tubi laciniis s. ovatis. tubi brevis laciniis corolla linearibus  
obtus

aliam misit nonnulli tubo angustior laciniis et staminibus sex

panicula elongata latiore

Datur hujus <sup>triplex</sup> duplex varietas an species diversa altera domestica  
foliis oblongis integerrimis, 2da foliis oblongis crenatis 3ta foliis  
ovatis dentatis uti varietas 15.



myxa Cordia <sup>Cordia</sup> foliis ovatis supra glabris, corymbis lateralibus, calycibus  
decem striatis Linn. S. Veg. pag 230  
Cornu sanguinea Torfi Desf. pag 33. no 10

*Polygama* C. foliis ovatis attenuatis integris, <sup>glabris</sup> paniculis dichotomis

Habitat in C. b. sp. Thunberg 5

rami cortice cinereo glabro. foliis bis. tripollicaria in acumine producta. Paniculis lateralibus & terminalibus calycibus 4

Cordia Sebestena, an hujus varietas

*Spinescens* Cordia foliis ovatis acutis serratis scabris, petiolis subsessilibus Lin  
Mant. Rob. \* L. V. 230.

Habitat in India

Rami fructi tomentosi ferruginei. Folia alterna, petiolata, ovata acuta, serrata, tomentosa, supra magis scabra, magnitudine fol. Cerasi. Petiolus brevissimus genua dedit et basi spine fit ut in Volucria, rigida f. lites et oblique extrosus truncata. Racemus axillaris foliorum simplicis f. bifidus; filiformis longitudine folii. Bractea parva, sepals nigri, magnitudine Prinos. Calyx campanulatus, obsolete quinque dentatus. Corolla campanulata, quinque dentata. Germen subrotundum Lin. Mant. l. c.

*Sebestena* ? foliis oblongo-ovatis repandis scabris Lin. Spec. pl. pag. 274. Galqu Am

*Cordia* nucis juglandis folio Plum. gen. 13. n. 105.

*Caryophyllus* spurius inodorus, folio subrotundo scabro, flore racemoso  
hexapetaloida coccineo Roan. hist. 2. p. 20. t. 64. Cat. Car. 2.  
p. 41. t. 91.

*Sebestena* scabra, flore miniatore insip. Will. Elth. 341. t. 255. fig. 331.

*Novella* nigra Rumph. amb. 2. p. 226. t. 75.

Habitat in India t.

Rami superne vellis canescentibus adpressi. Folia petiolata  
parva repanda vel <sup>grata</sup> integerrima, obtusa venis utraque  
vellosa supra punctis numerosis <sup>subtus minus scabra</sup> f. albis scabra, pal-  
mana et ultra. Petioli unguiculares glaberrimi. Nervi  
compositi primum terminales deinde laterales. Calyx tubulo-  
sus unguiculans sex dentatus dentibus Tubus corollae calycis  
binudis longior Corolla miniatore limbo semisextiduo  
stamina sex raris s. Calyx inflexus quam maxime  
distenditur inferne nucis acrietur

integerrime vellosi scabri

juglandifolia C folus oblongis scabris integerrimis Saeculis flm.

non ordi

Dichotoma C. foliis oblongo ovatis vix crenatis corymbis dichotomis Tosp.  
Frond. pag. 10

non vidi

classificati P. foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis, raris  
axillaribus Aubl. fl. Gu. 1. pag. 226. tab. 89  
Habitat in Guiana

non vid.

grandiflora C. foliis ovato cordatis integerrimis glabris lobatis; cymis  
dichotomis.

Habitat in India orientali Konij

Rami glabri. Folia petiolata palmata et ultra basi polli-  
ci quatuor lata <sup>triloba</sup> membranacea nervosa venosa, utraque  
loba. Calycis et Corollae Cord. sebiferis modo glabra



tetradon C. foliis ovatis <sup>supra</sup> glabris subtus apertis, floribus corymboseis tetradon  
Aubl. fl. gu. 1. pag. 222. tab. 87  
Habitat in Guana 5

non vid.

Toqueve C. foliis cordatis acuminatis subtus tomentosis, floribus panicula-  
tis. Publ. fl. Gu. pag. 220. tab 90.  
Habitat in Guana 5

non vid.

aperta. P. foliis ovatis acuminatis appressis, floribus cymosis racemosis. Fruct. glabris.  
pag. 10

non vidi

*Geraphanthus* <sup>ellipticus</sup> *foliis lanceolato-ovatis* <sup>ellipticus</sup> *scabris, panicula terminali, ca-*  
*lycibus decemstriatis* Lin. S.V. p. *Facqu. Amer. 43. t. 175.*

Fig. 16.

*Geraphanthus foliis ovato-oblongis utraque productis, racemis ter-*  
*minales* Brown. Jam. 170. Fig. fig. 3.

Habitat in Jamaica

apici nigricante tomentoso

Rami supri teretes albo punctati. folia petiolata alterna  
summa subopposita lato lanceolata, attenuata  
basi acuta, integerrima plana tenuissime venosa  
subtus pallidiora. Pedunculi terminali erecti tomen-  
tosi. Pedicelli alterni breves 6-7 flori. Calycis primum  
conico <sup>sub</sup> ~~sub~~ <sup>sub</sup> ~~sub~~ elongati demum tubulosi villosi subtornati  
si. Corolla laciniis oblongis, albidis  
ex observatione Dr. Rook generi distinctum est

*lanceolatis lobis racemis terminali com-*

posito

macrophylla Codia foliis ovatis villosis sesquipedalibus Linn. L. V. p. 230

Prunus racemosa, foliis oblongis hispitis maximis, fructu rubro Sloan.  
Hist. 2. p. 130. t. 22. fig. 1. Raii Dendr. 43.

Collocotenus platyphyllos major, racemis umbellatis Brown. Jam. 168.

Habitat in Jamaica. Linn.

Rami dichotomi teretes ferrugineo villosi subtomentosi. folia breviter reticulati  
pedalia ovato oblonga integerrima vel ex ~~trifloris~~ remote serrata  
venaturis macronatis, acuminata basi subrotundata, obula armata supra  
nili nuda adpressi scabridicula, oblique nervos, nervi flavo villosi sub  
venoso reticulata subrugosa, villosa: funicula aurco nitenti villosa.

Paniculi & dichotomiae dichotome ramiferae uti calyx villosus tormentis  
calyx campanulatus tubus corollae longitudine calycis corollae pondo

oblongis  
serratae, paniculis dichotomis

integerrimis superne

Longuta *P.* foliis ellipticis glabris <sup>lobatis</sup> supra nudis integerrimis, cymis dichoto-  
mis.

Habitat in India Occidentali

Specimen im perfectum folia lobata venosa. flori *P. macrophylla*

Americana Patagonula Lin. S. V. p. 230

Patagonula foliis partim serratis partim integris Dill. Elth. 306. t. 226 f. 293.  
Habitat in Patagonia &.

patagonula Cordia foliis oblongo lanceolatis utraque glabris: superioribus serratis  
inferioribus pilosis Hort. Kew. 1. p. 259

Intra speciem inter leguminum & alaternum certum cinereo-virente  
punctis albis adpressis, superne hirsutis. Folia alaterni, dilute virentia  
veni obliqua utraque glabra, margine pilosa. caecum formam  
cer

Cordia speciem inter non vidi.

*Micranthus* Cord. foliis ellipticis lanceolatis integerrimis, membranaceis venosis, racemis compositis laxis in ped. pag. 47.

Habitat in India occidentali, Amara & In West.

Rami cortice cinereo cicatricat, glabri, uti tota planta  
Folia petiolata venosa spithamea acuminata. petio-  
lus pollicaris. Racemi ad apices ramorum digitales  
peduncululi pariterales alterni distantes. flores in apice pedicell.  
non subsessiles terni flores parvi  
~~Racemi dichotomi~~  
ped

— cymis dichotomis.

*Elytoides la Martini* non videtur differere herb. La Mart.



nitida P foliis lanceolato-ellipticis, integerrimis venosis membranaceis  
nitidis glabris supra nitidis. paniculae dichotomae corymbis, pediculis  
Habitat in India occidentali de West

Codia nitida <sup>West</sup> Desf. Bot. Atl. t. 1. pag. 277

Rami vix ter costati cinereo glabro lora dichotomi. Solum petiolato altero  
na suprema opposita 3. vel quatuor vellicoria utrinque acuta fectio  
nulla vix. Paniculae ramis filiformis flexat. Calyx 4 campanula  
catus quadrifidus membrana laciniis ovatis. Corolla quinquefida  
laciniis ovatis. filamenta basi villosa. Stylus bifidus. Stigmata bifida  
capitata

Descriptione tertia non fuerit. vide in herbario planta ipsa <sup>fontana</sup>

elliptica & foliis ellipticis acuminatis integri coriaceis, ramis compositis diffusis;  
Simpliciter acuminatis Sw. prodr. pag. 47.  
Habitat in Jamaica;

Rami cortice cinereo dichotomi glabri. folia petiolata bip. tripol  
licaria ultima opposita oblique nervosa, oblique venosa subiona  
cea integerrima plana. Petiolus seminaequilans. Cor Cyma  
terminalis dichotoma multoeres densa. Calycis 2 minut  
ad lenter aureo villosi

ramosissimi

integerrimis, cymis dichotomis

tetraphylla C. foliis ovatis quaternis & stellatis, pedunculis corymbiferis  
Aubl. fl. Gu. pag. 224. tab. 80.  
Habitat in Guana

~~remedi~~

Buena species Richard. flores a cordis qua  
dam erronee additi

obovata C. foliis obovatis obtusissimis glabris integerrimis, rademis compositis  
Habitat in Ceylona hinc Thunberg qui eam sub nomine Echio nupit  
Rami teretes glabri dichotomi fascio purpureo-piceo. Folia petio  
lata alterna basi acuta in pollicari. Corolla calycis glaber  
Corollam non vidi

*Callocozia* P. foliis cordato-ovatis integerrimis, floribus corymbosis, calycibus  
interne tomentosis Linn S. V.

Perao affinis arbor balcifera racemosa, flore pentapetalo herbaico  
guttato, fructu corollaeo monopyrano tripido, semine rugoso Sloan  
hist. r. p. 95. t. 203. fig. 2.

Habitat in Jamaica &c.

Nodosa. Linn. Mant. Sci. Lib. Quor

figura aublottii Tab.  
non vidi

cum differentia Linn. non convenit

Cordia

retusa Cordia foliis fasciculatis cuneiformibus retusis tridentatis

Frustrum bacciferum e Coromandel roris marini obtusi et veluti punctati foliis plurimorum ex uno tuberculo provenientes Pluk.

Alm. p. 159 Tab. 31. fig. 1.

Habitat in India Orientali

Rami teretes, glabri, apice pilosi usculi.

Folia sessilia, plura ex eadem gemma, 3. 5. pollicana, inaequalia

cuneiformia, apice retusa, obtuse tridentata, interdum quadridentata; dentibus intermediis minoribus, supra nitida, adpressa

squamis albidis e quorum <sup>quis</sup> centro pili solitarii albi minuti adpressi, vix sioba, sub levior, pallidiora impunctata.

Gemma tuberculo formentosa.

Pedunculi ex eadem gemma cum foliis, solitarii, uniflori, pubescentes, foliis breviores.

Calyx quinque partitus, persistens: laciniis lanceolatis, extrospantibus, per acutis, pilosis

E hinc microphylla  
La March. f. d. herb  
La March. bacc. foliis n. d.

Corolla monopetala, infundibuliformis, faucibus aperta

Stamina quinque

Pistillum interdum stylus unicus, interdum styli duo bifidi, longitudine

corollae. Stigmata acuta

calyce non adnata

Ovary globosa, magnitudine Pipenis, quasi in loculari. Semina plura  
in singulis loculis. Sulcus transversalis in medio desepimentis

(Habitus Cordia foliis squamosis, stylus plerumque dichotomus, rei ad id  
vero ut apparet in nonnullis an igitur propinque generis

~~acuminata~~ reticulata. C. foliis subverticillatis obovatis acuminatis integerrimis <sup>glabris</sup> vero  
to reticulatis membranaceis cymis dichotomis.  
Habitat in Cambis & <sup>tri vel quadrifloris</sup> venis elevatis  
Primi tenet. Folia brevifolia petiolata ternata <sup>et venis elevatis</sup>  
fiabra, utraque glabra acuminis brevi acuto terminata. Calyx intus  
villosus ut in Collocasia  
an Collocasia haec convenit calyce differt figura foliorum

Descript uterorum inter americana