

Porreopsis barvata et Helianthus
 furmentopus aut por. herb. n. Paris. Porreopsis
 proprii generis Antard: o Cylindrica vertua

1. verticillata C. foliis decomposito lineariibus
2. coronata C. foliis pinnatis serratis lineatis glabris
3. ^{uncifera} leucantha C. foliis pinnatis serratis; radio florum diversi colore calyce est tenore pentaphyllo
4. ^{tricolor} chrysantha C. foliis ternatis ovatis-oblongis serratis; radio florum concolore
5. tripteris C. foliis subtternatis integerrimis lanceolatis
6. alba C. foliis subtternatis cuneatis serratis
7. ^{foetida} aurea C. foliis serratis: radicalibus tripartitis; caulinis trifidis integerrime lanceolatis
 linearibus.
8. reptans C. foliis serratis ovatis: summis ternatis, caule repente
9. ~~baccata~~ C. foliis ovatis serratis, seminibus baccis formibus
10. cuspidata C. foliis obovatis-oblongis obtusis integerrimis pubescentibus
11. auriculata C. foliis integerrimis ovatis: inferioribus ternatis
12. proserpa C. foliis ellipticis acuminatis serratis petiolatis venosis decurrentibus:
 alata inferioribus verticillatis; superioribus alternis
13. lanceolata C. foliis lanceolatis integerrimis ciliatis
14. ⁴⁵ bident C. foliis lanceolatis serratis oppositis amplexicaulis
15. ⁴⁶ alternifolia C. foliis lanceolatis serratis alternis petiolatis decurrentibus
16. ⁴⁷ angustifolia C. foliis alternis linearibus lanceolatis integerrimis lobatis, petalis radiis
 oblongis trifidis: lacina media majore

triloba

Porcopsis ^{oppositis} foliis subhombis trilobis que triplinerviis ^{terovato} denticulatis
Lupul. ^{scabrisuperis} pubescentibus, pedunculis terminalibus subramosis
^{Et. dia}
Habitat in India orientali v. Prohs
Caulis suffruticosus. Rami teretes pubescentes oppositi, superne
pubescentes. Folia petiolata opposita 2-3 pollicaria pa-
tentissima basi denticulato serrata, attenuata utrinque acuta
simpliciter venosa, triplinerviis supra scopula subtus prope
tam junctam molliter pubescentia inferiora triloba lobata
ovatis intermedio productiore, superiora ovato rhombica, floribus
oblonga. Rudimenta ramulorum ex omnibus axillis. Petiol.
pubescentes longiora folio parva breviora pedunculi ex axilla
simpliciter vel subramosi uniflori. Calyx simplex folioli lanceolati
obtus.

reptari Coccolpis foliis serratis ovatis. summi ternatis caule repente lin. S. V

pag. 702.

Habitat in Montserrat ad Ryan.

Rami teretes serrati, oppositi.

Folia petiolata, opposita, simplicia vel ternata: folium terminale
uti simplicia ovata, valse attenuata, bipollicaria, petiolata: latis
solia vix pollicaria, nervis attenuata; omnia glabra, profunde serrata:
serraturis mucrone albido-terminatis, septa simpliciter venosa,
subtus pallidiora, venis obsoletis purpureo-pesentibus.

Pedunculi ex axillis superioribus, bipollicares, oppositi, uniflori,

calycis ^{glabri} foliola linear-lanceolata, aequalia, dissum aequantia, glabra.

Corollula radii flava, staminibus purpureo-serratis

no 186

an lin. ? ulterius examinanda.

odoratissima Coroppsi

Habitat herb. Ausp.

Caulis herbaceus, erectus, striatus, glaber. Folio petiolato, opposito, pollicaria
na, pennata; pinna opposita, pennatidida pennule serrato subenici
lis, utraque glabra^{ta}. Pedunculi ex apice ramulorum 2-3. bipollicia
res, filiformes, glabri. ²Folia floralia lineana subpennata; pinna
lineares

Latifolia Coreopsis

Habitat in Carolina herb. Ruit.

Caulis herbaceus, erectus, subtetragonus, striatus, glaber, uti tota planta
Folia petiolata, opposita, 3 pollicaria, oblongo-ovata, venosa, remote
serrata, basi integerrima, attenuata: serratura mucronata. Peduncul
li terminales, subsimplici, cincter. 4, Calycis squamae duplici serie
lineares, exterior brevior laxus.

mitis *Coreopsis mitis*

Habitat in Amer. septentr. herb. Rich.

herb.

Porcopsis

Habitat herb. Desfont

Caulis herbaceus, villosus, angulatus, ramosus. Folia petiolata, alterna, inferiora
ternata lateralia minor, terminale oblongum, semipollicare, glabra superiora
simplicia omnia glabra, argute serrata. Pedunculi terminales, elongati. Pa-
dicelli 2-3, uniflori

Trichoperna boreopii

Habitat in Carolina West. Arch.

lobes

Jes. filifolia Coreopsis

Habitat in Carolina Herb. Puch.

Caulis tetragonus, glaber, opposita ramifera. Folia cartilaginea, interdum angustiora.
Rami uti. cauli apice bis vel ter dichotomi. Pedunculi in dichotomia et
apice, uni flori. Calyx duplex: foliola linearia, extenora lutea, longitudine fere
intenorum

anthera Conocypis

Habitat in Carolina

Caulis herbaceus, erectus, striatus, ore lenti pilis raris adpressis. Folia petiolata, opposita,
pinnata, bipinna: foliola sessilia, parum decurrentia, acuta, serrata, basi versus integerrima,
terminalia subpollicaria. Pedunculi ^{et comites incurva summa} superne, 2-3, uniflori. Calycis squamadu-
plix sericea, glabra, lanceolata, extensus luteo, rudus luteus.

Loxia Corcopia

Habitat herb. Græc.

Caulis herbaceus, erectus, teres, striatus, villosus. Folia petiolata, remotas, inferos opposita, bi- & tripollicaria, 3-5 lobata, lobis intermediis longioribus utrinque attenuatis: laterales extrorsum angulati: superiores alterna, bipollicaria, superius minoras, attenuata, acuta: omnia villosa supra scabra punctata, dentata simpliciter venosa, trinervia. Radiculi ex apice ramulorum axillarem et caulium, multiflori, villosi canescentes. Tolum lanceolatum integerrimum ad basin pedicellorum. Flores magnitudine vix Hel. tuberosi parvi. Polysyllabus polyphyllus: foliola duplici serie, aequalia, villosa, lanceolata, attenuata. Pappus breviflorus

humifusa
in caulis

^{caule fruticoso inferne}
Pectis foliis oblongis basi ciliatis subtus punctatis, floribus sessilibus

Pectis
fruticosa foliis plicatis demumque pilosis Plum. pp. 10. T. 15. fig. 7.

Pectis ciliata foliis fuscaribus ciliatis Amon. C. C. p. 407. J. Bot. 1750. S. V. p. 771.

Habitat in America, Cambes & 4.

^{fruticosa}
fruticulus ^{caule fruticoso inferne} ramosis ^{caulis sub} ciliatis inferne verti
vaginis foliorum. Folia opposita oblonga basi attenuata, connata, subtus punctata
bilinearia. Flores terminales et ^{antheris} sessilibus longitudine foliorum pentaphylli
glabri. semina coriata fetis 6-8. Calyx tetraphyllus foliolis oblongis, 6-8 floris

Jacobaeae humifusa Hyperici foliis Plum. Cat. p. 10. T. 95. fig. 2

Pectis humifusa foliis ovatis subtus punctatis, basi utrinque ciliatis, caulibus procumbenti
bus Schw. prodr. p. 114

Citiani Petis foliis linearibus ciliatis subtus pua floribus sessilibus punctatis, flori-
bus sessilibus. Amon: Acad. S. pag 407 * Sp. pl. 1250 S. V. pag. 771.

Jacobaea foliis salicis ad marginem villosis Plum. spec. 10. fig. 151. fig. 2.

Habitat in america ☉

Caules erectus vix spithameus, dichotomus, rasus nudus. Folia opposita, linea-
ria, acuta in pila, basi ad medium ciliata setis remotis, subtus punctata
glabra. Flores axillares sessiles. Corolla luteo parva. Semina d. Sci
crownata setis s. basi membranaceis; radii setis 2. Len Amon. l. c.

Pectis

1. humifusa P. foliis oblongis inferne ciliatis subtus punctatis, floribus sessilibus
 2. ciliaris P. foliis linearibus ciliatis subtus punctatis, floribus sessilibus
 3. punctata P. foliis linearibus ^{sessilibus} subtus punctatis, ~~pedunculis unifloris~~, caule erecto
 4. lanifolia P. foliis linearibus integerrimis utrinque loricatis, pedunculis unifloris
- ~~caule diffuso dichotomo~~
Diffusa

ovata Corcoppis folius ovatis altis nisi seepilibus. Decurrentibus
seombus longibos Coran. fo. vol. 3. pag 4. tab. 280
Habitat in nova hispania 7

non vid.

^{scabra}
alata Coccyzus foliis laevibus denticulatis scabris, caule alato Cuv
n. l. 4. vol. 3. pag. 30 tab. 260 alata
Habitat prope Mexico 4

non vid.

heterophyllo Coreops. foliis radicalibus panduriformibus crenatis, cau-
lino lanceolatis serratis. Cavan. 4^o. vol. 3. pag. 94. tab. 2. 68.
Habitat in nova Hispania

non vidi

punctata Petiis foliis linearibus subtus punctatis pedunculis unifloris.
Chondrilla foliis angustis et ad oras punctatis Plum. spec. 10. 7c. ¹⁷⁶¹ ~~1762~~ 3
Petiis punctata foliis linearibus integerrimis subtus punctatis (L. Sp. pl. 1290) S. V. p. 1)
770. Haecq. Amer. 207. 120.

Habitatio: ⁱⁿ America
glaber Caulis ^{glaber} erectus herbaceus, paniculatus, subtilissimè striatus semipedalis. Rami
filiformes, oppositi, patentes, dichotomi. Folia opposita patentissima linearia
subpetiolata utraque angustata, supra glabra subtus pallidiora, ~~int~~ punctata, integerrima
semipollinaria. Flores terminati, cum ramulis ex crescit lateralibus sunt pedu-
culati Pedunculus capillaris solitarius uniflorus. Calyx pentaphyllus ^{cyathaceus, subnullus} foliolis
linearibus apice fuscis. Seminae ob longitudine calycis apice 2 f. In ^{capitulo}
anthesis divanatis

Cinifolia Peckii foliis linearibus integerrimis utraque lobis, pedunculis unifloris
Hieracium fruticosum, angustifolium, gramineis foliis, capitulis parvis Sloan h. 1.
pag 255. Tab. 149 fig. 3.

Tagetes minor, caule subsinuso, diffusis foliis linearibus integris Brown Jacq: 319.

Habitat in America ☉

Caulis sesquipedalis trachiatus: ramis oppositis dichotomis, patentissimis. Folia
opposita, linearia, subpetiolata acuta, patentera, tercia. Ramuli ultimi dichotomi in pa-
runculos filiformes, uniflores. Stipulae difsi 3 Radix: semina difsi anthesis 2. radice
angustis 3. patulis 2. An. acid. l. c.

similis proci^{ent} differet foliis impunitati

Diffusa Pectis. foliis linearibus subtus punctatis subtus puncta
tis caule Diffuso Dichotomo
von Rohr.

alatum

H. foliis lanceolatis acuto integerrimis glabris

Habitat

Caulis ramosus ramisque alternis a foliis decurrentibus
flori quadruplo minori quam in arietumkali folia
superiora integerrima inferiora fenestra una vel altera

pinnato

^{filiformibus alternis}
Pectis foliis pinnatis glabris, pedunculis unifloris

Pectis pinnata La Martre journal d'histoire nat. Tom 2. pag

140 tab 31

Habita

Caulis erectus, glaber alterne ramosis sulcatis angulatis
folia alterna glabra. Pedunculi ex apice ramorum
solitarii gemini vel terni. Calycis foliola linearis
cuneata apice colorata Pedunculi angulati sub flore
crassiores

carolinianus A. folio oppositi ~~triplicinarius subter timentis~~

verticillata Con. foliis decemgto pto linearibus Lin. L. V. p. 782

Chrysanthemum marianum, foliis tenuissimis divisi foliis, ad intervallo
confertis Pluken. mant 40. Y. 344. fig. 4

Cosopsis foliis verticillatis linearibus multifidis Chret. ped. 1. 9. p. 1.

Peritoccephalus delphinii foliis Vaill. in art. par. 1720. Chret. ped. 9

fig. 1.

abita in Virginia 3

Fruticulus bipedalis erectus ramis glaber rami frati. Folia oppo-
sita, saepe verticillata, laciniis filiformibus. Peduncululi est apice
uniflori.

coronata Coreopsis foliis pinnatis serratis lineatis glabris L. Spec. pag. 12 Pl. * S. V. p. 782.

Bidens pentaphylla, flore radiato Plum. pp. 10. t. 53. fig. 2.

Ceratocephalus foliis pentapteris acutis, flore radiato Vaill. act. 601.

Habitat in Virginia ☉

Planta omnino Bidentis frondosa, sed flores Coreopsis verticillata radio magno octo-
talo, striato, ovali. L. Spec. l. c.

Cucurbita *Coccolpis* foliis pennatis serratis, radioflorum diversicolore. Lin-Am. Bot. 4. p. 291*. L.
V. pery. 182.

Habitata America O

Caulis 3. 4. pedum, tetragonus coriuficulus: lateribus oppositis canali ulatis. Rami
oppositi. Folia opposita. Toliolis: rarius 3. ovatis, indivisis, glabris, squalibus argute
serratis, lobibus, extremis tribus saepe confluentibus, latere exteriori saepe decur
rentibus, apice integerrimis. Petioli utroque villo connexi. Flores terminalis al
terni 2. 3. Pedunculis longiusculis. Calyx spatulatus, calyce exteriori sphyllis
minore. Corolla radius saepe pentapetalus, albus: Petalis ovatis, saepe tridentatis,
intermedio productiore; subtus trinerviis. Diskus parvus, convexus, luteus. Semina
coronata tridentata, retrospum hispida. Semenum diiskus pyramidalis evadit. Panta
Bidentisifrons. Flo. Asters annui. L. Spec. pl. Am. C. C. Jacies antecedenti

~~pecunia sub nomine bicolor hunc prosum~~

Chrysantha P. foliis ternatis ovato-oblongis serratis, radio florum conicolore her. S. V.

pag. 702.

Idem americana triskylla, angelici folio, flore tricoloro. Plum. w. 53-

fig. 1.

Habitat in America

non vid.

alba *Coreopsis folio subternatis cuneatis serratis* L.S.V. p. 702.

Chrysanthemum americanum, ciliens folio glabro bellidis majoris flore Herm. parad.
124. t. 124 flore albo. Pluk. alm. 101. t. 160. fig. 3. Raii h. pl. 3. p. 220. pl. 11.

Coreopsis scandens, folio serratis ternato-pinnatis, receptaculo nudo Brown. jam. 321.

Habitat in Insula St. Crucis 4

Tripteris C. foliis subternatis integerrimis Hort. Ups. 269* L.V. p. 702. Spec. pl. p. 720*

Chrysanthemum Virginianum, foliis ac utroque lobi trifoliatif. *anagyridis*
foliis Montf. hist. 3. p. 21 f. 6. t. 3. fig. 44.

Habitat in Virginia umbrosis subhumidis ?

Caulis frutus cretus glaber ramis oppositis. Folia petiolata opposita
ternata, suprema simplicia, ^{altiss.} glaberrima subtus glauciscentia
obtusiuscula: foliola petiolata intermedium reliquis majus. Pedun-
culi nonnulli ad apicem alterni uniflori. Calycis foliola glabra
exteriora linearia obtusa, interiora exterioribus parum longiora
oblonga

sum

foetida *Conocarpus foliis trilobis lobis acumineatis serratis medio longior*
Cavan. Ic. et Desf. pag. 55. Tab. 77*

Habitat in Mexico ©

aurea Cor. foliis serratis radicalibus triplicatis; caulibus trifidis integrisve lanicolato-crenatis

Hort. New. 7. p. 252

Habitat in Am. sept. 7

non vidi

reptans Coreopsis foliis serratis ovatis: summis ternatis, caule repente Lin Am. Cl. 5. p. 407.
S.V. p. 402.

Chrysanthemum trifoliatum scandens, flore luteo, semine longo rostro bidente Sloan.
Jam. 125. h. 1. p. 261. t. 154. f. 23.

Verbejina foliis inferioribus simplicibus oppositis: ^{superioribus pennatis} summis ternatis ~~caule repente~~
Bourm. Jam. 319.

Habitat in America

Caules longi repentes. Folia opposita, petiolata, ovata, profunde serrata, rida
sed raris finis pilis adpressa: inferiora simplicia. Rami corollae alternis, erecti
t. Am. l. c. Calyx bidentis Calyculo patente. Semina aristata. Planta magna
Lin Spec.

non vidi

barcata Coropis foliis ovatis serratis, seminibus bacciformibus L-Suppl. 300 *

Habitat in Surinamo

Caulis pedalis, herbaceus, erectus. Folia opposita, petiolata, trinervi. Flores ad apices
sepe tres, pedunculati, minores Rudbeckia. Calyx foliolis 16, lato-subulatis, recurvis,
longitudine d. f. Corolla radius luteus, tridentatus, disco longior. Semina longitudine
manulea, nuda, subglobosa, baccata: semine intus subtetragono, atro. Pappus nullus
Receptaculum paleaceum convexum. Calyx fructifer evadit cum fructu per
globos. Resert exacte fructum Rubi figura, acinis baccatis, globosis L-Suppl. t. c.

non vidi

crassifolia C. foliis obovato-oblongis obtusis integerrimis pubescentibus Hort. Kew. 3. p. 253.

Habitat in Carolina 7

non vidi

perfoliata P foliis caulinis oblongis ensiformibus oppositis
perfoliatis, caule ramoso Walt. fl. Car 214
Habitat in Carolina

non di

auniculata Cor. foliis integerrimis ovatis: inferioribus ternatis Lx. f. V. p. 702

Chrysanthemum virginianum trifoliatum humilius, obtusioribus foliis hispitis
Monsf. hist. 3. p. 20. f. 6. v. 3. fig. 45.

Chrysanthemum hispidum Virginianum, auniculato dulciamaro folio octopetalo
Pluken. alm. 107. t. 83. fig. 5. et tab. 242. fig. 4.

Habitat. in Virginia

Caulis pubescens fructus. Cuneolato elliptica
Folia ovata opposita foliola oblonga acuta
integerrima villosa ^{pedunculata} ~~puberula~~ intermedium lateralibus mul-
tis ^{major} ~~major~~, ^{simplicia} ~~simplicia~~ cuneata pedunculi ex apice
simplicis pini vel subramosi elongati, dichotomi, uniflori tri-
folii. Calyx glaber foliola exteriora 7-8 partitus laciniis lanceo-
latis: interioribus ovatis margine scariosi. Corollula radii tri-
folii

major

*P. foliis verticillatis lato-lanceolatis basi pubescenti-
bus* Walt. fl. car. pag. 214
Habitat in Carolina

non vid.

Lanceolata C. foliis lanceolatis integerrimis Eliati Lin. S. V. 782.

Bidens caroliniana, florum radius latissimis insigniter dentatis, femine alato per maturitatem convoluto. Mart. Cent. 26. t. 26

Bidens fulcifolia foliis, radio amplo laciniato Dill. Elth. 55. t. 40. fig. 56.

Habitat in Carolina

differt ab auriculata foliis omnibus simplicibus, angustioribus, et basi attenuatis, supra linear-lanceolata

protera C. foliis ellipticis acuminatis serratis petiolatis venosis decurrentibus: inferioribus verticillatis; superioribus alternis Hort. kew. 3. p. 253.
Habitat in Am. sept. 4

non vid.

alata

C. foliis oppositis alternisque ovatis ~~seu~~ serratis Inplexis
vix petiolatis Decurrentibus

Habitat in Virginia

Caulis herbaceus crassitie penna cygnea ramosus glaber

Folia magna per petiolum Decurrentia ala que conti-
nuata per caulem

Flores non vidi

Leucantha C. foliis pinnatis pinnatis, radio florum diversicolorum. Am. Acad. 4. p. 291. *

Habitat in America C

Stems radiatus Leucanthemi Jacq. ^{identis} Planta facie antecedenti

Caules ^{tetragonus} striatus pilosiusculus. rami oppositi folia petiolata. ^{lobata} ^{lobata} ^{lobata}

oblonga sessilia ultima confluentia, ^{impar} ^{argute serrata} ^{argute serrata} ^{argute serrata}

terminalis ^{impar} ^{argute serrata} ^{argute serrata} ^{argute serrata} ^{argute serrata}

villosi. Flores terminalis duo vel 3 alterni ^{pedicelli uniflori}

calyx extensor pentaphyllus brevior. radius pentapetalus albus

Petalis ovatis subtus inaequalibus

alternifolia & foliis lanceolatis serratis alternis petiolatis decurrentibus Lin. S.

v. pag 483. Faag. Hort. Vind. 2. t. 110

Chrysanthemum virginianum, alato caule, bidentis altissimum, folio appens, flore minore Ledeb. Monf. Hort. 3. p. 25. f. 6. t. 7. fig. 75. et 76.

Chrysanthemum virginianum, caule alato, ramosius flore minore Pluken. alm. 100. t. 159. fig. 3.

Chrysanthemum canadense bidentis, alato caule Monf. Bot. 253.

Habitata in Virginia Canada &

Folia inferiora ternis & quaternis; superiora alterna decurrentia hu

videns C. foliis lanceolatis pinnatis oppositis amplexicaulis Lin. fl. Sv. 772 +

Chrysanthemum aquaticum videns, foliis non diviso flore, foliis non diviso,
flore aureis petalis undique radiato Monf. bot. 3. p. 17. f. 6. Tab. 5. fig. 25.

Hepatonium aquaticum, foliis non diviso, flore aureis, undique radiato Tournef.
obf. 65.

Eupatorium cannabinum Chrysanthemum Bar. Ic. 1209.

Habitat ad Bosporum, Persylvania O

Caulis fruticulosus, bifolius. Tota remote serrata. Foliole calycis
externae vel 10 lanceolata radio paucis longiora. Flores cernui

varietas potuerunt Cassop videns cernuus qui variat flentibus radiatis
et bifloris

quadricornis C foliis lanceolatis serratis oppositis amplexuan-
tibus, pappo quadricornitato Hooker fl. Siles. 2. 2. p 481
Habitat in Silesia

michi ignota an varietas C. bidentis

coronata C. foliis pennatis serratis lineatis glabris Lin. Spei: pl. 1201. L.V.p. 782

Bidentis pentaphylla, flore radice Plum. Sic. 53. fig. 2.

Habitat in Virginia O

Planta omnino Bidentis frondosa, sed flores Cocoppis verticillata radio may
no, octopetalo, striato, ovali

angustifolia R. foliis alternis lineari lanceolatis integerrimis levibus, petalis radii oblongis
Vitifidis: Calicis media majore Hort. Kew. B. p. 253.
Habitat in Carolina et Florida.

non radi

gladiata

C. foliis radicalibus linearibus lobis integris
caulinis alternis Walt. P. pag 215

Habitat in Carolina

non vidi