

Coniandrum

1. latissimum C. fructibus globosis

2. testiculatum C. fructibus didymis

Coriandrum orientale, chamomeli folio Tournef. Cor. pag.
Habitat in Armenia herb. Tournef.

habeo

Coriandrum?

Coriandrum orientale chamomeli folio Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Mus.

Caulis plures, diffusi, palmares. Involucrum unisefala polyphyllum,
partiale dimidiatum.

Ladurum @ *Fructibus globosis* Lin L. V

Coniandrum Cam. epist. 523.

Coniandrum majus Bauh. pin 150.

Habitat in Italia agris @

Caulis 1-2 pedalis glaber folia bipinnata folioli angustis
^{inferiora pennata superiora pennis fissilibus}
^{oocymis} ~~stipiti piperoni~~
fimis, pinnis utraque radicalia tripartita, laciniis oblon-
gus incisus latis involuella triphylla. Semina globosa
lineis elevati

Chamomelifolium Conradum

Conradum chamomelifolio orientale Tournef. Cor.

¶ habitat in oriente Herb. Turc.

Caulis striatus, teres, glaber. Folia bipinnata: pinna alterna, lineari, angustis.
limbo, profertim superne, trifidis vel integris, vix pollicares, glabra. Semina
minora quam in saturo.

7 Efficulatum & fructibus didymis Lin. Spec. pl. pag. 3674 LV

Coriandrum minus Efficulatum Bauh. pin 150. Pluken. alm 120 & 169. f. 92

Coriandrum minus odoratum Bauh. hist. 3. p. 91.

β. Coriandrum sylvestris tenuispinum ~~fortissimum~~ Bauh. pin 150. Segu. Veron.
2. p. 20.

Habitat in Europa australi et Barbariae agris &

Caules erectus pedales dictostome monofurci ramis angulatis
glabri. Folia pinnata radicalia tripartita laciniis ob-
longis incisivi caulinis bipinnatis, pinnis lineamentis
f. Infervi. pedunculis oppositi foliis umbella saepe
simplex interdum bi- ^{triplex} ^{ovulo} ^{quello} ^{radialis} ^{umbellula}
pauciflora. semina ^{pinnata} ^{quasi} ^{quasi} ^{quasi} ^{quasi} ^{quasi} ^{quasi} ^{quasi} ^{quasi} ^{quasi}
majora globosa aliter latere plana
negosa mucronata, connata latiora quam longa.