

Coniana

1. myrtifolia C. foliis ovatis oppositis, racemum terminalibus
2. nuscifolia C. foliis cordato ovatis sessilibus ternatis, racemis axilla
ribus
3. sarmentosa C. foliis oblongis oppositis, racemum axillaribus

2 rufi-folia. C. foliis cordato-ovatis sessilibus Lin. l. 1. V
Conana rufi-folia, vulgo Sen Sen. penins. 3. p. 17. 8. 22.
Habitat in Peru.

foliis ternatis cordato-ovatis ternatis, racemis axillaribus

non vidi nisi in Ley. Fend.

nusi-folia *Coriana*

Habitat in Pene herb. Gusf.

Rami hexagoni; glabri: ramuli inferne ternati, superne oppositi, patentiores; folia sessilia, unguicularia, cordata, vel cordato-oblonga, obtusa, trinervia, glabra, intermedia, areola, inferne in ramos ternata, superne et in ramulis opposita Racemi axillares, bipollicares. Flores sparsi. Pedunculi villosi. Bractea parva oblonga.

3 *Sarmentosa* C. foliis oppositis oblongis oppositis, racemis axilla-
ribus

Conona sarmentosa, procumbens diffus, foliis cordato-
ovatis acuminatis integerrimis quinque nervis salpe-
tricolatis: racemis axillaribus elongatis nectantibus
Tost. prod. no 377.

Habitatio nava zelardia,

Rami inferne teretes, superne tetragoni, citi tota
planta glabri. Folia sessilia, fere tripollicaria
quinquenervia, integerrima, venosa. Racemi
palmaris oppositi. Pedicelli semunquiculares
grafi. flores hermaphroditi.

o myrtifolia & foliis ovato-oblongis Lin. p. V

+ Rhus myrtifolia monspeliaca Bauh. pin. 414 Angl. t. 84
t. 20. fig.

+ Rhus plinii myrtifolia monspeliensis Lob. ii. 2. p. 90.

Habitat mont pelici

Rami tetrago frutex sesquipedalis caule tetragono ramis
ubi tota planta glaber. folia opposita subsessilia trinervi
in superioribus bipollicaria arena. Racemi ex apice
ramorum; pedicelli oppositi bractea linearis ad basin
raguli

folia opposita ovata opposita, racemis terminalibus