

Coronopus

negosum L. foliis cuneatis ex trochum serratis, fructibus aggregatis sessilibus ^{negosi-}
^{habitat in Brasilia} ^{rami procumbentes}
Caulis lignosus ramosi pubescentes. Stipulae petiolatae acutae basi
attenuatae glabra vix venosa pollicaria. peduncululi ^{at illarum} brevissimi.
flos. flores cuncti sex sessiles. fructus obovatus ^{negosifimus} utrinque
sulco divisi

integrifolius [?] Coronopus foliis lanceolatis ² subtruncatis ex trochum
serratis, floribus axillaribus subsessilibus

an hujus generis? Claspis flores desunt

Didymum. foliis pennatis, caule erecto, fructibus didymis Lin. *non*
92. + S. V. p. 506.

Habitat. in Anglia ☉

Caulis erectus ramosus, pedalis, striatus pilosus. Folia
pinnata. Pinnis septem, oppositis alternisque basi acuti
antea serrato incisio glabris. Racemi axillares longitudi-
ne foliorum. Flores minutissimi. Capsula subrotunda didyma
subnigra perva.

Lepidium anglicum Thunb.

Didymum lepidium floribus diandris, foliis pennatis, fructibus didymis

pinnatis ☉. foliis pennatis pinnis incisio, racemis lateralibus, floribus diandris

Vestibulatum L. foliis lineari lanceolatis, ^{indivisa} fructibus didymis
Habitat in Madagascar, sic in Thonin qui mecum commu-
nicavit.

Caules herbaei decumbentes pilosissimi, ramosi. Folia
in teterrima basi versus attenuata inferiora pollua-
na ~~obtusis~~ ^{obtusis} superiora minor. Racemi laterales et
terminalis foliis longiores fructus breves pedicellati
baccati et duobus quasi compositi ut in Coronario
Vestibulato, semine 2 naves parum majore globos.

si folia omnia pinnata essent, a Lep. didymo differet
solummodo foliis omnibus indivisi.

linifolius Coronopus foliis lineari lanceolato lineamentis
integerrimis, racemis lateralibus

Vestibulum L. foliis lineari lanceolatis integerrimis, fructu didymo

Habitat in Madagascar.

Caulis herbarum ramosus; densus

ambrosia Coronopus
coronopus C. foliis pinnatifidis caule depresso Lin. S. V
Pespiliflorus fl. Dan. 8. 202.

Pseudo ambrosia Com. epit. 596.

Ambrosia campedris repens. Bauh. pin. 130.

Habitat in Europa apris & rudis C

Caulis plerumque diffusus ramis saepe vix digitalis glabri. Folia
petiolata. Laciniae lineares integerrime vel ~~est~~ interdum
lacinia una alterave ~~facinulata~~ ^{facinulata}. Flores axillares simpliciter glomerati
in ~~1~~ siculo tuberculis acutis muniti

an Lepidium munitum sine potius spectat

Coronopus ^{Coehleana} Coehleana foliis pinnatifidis caule depresso L.
Lepidium squamatum; foliis pinnato multifidis; floribus hexan-
dis; siliculis sagittatis, late cordatis, margine bifurcam
squamis imbricatis Coeh. Depind. pag. 117. 1259