

Conylus

1. avellana C. Stipulis lanceolatis, foliis subrotundis cordatis ex obtuso acuminatis
glabris, ramulis pilosis
2. cornuta C. ramis petiolisque pilosis scabris, stipulis lanceolatis, foliis cordatis oblongis
pubtis villosis
3. rostrata C. Stipulis lanceolatis, foliis oblongis cordatis acutis ramulis glabris, Caly
cibus fructus rostratis
4. columna C. Stipulis linearibus acutis, ramis foliisque glabris

americana Cnylus

Habitat in america herb. Desfont.

Rami teretes, purpureo scintillantes; ramuli villosi. Folia subcordata, oblonga, petiolata, inaequaliter serrata, venosa, subtus pallida villosa. Amenta longa, incana. Involucrum nucis oblongum laciniatum.

americana *Corylus*

Corylus americana Waltheri.

Habitat in Carolina Lesb. Richard

Rami teretes, apice hirsuti. Folia petiolata, bipollicaria, subcordata ovata
acuminata, glabra, subtus pallidiora, nervis villosa, uti petioli. Involu-
crum fructus intesum: laciniis ovato subdentata, pubescentibus, hirsutis pilis
apice glandulosis, nucis longiora. Amenta masculina longissima: Squama
ovata, villosa.

americana C. sepali lato-fimbriatis obliquis incisivi Walt fl. carol. pag
236
Habitata Carolina 5

non vidi

avellana & stipulis lanceolatis; foliis subtundis cordatis ex obtusis acuminatis, ramulis pelosi Hort. kew. 3. p. 363.

silvestris a. Corylus silvestris Bauh. Pin.

Corylus avellana stipulis ovatis obtusis len. l. v.

alba β. Corylus sativa, fructu albo minore s. vulgari Bauh. pin. 417.

nigra γ. Corylus sativa fructu oblongo rubente Bauh. pin. 418.

grandis δ. Corylus sativa, fructu rotundo maximo Bauh. pin. 418.

glomerata ε. Corylus nucibus in racemum congestis Bauh. pin. 418.

Habitat in Europa

Rami teretes punctati; parviter fidenter & labri juniori pelosi uti petioli. Folia oblonga bif. tripolliciana extus dilatata apice dentato subangulata inaequaliter serrata costa et venis parvis ramonibus obtusa. amenta masculina canescentia

quomodo folia subter

rostrata C. Sepalis lanceolatis, foliis oblongis cordatis acutis, ramulis glabris,
calycibus fructus rostratis Hort. kew. 3. p. 364.
Conchylis pfloratis calycis longior, fructum etiam maturum omnino
tegente Gron. Virg. 157.
Habitat in America septentrionali 3

Columna C. *Stipulis linearibus acutis. Lin. S. V.*

Avellana pumila Byzantina Clus. hist. 1. p. 11.

Avellana peregrina humilis Bauh. pin. 410.

Corylis Byzantina Seb. mufl. 1. t. 27. fig. 1.

Habitat Byzantii &

Rami teretes glabri cortice cinereo. Folia petiolata, palmata
basi cordata altero latere parum longiora subangulata inaequaliter
dentata serrata, glabra subtus pallidiora veno su. gemma
caespitantes. Peduncululi amentum mapul. axillares villosi.
amenta 4. 5. alterna subsoplia squamis subconspicentibus

ramis folisque glabris

an huius descripta potius. rostrata planta mea dubia

cornuta C. ramis petiolisque pilosis scabris, stipulis lanceolatis, foliis cordati
oblongis subtus villosis

Habitat in horto parisiensi habuit

Rami teretes, citi petioli pilis glandulosis nigrescentibus adpressis. ^{illis minutis, affinis} Folia
palmaria acuminata inaequaliter dentata ~~supra fere nuda~~ subtus
pallida vel molliter villosa