

Corypha

Sabal Corypha

Habitat ad Senegal hab. Ventenatii t.

Petidi supra plani, subtis convexi, glabri. Folia palmata, 7 fida. Laciniae laciosae
late, nervosae, laevae, glabrae, serrulatae. Spica ramosa. Calyx trifidus, parvus.
Corolla trifida, parva.

adanson

Saribus *Corypha* frondibus in orbem polyfidis, plicatis, gradibus racemosis reclinatis

Lour. fl. Cochinch. pag 212.

Saribus Rumph. Amb. 1. 2. P. 4. 8.

Habitat in sylvis Cochinchinae

Palma magna, truncus crasso aequali. Frondes triplicales: laciniis subulatis
glabris. Stipitibus summi crassi longi reclinatis. Flores hermaphroditi.
Petala 3. . Intra pellicani Loris

afriana *Corypha* frondibus flabelliformibus multifidis plicatis, frondsae coarctatae
to frabereito: floribus monocis Cor. fl. Cochen. pag. 213

Habitat in Africa orientali &

Palma 12 pedalis - stipites longi sparsi - Spatha brevis - Spadix ramosa

Cal. 3. phyllis Cor. 3 petala Drupe subpyriformis magnitudine ovi anatis

non vid.

puleana *Corypha* frondibus digitatis, foliis linearibus obtusis, radice striato
erecto Lour. fl. Cochinch. pag. 213

Liguata, *Sambur* pumila Rumph. Amb. lib. 1. pag. 44 tab. 9

Habitat in Sylvis Cochinchina

4. pedalis. Repetit longi pauci, inferne fruspi. foliola pinnosa multipli-
cata. flores hermaphroditi, spadix magna, composita et specis longis
simplicibus. Cal. 3 pedic. Cor. 3 partita Drupa subrotunda

minor C. fonsibus palmatis flabelliformibus plicatis
subtrifidis; filis interjectis paucis, stypticis inermibus
Haeppel-holt. 3. 180.

Habitat

on eadem ac Luterne garteni ?
P. pulchella Walt. ?
non vidi.

palmetto C. frondibus medio conniscentibus margine expan
sic. Walt. fl. Car. p. 119
Habitat in Carolina

non vid.

umbraçulifera C. frondibus pinnato palmatis pluriatis
filoz interjectas, stipitibus tiliato pinnati