

Potula

1. antheroides C. foliis pinnatis laciniis dentato-incisi, pedunculis unifloris axillaribus, floribus flosculosis
2. virgata C. foliis pinnatis denticulatis, pedunculis terminalibus elongatis unifloris, caule decumbente
3. aurea C. foliis pinnatis setaceis multifidis, floribus flosculosis cernuis
4. turbinata C. radice aculis subtus tubrinatis, floribus radatis
5. tanacetifolia C. foliis tripinnatis: laciniis acutis, caule erecto, floribus flosculosis
6. pilulifera C. foliis bipinnatis, capitulis globosis, caule erecto
7. fendea C. foliis supra decompositis tomentosis linearibus
8. pectinata C. foliis pinnatis: pinnis integerrimis, floribus flosculosis subdysmptosis
9. fructa C. foliis pinnatis sedis planis nudis punctatis, caule erecto fructu, floribus
10. quinqueloba C. foliis quinquelobis tomentosis ^{pub}, caule erecto
11. carpenfis C. foliis pinnatis subternatis ^{pub} teretibus: infimis bipinnatis, floribus radatis

12. vi sicca C. foliis cymato-pinnatis, floribus radiatis

13. coronopifolia C. foliis lanceolatis-linearibus amplexicaulis dentatis, floribus flo

^{fulvis}
14. umbellata C. foliis lanceolatis hirsutis, caule erecto, floribus umbellatis

Cotula cicutica; montana abrotanifolia Tournef. Cor. pag.

Habitat in Creta herb. Tournef.

Caulis basi ramosi

habes

minuta Capitula

Foster

Habitat P

herb. Musci

Caulis digitalis, ramifus, teres, glaber. Pedunculi terminales saepe
breves, incurvi. Capitula minuta

1 anthemoides ^{caerulis} *Cotula* foliis pennatis dentato incis, pedunculis unifloris ^{axillaribus} floribus flospulosis.

Chrysanthemum exoticum persusillum nudum, foliis Coronopi Pluken. Alm 101. tab 274. f. ult.

+ *Ananthe* *Cyclus* chamomeli folio Dill. Elth. 26. 7. 23. f. 25.

β. *Artemisia* nilotica foliis bipinnatis caule erecto usculo, pedunculis solitariis unifloris nudis filiformibus longitudine foliorum. Lin. Am⁴. p. 209. * Spec. pl. 4 pag. 11 80. +.

+ *Cotula* anthemoides foliis pennatis multifidis dilatatis floribus flospulosis L. V. p.

140. Murr: + *Tanacetum* humile Eorsh. Defor. p. 140

fl. Jott. 230 * *Caulis* pro planta palmari diffusus. Caule ramoso diffusus pelagus propter habitum in Hispaniam ad apices ramorum, Rami altitudine caulis. Folia sespbia alternata

Trifida Helens β. *bra* pennata pennis exterioris majores, dentata vel incisae acuta lanceolata
Egypto Pedunculi villosi filiformes ex axillis supremis unifloris solitariis
Coniugatione foliorum. Flores globosi parvi. Calycis foliola equalia lanceolata

~~Alcane capita b. spec. foliis similibus et major~~

Montanum

hinc videtur stylo coronatum

Arthemoides Potula ^{Potula} foliis pennatis multifidis dilatatis, floribus glomeratis
L.S.V. pag. 774.

4 Tanaetum humile Toschi. Descript. pag. 98 ne 73.

Calyx foliolis 10-20 oblongis, lobis marginis membranaceis, aequalibus

Receptaculum nudum

4 Artemisia nitida Spei. pl. pag. 1186.

~~Compositae~~ ~~Artemisia nitida~~

2 virgata

Colula foliis pennatis denticulatis, pedunculis terminalibus elongatis uni flori. Caule
^{decumbente}
Habundat in C. b. p. ei

Caulis herbaceus decumbens, glaber, ramifcus. Rami erecti simplices. ^{Impollinari} Folia pennata
complexicaulea ^{gracilia}. Lacinie lanceolatae, subae minutae denticulatae, ~~exteriorum~~ angu-
stiores. Pedunculi ex apice ramorum et ramulorum lateralium, solitarii uni flori filii-
formes, foliolis rennatis subulatis adspersi. Calyx 5 foliolo aequali. Corolla flava.

Similis Anth. differre videtur caule decumbente nec suberecto, Ramis remotis longioribus
minus divisi, glabris ~~foliolo~~ pennatis ^{longioribus} angustis exteriorum attenuatis nec aliquo
 dilatatis pedunculis longioribus ex apice ~~foliosis~~ ^{com} si enim laterales ramum
mentantur cum foliosis ^{ibus} floribus majoribus

teretifolia C. foliis pennatis, pennis teretibus, pedunculis terminalibus
lobis solitariis unifloris.

Habitat in Cap. b. spec. 5. ^{lope.}

Stem erectus ramis teretibus, subverticillatis erectis, fructu
glabris. Folia frequentissima. pennis quinque oppositis
crassis glabris, mucrone albedo terminatis. Flores magnitudi-
dine C. anthem. squama oblongo obtuso velli nonnulli crispis
adpresso

7 aurea *Cotula* foliis pennato-foliacis multifidis, floribus flospulosis cernuis L. S. V. pag. 774.

Chamomelum aureum peregrinum capite sine foliis Bauh. h. 3. p. 119.

Cotula foliis pennatis foliacis, caulibus procumbentibus Loefl. d. 164* pag. 221.

Habitat in Hispania, Europa Australi

Caulis basi ramis in Planta digitalis, glaberrimis basi ramis binis ascendentibus albidis
dure caulis vix ramosi. Folia pennata, pennis bis trifidis foliacis. Flores terminales
solitarii magnitudine fere pupi, subglobosi, Paliola calycina oblonga aequalis, marginem
narium sic anosa fusca.

4 Turbinata *Cotula receptaculis subtus inflatis turbinatis floribus radiatis* L. Mant. 473* S.V. pag 775
Chamomelum Ethiopicum lanuginosum Breyer. Cent. 140 Tab. 73. Monf. h. 3. p. 36 f. 6 & 12.

fig. 14

Habitat in Ethiopia

subtile pubescens

Planta palmaris glabra erecta glabra, ramosa. Rami alterni erecti terminati. Pedunculo elongato aphylo unifloro. Folia pinnata, subangulata: pinnis linearibus acutis. Pedunculi caule longiores, apice in Receptaculum, orbiculatum inflatum, dilatati. Soliola calycina subturda

pedunculata *Potula* foliis pennatis pennis integerrimis floribus subcorymbois ²pleocaulis.

Habitat in C. bono spei Burman C.

Planta perthamo pubescens, inferne ramose rami simplicis ³summi ascendentes. Folia
⁷caulibus inferiora trifida, superiora pennata: pennis oppositis ³longioribus ^{exteriorum parium} integerrimis
plenisque utraque 3. ^{corymbis} Pedunculis terminalibus 4-6 floris, simplicibus. peduncululi basi
foliolo instructi. Calycis foliola aequalia. Flores globosi. Corollula radii 5 fido ⁵caulibus
ovata, disci quadrifido

9 striata Cotula foliis pinnatifidis planis nudis punctatis, caule erecto striato, floribus radiatis
L. V. 12. p. 734. Mart. 286 * L. V. pag. 725

Cobecthia pectinata Berg. Cap. 306. t. 5. fig. 9 *

Habitat in Cap. b. pra.

Caulis herbaceus quinquepedalis, glaber striatus, rore copio obductus. Folia aeterna,
sessilia, pinnatifida, extusum dilatata ^{arenigera} adpressis pilis vagis punctis que confer
tis exaratis, proferim subtus: laciniis oblongo, obtuso mucronata. Pedunculi ter
minales ^{sub}aphylli, solitarii, uniflori. Corolla calycina aequalia lacinolata, acu
minata, ciliata.

10 quinqueloba *Cotula* caulibus erectis, foliis quinquelobis subtomentosis L. Suppl. pag 377. S. V. p. 775.

Habitat in Cap. b. spici

Caules erecti caespitii, simpliciter spinosi, subpubescentes. Folia petiolata, ^{acutem-} quinqueloba, subtus cano-
subtomentosa. Lobis semiovatis, aequalibus mucronatis. Peduncululus unus alterve, longus.
bractea lanceolata, parva: uniflorus, erectus. Flores magnitudine matricariae. Calyx squa-
mis aequalibus, pubescentibus. maxime convenit in flore cum *fruticosa*, ut separatum genus
constituere possent. L. L. C.

17 Capensis Cotula foliis pinnatis subcarneosis teretibus sculis: infimis subbipinnatis, floribus radiatis
L. Mant. 287.

Chamomelum africanum annuum, petalis florum brevibus magis que sparsis Rai suppl.
224.

Chamomelum leucanthemum crassifolius e Cap. b. spei Plukh. mant. 44

Madriniana capensis foliis simpliciter pinnatis subcarneosis teretibus sculis: infimis subbipinnatis L. Mant. p. 115*

Madriniana africana foliis duplicato-pinnatifidis: laciniis acutis receptaculo hemisphaericis, radiis deflectis, caule ramoso Berg. Cap. 296*

Habitat in Cap. b. spei

Facies Chamomilla. Caulis plurimi, ramosissimi, diffusus, spithamei, teretes leviusculi
folia simpliciter pinnata, carnea, fere nuda, impunctata, costa vix complanata: dentibus cylindricis apice purpureo fere dentibus f. fuscescentibus. folia infima
dentibus lateralibus pinnatifidis. Pedunculi terminales longiusculi, uniflori
striati. Calyx imbricatus parum sicciosus. Corolla radius petalis 10 s. 12. albis
ovatis: staminibus 8 s. 10 convexis luteis, filiformibus quadrifidis. Receptaculum
semiovatum L. Mant. 115.

* Destantes subpedicellato, lineato, neutro.

12 *viridifolia* *Cotula* foliis lyrate pennatis, floribus radice L. Hort. Cliff 417. *. S. v. pag. 775.
Habitat in serena cruce

non vid.

6 pilulifera *Cotula*. foliis bipinnatis, capitulis globosis, caule erecto L. Suppl. pag. 3078. S. V. pag. 775

Habitat in C. b. spec

Caulis erectus, panicula subtriquata. Folia bijuga Tanacetii. Capitula globosa absque
~~radice~~ floretis quadrifida L. b. c

non vidi

7 fericea Cotula foliis supra decompertis tomentosis lineanibus L. Suppl. 377 + S.V. p. 775.

Habitat in P. b. p. 2

Caulis herbacei, breves, tomentosi, simplicis procumbentes albi. ^{inferior} folia petiolata, supra decomperto
lita, Alpathici, lanceata, tomentosa, alba, fericea. ^{pedunculati} Capitula terminales, solitarii, longissimi, nudi
& lora solitarii, ^{sed majores} P. coronifolia. Calyx hemisphaericus: squamis subaequalibus, apice obtusis, scari
osis. Corolla flosculosa, calyce brevior lutea L. H.

Inferior
pinnata

5. *Tanacetifolia* *Colula* foliis tripinnatis. lacinulis acutis, caule erecto, floribus flosculis corymbo
si L. S. V. p. 775.

Habitat in Cap. b. spec. O

Flosculi feminei virulii; disci quadrifidi l. c.

+ mille folium Camphoratum Curcum monomotapense Plur. ^{amalt} Mant. ~~147~~ 147. Tab. 436. f. 7.

Tanacetum *Jeffersianum* Berg. Cap. p. 242. Off. 1.

non vidi

139 coronopifolia *Chula* foliis lanceolato-linearibus amplexicaulis dentatis, floribus glomeratis
Lin. Herb. Cliff. 417. J. V. Fl. Dan. t. 341.

Bellis annua capite aphylo luteo, coronopifolio caulis procumbentibus Moris
h. 3. p. 30. f. 6. t. 6. fig. ad. Herm. Lugd. B.

Chrysanthemum exoticum minus, capite aphylo, chamomeli nudi facie Boeyn.
Cent. 156. t. 26.

Habitat in Cap. b. spei nunc in Orisio Golfatis inundatis O

Caules plures erecti digitales subangulati, rami terminati pedunculo elonga-
to. Folia basi vaginantia, alterna lanceolata, inferne dentata, glabra.

Pedunculi uniflori Flores globosi. Foliola calycina aequalia oblonga margine scariosa.
Longitudinè ipsius
plantæ

14 umbellata *Odula foliis lanceolatis hirsutis, caule erecto, floribus umbellatis* Lin-Suppl. p. 370. + S-V. p. 774

Habitat in C. b. p. c.

Caules teretes, hirsuti, sesquipedales. Folia alterna, confertiora, angustius lanceolata, proterea argenteo strigosa hirsuta, fere digitalia. Umbella terminalis quinquiflora. Pedunculi uniflori, hirsuti, squamis aliquot alternis subsiliacis. Calyx subimbricatus villosus: squamis intimis disco altioribus, subulatis, interne levibus, coloratis. Corolla absque radio. Disco hemisphaerico, magnitudine unguis. Corollula campanulata, quadripida. Semina depressa, obovata, coronata: margine obsolete, vix trilobo. Receptaculum nudum L. Suppl. E. C.

non vid.

minuta C foliis alteris subamplexicaulis oblongis dentatis, floribus
solitariis sessilibus foliis oppositis Drost. fl. austr. pag 57
Habita

glabra & glabra, calycibus oblongis imbricatis, caule ramoso nudo, foliis dentato-
pinnatis ~~Bot. Ups. 1740 Pl. Dan. Tab 424 S. V. p. 721. Spec. pt. 1140 +~~

~~Heracium minus, Dentis Leonis folio glabro oblongo Bauh. pin. 127.~~

~~Habitat in Dania, Germania, Belgio O~~

~~Folia radicalia lanceolata obtusa pinnate pinnatifida, petiolo glabra vel
petioli sicula apice integra, basi in petiolum planum attenuata.
Laciniae inaequales sub lanceolatae rectae, obtusae, integerrimae. Caulis
erectus aphyllus, superne in caulis floriferis diversus tenes interdum
stratus robustior minus ramosus, glaber. Flores terminalis solitarii in pe-
dunculis propriis. Pedunculi adpressi squamis nonnullis remotis ovatis
acuminatis, glaberrimis, basi membranaceis, superne inivascati. Calyx
sive scorzonero. Squamis lanceolatis imbricatis basi margine submem-
branaceis. Pappus plumosus stipitatus. Semina strata, stris crenulatis
variat caule robustiore, foliis subpetioli, pauciflora, floribus majoribus
semina tunc in semper stipitata inven.~~

glabra - Calycibus oblongis imbricatis glaberrimis, caule ramoso glabro foliis ven-
tato-pinnatis

Cotula cretusa montana abrotanifolia Tournef. Cor herb. Mus
Dedit Hus

affinis *subtruncata* D. D. & Bignonians