

Cousarea

*Squamosa* *Cusfarea* foliis ovato-oblongis cymis squamosis axillaribus,  
calycibus subcylindricis La Mart. T. En. pag. 281.  
Habitat in Cambis &  
Institutiō uterius examinanda

no. 10.

*violacea* foliis ovatis acuminatis, floribus sesquipedibus  
variat floribus 5-fidis 5-andris

violacea *Causanea* Aubl. fl. Guon. pag. 90 tab. 30.

Habitat in sylvis Guianae

Frutex ortopedalis ramosis. Rami oppositi. Folia opposita ampla, ovata acuta  
glabra integerrime petiolata. Stipulae latae, acutae. Flores cymosi  
terminales. Cymis subsylis. Baccae capitulani extra violacea, cuti-  
cutea. Semen coraceum Aub

~~causanea~~ *Genipa speciosa*

rotundifolia Agrostis

Habitat in Anfula Bobonea Comes. herb. Guss. Musci

Rami, uti reliqua partes, glabri, circuncati, superne tetragoni. Folia septem, pollicia  
na et ultra, subrotunda, subovata, integerrima, basi sine nervo subindata, obso-  
lete venosa, subtus pallidiora. Pedunculi axillares, uniflori

Guianensis Eves

<sup>Aubl</sup>

Habitat in Guiana herb. Guaf.

Caulis simplex, alternatim compressus ad interfolia parum dilatatus. Folia petiolata opposita, 3-4 pollicaria, lanceolata-elliptica, attenuata, supra nitida, subtus  
te venosa, integerrima. Stipula subulata, decidua. Pedunculi axillares, solitarii,  
oppositi, semiconvoluti, longitudine petioli. Bractea duo, cordata, ungui-  
cularis.

*Saxifraga* *Cousperea*

Habitat herb. La Martini

Rami, uti reliqua partes glabri, tetragoni. Solla petiolata, in pollicaria, elliptica, acuta, integerrima, supra obscure nervosa, subtus obsolete venosa. Stipulae annulari brevis. Pedunculi axillares, brevissimi, multiflori. Calyx tubulosus dentibus mucronatis.