

Crambe

1. maritima C. foliis caule folisque glabris. radicalibus oblongis sinuatis
dentatis
2. orientalis C. caule glabro, foliis sinuato sublaciniatis dentatis scabris
3. hispanica C. caule folisque scabris. in senonibus pennatis lyriatis
4. fringosa C. frutescens, foliis basi inaequalibus bicaudatis canaliculatis
fringosa
5. frutescens C. frutescens, foliis ovatis pennatis fissis serratis canis, panicula
effusa dichotoma
6. satanica C. foliis radicalibus decompositis multifidis

reniformis Crambe

Crambe reniformis caule inferne scabro; ramis laxis, laxe paniculatis; foliis
pilosius pinnatis, inequaliter dentatis; lobo terminali maximo, reniformi Desfont
fl. Atl. 2. pag 70. tab. 157.

Habitat

herb Desfont.

Caulis herbaceus, teres, mucosus, scaber. Folia petiolata, lyrato-pinnata: pinnae
terminalis maxima subrotundo-cordata, dentata, scabriscula, setis decumbentibus.
Racemi paniculati.

affinis hispanica

orientalis
orientalis

foliis pinnatis, caule glabro Lin. I. V

Rapistrum orientale, acanthi folio Tournef. cor. 14.

Habitat in Oriente.

Caulis erectus ~~fractus~~ ^{per glaber} ~~crassitie~~ ^{stipes} penna anserina, sesqui pedalis.
ramosus, ~~pile~~ ^{stipes} ~~ramosus~~ ^{stipes} pellucidis adpressis, ^{met hamis} ~~supra~~ ^{met hamis} ~~apice~~
in pedunculatis copiosioribus. Folia radicalia penna
ta, pinnis ~~per~~ ^{per} lanceari lanceis pinnatifidis laciniis
lanceari lanceolatis dentato-subpinnatis vel laciniatis
pinnatifidis caulina laciniis inaequaliter laciniis
ta pilosissima floralia indivisa.

Folia magna pinnatis sublaciniatis dentatis

~~pinnatis pinnis pinnatis~~

Caulis angulatus. Folia villosa & ciliata, supra glabra, tenui
venosa, sublyrata, sesqui pedalis, remota inaequaliter
dentata: dentibus majoribus herb. Lus

non vidi ex Botanicis herb. Alderici Desfontaine

pannonica C.

Caulis striatus, adspersus pilis raris, ramifus. Folia radicalia magna,
pinnata: pinnae remotae, alternae, pinnatifido: laciniis lanceatis, distantibus,
dentatis, obtusis, pilis raris adspersi: caulinae pinnatae fide herb. Berol.
an eadem est tartarica

^ε
laciniatum foliis oppositis profundissime trifidis laciniis pinnatis linearibus
pedunculis elongatis umbelliferis. Carum. Desf. 4. 17220 n. 321. 4113
497

Caulis glaber: pinnula integerrime, acuta

Carum Desf. Guss.

martima C. foliis cauleque glabris L. V. fl. Don. T. 316.

Brasilia maritima sylvestris multiflora monosperma Lobel. ii.

245.
Brasilia martima monosperma Bauh. pin. 112.

Habitat ad littora oceanis septentrionalis 4

Caulis ^{remote} folia radicalia petio-
lota sinuata dentata, vix glauca & rasusculus
sem pliciter ^{per} venosa glaberrima per petiolum
parum decurrentia. folia suprema sub pedun-
culis ^{interior} oblonga remote dentata integra utrinque
ciliata bipollicaria, petiolata flores paniculato
racemosa

radicalibus oblongis sinuatis dentatis

folia uterque describenda

Caspica

Cr. foliis villosis, basi fructu loculis omnibus
fertilibus Gmel. N. 4. p. 1024.

Habitat

non vid.

filiformis. P

Angofa \varnothing frutescens, foliis basi inaequalibus truncatis fimbriatis L'Herit.
Journ. n. p. 151. tab. 72.

Meyazum arborescens Gaertn. coll. 1. p. 39.

Habitat in Canariis ζ

Folia petiolata fimbriae albis in venis adpressa supra scabra
nervosa palmata viridia grosse inaequaliter dentata
panicula magna.

affinis nexium fruticosa ad folia non incana et caulis
pilis rigidis copiosis adpressis

caulisque fimbriatis

lenticosa C fruticosa, foliis ovatis pennatifidis serratis canis: racemis in
pannicula effusa dichotoma Lin. Suppl. p. 299. x V. p. 604 x
Myagrum arborescens, filiculis subbiarticulatis, caule arborescenti
Gaëqu. Coll. 1. p. 39

Habitat in rupibus ^{seterminante} Madagascariæ
Index rigidus ramosus. Rami teretes. Rami teretes sub
& canescentes. Folia in ramis, petiolata pollicis
na, ovata profunde inaequaliter dentata interdum
pennatifida s. pennata pinnis geminis parvis
laevibus terminalis maxima pili copiosi parvis
laevibus minus laevibus magna. Rami
terminantur in paniculam magnam diffu-
sam ramulis alternis divaricatis racemosis,
racemis brevibus.

Tatarica C. foliis decompositis multifidis L. V. p. 604. Gayu. Mus. 2. p. 279

Hab. 25

Tatarica ungarica Claph. p. 181.

Habitat

Caulis erectus, striatus, crassitie penna asperius, sesquipedalis ramifolius, pubis vellucidis raris adpressis in pedunculo copiosioribus. Bolea radiata pungens spithmea. Pinna palmata pennatifida latius linearilanceolata, dentato subpinnatis vel subpennatifidis, caulina inaequaliter laciniata vilosuspula, floralia indivisa.