

Prasula

Crusula odoratissima; foliis oppositis, amplexicaulibus, ciliatis, linearibus,  
ciliatis; floribus capitatis, odoratissimi, luteis Andr. repos. t. 26.  
Habitat in Cap. b. spei

cordata

*Crassula* <sup>fruticosa</sup> foliis cordatis petiolatis obtusis supra punctatis, cymis paniculae formibus  
*Crassula* ~~obcordata~~ caule fruticoso, foliis petiolatis cordatis obtusis integerrimis, cymis paniculae formibus Hort. kew. 1. p. 396.

*Crassula* cordata; caule fruticoso, foliis in petiolum angustatis cordatis obtusis integerrimis superne punctatis, cymis paniculae formibus Secand. & Witt.

Habitat in Cap. b. spec. 5

Caulis ~~fusca~~ glauca. Caulis fruticosus, semipedalis, erectus crassitie fere pennae anserinae, erectus, uti folia subtus glauca. Folia opposita semipollicaria, <sup>exteriorum</sup> ~~in pressis~~ punctata. Cymae terminales. Pediculi & pedicelli filiformes. Flores parvi

moschata Craspula caule herbarico prostrato, floribus tetrandris *foff.* in *Com. goth.* 1789  
p. 26.

Habitat in rupibus prociptibus <sup>2</sup> <sup>3</sup> novi anni *Fijulanum*

Caules teretes articulati, palmares, subramosi. Folia opposita, petiolata ellipti-  
ca, carnosa, utrinque convexiuscula, supra punctis elevatis lente videntis  
subtilis *lora*. petioli connati articulos vaginantis. Pedunculi axillares  
solitarii, uniflori, filiformes, brevissimi. Petala alba oblonga... Filamenta  
400 a receptaculo cum petalis alternantia, nec eorum unquam infera  
Nectaria 4. Spathulata purpurea, calycis dimidio breviora inter petala  
et germina. Styli 400 semina 3 vel 400 in singula capsula

spathulata C. foliis petiolatis spatulatis crenatis, panicula decomposita  
Anchistoma Thunb. prodr. fl. Cap. pag. 57.

Habitat in Cap. b. pra.

Caulis repentes. Venter carnosus foliis opposita, unguiculata  
glabra crenata corymbis <sup>rami flexuosi</sup> verticillatis dichotomis sebet pedi-  
cellatis purpurei. petala carceolata

Lucida la manthe in herb. Guss. et Mus.

pro corymbis dichotomis

Septar C. foliis subrotundis venatis pinnatis, caule subaphyllo um  
belligero Kunth. Prod. pag 57

Septar capense L.

Habitat in Cap. b. spe.

Planta digitalis folia <sup>plura</sup> radice unguiculata crispis  
secula, glabra basi ciliis angustata siapi filiformi aphyllis  
Pedunculi 3 um bellati semipollucari. foliola duo barva  
ad basin petala lanceolata

varietas foliis geminis petiolatis in medio siapi pollucari

capensis Septas Lin. Am. acad. Afr. 13 \* <sup>May.</sup> L.V. pag 353

*Doronici* species gemula, auriculo usi folio glabro Pluk. mant. 65. t. 370 fig. 9.

Habitat in cap. b. p. 24

Planta digitalis vel palmaris. Caulis erectus simplicis formis subnudus umbella  
3-5 flora terminatus. Folia <sup>ternunquidularia</sup> parva supra radicem, petiolata, verticillata,  
ovata-subrotunda, inaequaliter crenata, aseni. Petiolus brevis. Pedicelli  
umbella simplex, involucrio minuto 3-5 phyllofoliis linearibus. Pedicelli fili  
formes, pollicares inaequaliter  
alia in foliis geminis in medio scapi, inferne nulli an varietas

Columbari *Craspula* caule pollicari, foliis rotundis imbricatis, fasciculo subterreno termi-  
nati Lin. Suppl. pag. 194. t. V. pag. 306

Habitat in Capit. 8. p. 2

Caulis erectus simplicis spinosus. Folio obtusissima, carnosus, horizontalis. 8' longi in  
capitulo globoso <sup>capite</sup> collecti. Corolla monopetala, tubulosa. limbo quinquefido,  
lineari patente.



*Cephalophora Prasula foliis connatis lineari oblongis obtusis integris capitulis lateralibus pedunculatis* Lin. suppl. p. 190. S.V. p. 307.  
Habitat in Cap. b. ppei

non vid.

Capitella Crassifolia<sup>2</sup> connatis oblongis cartilagineo ciliatis pediculis, capitulis verti-  
cellatis L. Suppl. p. 190. S. V. 307 Thurb. prod. pag. 55

Habitat in Cap. bono spei

tumida Cray foliis connatis quadrifariam imbricatis ovato-oblongis acutis ciliatis lin  
Suppl. p. 109. S.V. p. 307

- Habitat in Cap. bono spei

Centauroides craspula caule dichotomo, foliis sessilibus oblongo-obovatis ovatis cordatis  
planis, pedunculis axillaribus unifloris Hort. Kew. 1. p. 393.

Sedoides africana annua Centauroides Herm. parisi. 169.

Craspula Centauroides caule herbaico centauroide bracteato, foliis cordatis  
sessilibus, pedunculis unifloris Lin. Am. acad. 6. p. 215 n. 8 + Mart  
p. 361. S. V. pag. 305.

Habitat in Ethiopia O

Caulis teretis pilis pubescens, palmarum. folia sessilia, ovata, car-  
nosa, acuta, lucida, supra punctis excavatis, ex axillis flores  
pedunculati, ramis brevioribus a dichotomia differt foliis latioribus,  
floribusque minoribus

foliis cordato-ovatis integris remotis, caule glaucido pubescente  
floribus umbellatis Thunb

non vid.

Verticillari Praspula caule herbaceo, foliis patentibus floribus verticillatis aristatis Mart.  
3 Bl. \* Lin. S. V. pag. 306. Syst. Nat. ed. 12. T. 3. p. 230\*

*Sedum annuum*

Habitat

Caulis ramosissimus; diffusus; opposite ramosus; longitudine digiti, flexuosus, rami alterni. Folia opposita, congesta, oblongo ovata, sessile gibba minutissime papulosa, apice sic utraque patentia. Flores axillares sessiles minutissimi. Calyx longitudine corollae tubulatus. Petala calyce breviora, acumina ut fere aristata, medio rubra. Stamina brevissima, apice rubra, stigmata rubra l.

pulchella *Crassula* caule herbaceo dichotomo, foliis ovato-oblongis carnosis reflexis  
floribus in dichotomiis pedunculatis: pedunculis turbinatis Hort. Kew. 1. p.  
392 \*

Habitat in Cap. bono spei ☉

affinis *C. glomerata*, a qua differt foliis brevioribus reflexis, pedunculis  
turbinatis germen inferum mentientibus, calycibus obtusis; corollis  
calyce fere longioribus Hort. K. l. c.

mibi ignota

Diffusa Crasula foliis oblongis basi attenuatis remote crenatis, pedunculis oppositi  
foliis axillaribusque solitariis Hort. Kew 1. p. 395.  
Habitat in Cap. bona spei

non vidi

notari P. foliis linearibus oblongis, floribus quadrifidis, caule simpliciter  
Humb. prodr. pag. 54  
Habitat in C. S. per

non vidi



acternifolia Craspula foliis serrato dentatis planis alternis, caule simplicissimo, floribus  
pendulis Hort. Cliff. 497. \*. S. V. pag. 306.

Cotyledon, flore lutea, media Herm. Leyd. b. 191.

Craspula foliis oblongis acutis dentatis, flore ex alio solitario flavo Burm. afr. 5. p.

t. 24. fig. 1.

Habitat in Otheopia

Cotyledonis *Casipula* foliis oblongis connatis tomentosis ciliatis, caule subaerhylo,  
floribus paniculatis aggregatis Thunb. Prodr. pag 38 Lin. Suppl. p. 140  
Habitat in cap. b. per.

non vidi.

menema *P. folius petiolati sebotundis integris, pedunculis unifloris*  
Thunb. prodr. pag. 57.  
Habitat in C. l. p. p.

duobus

Frigosa Craspula caule erecto subhirsuto, foliis obovatis frigidis, pedunculis unifloris  
Craspula frigosa caule herbaceo erecto duobus, foliis obovatis frigidis,  
pedunculis unifloris Lin. Am. acad. 6. p. 16. n. 9. & P. V. p. 305

Habitat in Cap. b. sp. 10

Caulis digitalis vel palmatis superne divipes, pilosus prope stem superne  
Folia unguiculata integra, ciliata, lineata, inferora longe petio-  
lata. Pedunculi in dichotomia scilicet, in apice se in dichotomia  
ad apicem ramorum plures excrepente planta remoti. Calyx ses frigidis  
Petala ovata longitudine calycis

Hemisphaeria C. Solum subrotundis ciliatis connatis hemisphaerice im-  
bricatis, caule aphylo thezophloro Thuret prod. pag: 57  
Habitat in cap. v. pini

non vidi

Grassa *Craspula* foliis alternis subpeltatis acutis integerrimis, racemo composito Hook

New. t. p. 395

· Habitat in Cap. bono spei ♂

non vidi

cotyledon C. foliis subrotundis carnosis supra punctatis, can  
le arboresc. Saëgn-mis. anfr. 2. pag. 295. 4. 19

Cotyledonis ~~Presf.~~ foliis connatis oblongis tomentosis ciliatis, caule subnudo, flori-  
bus compactis aggregatis Lin. Suppl. p. 140 S. V. p. 307

Habitat in Cap. b. spec.



Grass. mollis  
humifusa  
lineolata  
obliqua  
alboides

De Kuhn