

Craspula

Craspula herbacea foliis oblongis basi attenuatis floribus umbellatis
↳ hinc pedunculat

Telephium africanum procumbens foliis subrotundis conjugatis
lobatis amplius Ray. herb. 2. p. 363. et

~~Craspula~~ Telephium Pedicularis foliis prostratis Petrus mus Cent. 6. 7.
num 684

pellucida? Craspula

Pentstemon minor luteum folio subrotundo membranaceo transparento cap.
6. f. Plukin. tab. 343. fig. 1.

Presb. 4. usf.

Caules herbacei, glabri, ramosi; rami oppositi. Folia sessilia, opposita, semi
peltata, integerrima, glabra, obtusa. Flores in apice ramorum, 5,
umbellati. Pedunculi unguiculati.
Cum figura Dillenii haud optime quadrat.

micans Craspula

Habitata Madagascari. Commerf. herb. Guaf.

Caules filiformes, herbacei, ^{repentes} procumbentes, diffusi, teneri, pellis eisdem, sub
purpurascens, dichotomi. Folia opposita, subpetiolata, vix unguiculata
succulenta, obovata, crenata, bilabra, micantia. Pedunculi terminales
tres vel quatuor, pollicares, capillares, uniflori, Calycis foliola petala
lis breviora. Petala uti foliola calycis ovata, caecuta

Senella Brasilia.

Habitat in ^{colibus exsiccatis} monte video Commesf. herb. Musf.

Caulis herbaceus, erectus, simplex, filiformis, glaber, longitudine vix digiti,
rubens. Folia opposita, sessilia, linearia, vix semunquiuulana. Pedunculi
axillares, solitarii, capillares, uniflori, foliis duplo longior-

Dichotoma Crasula caule dichotomo foliis ovato-lanceolatis, pedunculis unifloris
Lin. am. Acad. 6. p.

Sedum africanum annuum, centaurei minoris folio, flore auro Herm.

Luc. 88. 570. t. 5534.

Habitat in Cap. 6. p. 6. filiformibus carnosis subrotatis
Caulis spithameus ramis ~~divaricatis~~ ^{totis} glaber foliis ^{perpetuis} amplis
caulis opposita, marginibus submersis cartilagineis. Flores ad apicem
ramulorum ~~umbellati~~ ^{umbellati}. Pedunculi plures capillares: foliola
calycina lanceolata, petala calycis parva longiora lanceo-
lata

Dichotoma Crasula caule dichotomo foliis ^{perpetuis} ovato-oblongis canaliculatis
recurvatis, pedunculis axillaribus unifloris Hort. kew. 1. p. 392.

foliis ^{perpetuis} rotatis ovato-oblongis obtusis, flentibus umbellatis
caule filiformi flacido Thunb. prod. p. 956

an Cras. dichotoma. hort kew. potius ad marginatam Thunb.

ciliata Crassula foliis oppositis ovalibus planiusculis distinctis ciliatis, corymbis terminalibus Lin. S. V. p. 305

Crassula caulefensa, foliis sempervivi cruciatis Dill. Eccl. 116. t. 90. fig. 116.

Habitat in Cap. b. ^{et Cap. foliorum annulatus umbriata}

Cauli basi ramosi folia inferne conferta oblonga obtusa glabra
ciliata, superiora remota basi vaginanta subcuneiformia angu-
ficora. Corymbis terminalis globosus pedunculo brevissimi calycis
lanceolata ciliata.

foliis oblongis connatis ciliatis patulis, caule elongato, composito
subrotundo, pedunculo glabro

retroflexa Crasula foliis connatis oblongis remotis planis, caule simpliciter, cyma subcom-
posita, pedunculis reflexis retrofractis Lin. Suppl. p. 100. L.V. p. 306.

Habitat in Cap. b. p. i. O

Caulis digitatus, teres, glaber. Folia 4 or vel fit in caule, semiconguiculata
glabra flores terminales pedunculis simplicibus vel ~~in~~ numerosis saepe 3 late
interdum 1. folia ad basin pedunculorum plures lineares. Flores fere unguiculati
res calycis foliola oblonga carnosae apice patula. Petala lanceolata
calyci duplo longiora, inferne a medio in unguem angustata

Cras. gentianoides La Martini
Pluk. 415 fig. 6

angulato C. foliis oblongis confertis obtusissimis glabris ciliatis
connatis corymbo terminali dichotomo pinnatis velloso
Habita in cap. b. per
Caulis fruticifera e caesp. foliorum angulatis folia un
guis curculanæ subbracteata

an varietas ciliata

glomerata Crasula caule herbaceo dichotomo scabro foliis lanceolatis, floribus ultimis
fasciculatis Lin. Mant. 60 + S. Lycop. sur in prodr. p. 8. Lin. S. V. p. 305.
Throidei africana annua minima muscosa Herm. parad. 170

Habitat in Cap. b. spei C.
P. vaseo caule glabro

rami fastigiat

Caulis palmari erectus, dichotomus, teres, purpurascens, foliis carnosissimis
sessilibus patentissimis, acutiuscula. Flores e dichotomia solitarii, subpe-
dunculati, solis magnitudine Polycarpi. Flores terminalis ramulorum
conferti in Capitula, ut in Valer. locusta aut Sphloxantho. Calyx 1phyllus
partitus. Petala ovata, alba, calyce triplo minora adeoque minuta

calycibus acutis

tomentosa Cras villosa Jacq., foliis connatis lanceolatis villosis ciliatis,
caule subnudo terminato spica sessilibata Lin. Suppl. p. 190. S. V. p. 307

Habitat in Cap. bono spec

mihi haud satis nota

obvallata Craspula foliis oppositis sublaevicolatis ciliatis approximatis Len. Mant. 61. x. l. v.
p 305

Habitat ad C. bono-petr. t.

Simillima ciliata, et conspiciuntur maxime affines ad flores, cujus petala alba
spathulata, apice aristata globo ut in ciliata, nec unquam est plieanda;
sed differt caule palmani, brevior, patente. Foliis duplo longioribus majoribusque
minime basi contractis, oppositionibus confertissimis, nec spatia remotis, margi-
nibus imprimis recentionum, tenuis sine crenulatis, minime obliquis ut in illa
Len. Mant. l. c.

perfoliata Crasula foliis lanceolato subulatis sessilibus connatis canaliculatis, subtus
convexis Lin. S. V. pag. 304.

Aloe africana caulescens perfoliata glauca et non junosa Com. prol. 74. t. 23.

Crasula altissima perfoliata Dill. Eth. 114. t. 96. fig. 113. Mill. T. 100.

Habitat in Othiopia

foliis ovato-lanceolatis connatis ciliatis remotis caule
erecto paniculato

nunc ignota

Syn: Commel. ad aloem perfoliatam
quoque repetitur

prostrata C. Decumbens pellucida, folis lanceolatis acutis Thunb. prodr

pag 54.

Habitat in Cap. b. pra.

~~non~~ haud mihi satis nota

pubescens R. foliis obovatis mucronatis glabris ramis villosis Thunb
prodr. fl. cap. pag. 52.
Habitat in Cap-b. pr.

novi

municata. Folius trigonis connatis ciliato-silabris; ramus tetragonis, caule fru-
tescente Thunb. prod. pag. 55
Habitat in C. b. prae

non vid.

pinetum ~~foliis ovatis obtusis pinnatis~~ subhis villosis thuriflor.
cap. prodr. p. 52
Habitat in Cap. b. p. 5

non vidi

an eadem ac heterophylla

mollis Crasf. foliis connatis tereti triquetris glabris mollibus, caule simpliciter erecto, corym-
bot nichotomo suprae composito Len Suppl p. 189. S.V. p. 307 Thunb. prod. p. 55
Habitat in Cap. bono spei

ex parte Crasula foliis semicylindricis subulatis supra canaliculatis patentibus
pedunculis axillaribus solitariis unifloris, caulibus dichotomis H. & A. Koen.

1. p. 390.

Habitat in Cap bono pui O.

herb. specimen Dubium

rubens *Crusula* foliis sparsi semicylindricis glabris, floribus solitariis subsessilibus, ramis villosis
Hort. Kew. 1. p. 397
Sedum arvense flore rubente Bauh. Pin. C. Balth. La Chenai in act. helvet. p. 331.

Tab. 11.

Sedum caule herbeto, ramis simplicibus, floribus in alis sessilibus Hall. hist. 965

~~Habitatio helvetia et Italia~~

Pauli

Crusula rubens: foliis sparsi formibus, cyma quadrifida foliosa, floribus sessilibus
ramicibus reflexis Lin. Syst. 6. p. 3067

Habitatio Helvetia & Italia

Crusula digitalis teres, pubescens, decumbens, ramis simplicibus unisquis. Rami asper
ramis villosis + foliis sparsi, sessilibus, ^{glabris} crustata perno gallina, versus apicem
parum attenuata, ibique rubicunda, inferora fere uncialia. Superiora sesqui
braccio. Flores in ramis inter folia, sparsi, remoti, solitarii, brevissime pedunculati.
Calycis foliola carnosae, extus convexae, villo pubescentia, lineam longa
Petala calyce triplo longiora, alba, carinata: carina villosa pubescentia, rubi
cunda. Neetana alba minima. Filamenta petali paulo breviora. Antherae
subrotunda, parvae, rubicunda Hort. Kew.

Planta spontanea caule digitali ramis pallidioribus omnia minorae

Digitalis

Tenella *Oryzula* foliis linearibus pedunculatis axillaribus unifloris caule filiformi simplicissimo

no
Habitat in Bonaria

Planta Tenella facie haec Pelloa et forte ejus generis cum Cappula apparet quadri-
vis vix digitalis glaberrima. Folia obscure connata angusta, parva, remota
acuta. Flores subsessile fructus brevis pedunculatus vix longitudine foliorum

Idem Comersonii ad Caspelas amandari

pruinosa *Craspula* foliis subulatis pruinop-scabris, floribus corymbosis, caule fruticoso Mont. Cors.

v. p. 364

Habitat ad Cap. b. peitz.

Stem pedalis, dichotomis, ramulis teretibus, sanguineis, adpressis, uti tota planta,
pruina crystallina. Folia opposita, linearia, carnos, supra plana, longitudine
internodiorum, obsolete connata. Corymbi terminales inaequales, parvi. Peta-
la alba, lanceolata, patenti l. c. Mont. l. c.

Spicata Prof. foliis connatis linearibus subulatis, scapo subnudo, spica verticillata.
verticillis inferioribus remotis ^{onibus} ceteris. Suppl. p. 109. p. 309.

Habitat in Cap. bono spei

barbata *Cynofula* foliis connatis articulatis barbatis hemisphaericis imbricatis,
caule subrotundo: floribus verticillatis Lin. suppl. p. 100. S. V. p. 306

Habitat in Cap. bonae spei

non vid.

capitata Crasfula foliis connatis deltoidibus obtusis, caule tereto, floribus terminalibus capitatis Lin. Suppl. pag. 100. l. v. 306

Habitat in Q. bono spei.

non vidi

Corallina Cras. foliis connatis deltoidibus obtusis, caule tereto, floribus umbellatis
Lin. Suppl. p. 100. S. V. p. 306

Habitat in Cap. b. spei

Cras. vestita et corallina nuda structura foliorum similes Corallinis Zoo-
phytorum Lin.

Deltoides Crasf. foliis connatis deltoidibus, petalis acutis, caule tereto, floribus
corymbosis den. Suppl. p. 189. L.V. p. 306

Habitat in Q. bona spei

Figura foliorum ut in *Mesembryanthemo* ut in *Deltoides*.

non orde

pinnata Crasula foliis pinnatis caule arbores Lin. Suppl. pag. 791. * l. V. pag. 305

Habitat in China.

Indet. nupersis locis: ramis alternis. Folia pinnata cum impari, alterna
foliola petiolulata, cordata, integerrima, acuta, longa, septena s.
novena. Petioli basi crassiusculi. Panicula ex axillis foliorum, foliis
brevior, rubicunda. Flores rubri.

non vid.

Dicotoma Crusgela

ramosa Crasula foliis subulatis supra planis connatis corbis patentis
fimis, pedunculis elongatis floribus cymosis Hort. kew. p. 390

Crasula ramosa foliis tereti subulatis ciliatis petalis, caule ramoso frute
siccis erecto, panicula composita ^{pub.} - prod. v. pag. 55

Crasula dichotoma foliis connatis tereti subulatis integris remotis, caule
fruticoso erecto ramoso, corymbo composito Lin. Suppl. pag. 100.
L. v. p. 305

Habitat in Cap. b. pretz

non vidi

Dichotoma Pras. foliis connatis Verset. subulatis integris remotis, caule fruticoso
erecto ramoso, corymbo composito Len Suppl. pag. 180. t. V. p. 305

Habitat in Cap. bono spei

nudicaulis *Crasula* foliis subulatis radicalibus, caule nudo Lin S.V. p. 306.

Crasula caespitosa longifolia Willd. Bot. 116. t. 9. f. 115.

Habitat in Othiopia 4

non vid.

flava Craspula foliis planis connatis perfoliatis levibus, floribus corymbose paniculatis Lin.
Mant. bot. p. 304

Radum africanum umbellatum, flore flavescente glabrum Pluk. alm. 340. t. 314. fig. 2.

~~Craspula foliis teretibus, floribus in infimo caule ciliatis Burm. afr. 37. t. 99. fig. 2.~~

Habitat ad Cap. b. p. t.

Caulis erectus l. coccineo, perfoliatus foliis non ciliatis. Flores fasciculati, sessili
li pedicellati. Petalis flavis erectis Lin. M. l. c.

tetragona Prasula foliis subulatis subincurvis, obsolete tetragonis subincurvis patentibus, caule erecto arborescente radicante Linn. S. V. p. 385.

Cotyledonoides africanum Bradl. succ. 5. p. 10 & 10. fig. 41.

Prasula tetragona. foliis subulatis obsolete tetragonis Linn. Spec. pl. pag. 404 +

Habitat in Cap. 16. spec. 7

Caulis teris tripedalis. Folia crassitie penna asperna, fere semper Centro asica

sa. Pedunculus terminalis nudi teris. Cyma trifida, ramis septima
septigata. Corolla alba antennis purpureis Linn.

fruticulosa Craspela foliis oppositis subulatis acutis patentibus, subrecurvatis, caule fruticoso
mant. 61. * l. V. pag. 122.

~~B~~ Craspela caffer caule suffruticoso, foliis oppositis subulatis recurvatis lin. mant. 222

*
Habitat ad Cap. b. p. p. f.

Caulis fruticosus pedalis, subdurus, laxis, crassitie digiti. Folia sessilia, carnosae, teretia
utroque convexa, supra tamen majora, patentissima, laxis, mucronata, subrecurva
Pedunculi terminales, solitarii, filiferi, foliis multo longiores, pari uno altero
foliorum, subumbellati. Bracteis oppositis minutis. Flores parvi albi, campanu-
latis. Calyx 5 partitus, ovatus, erectus, corolla dimidio brevior. Petala 5 alba,
oblongo-ovata, sessilia, concava, acuta. Antherae sanguineae s. fuscae. Pistilla
alba. Germena scabra

orbiculari Crasula farmentis prolifera determinate foliis, foliis patentissimis subimbricatis
(L.) ciliatis caule subnudo

Crasula orbicularis repens; foliis sempervivi Lill. Bot. 119. t. 100 fig. 110.
Habitat in Cap. b. p. c.

Folia plerumque radicea subcuneiformia glabra (sax. cotyledoni) pollicaria
margini ciliis tenuissimis. Caulis ^{sub}caespitosus vel pedunculatus, pithu-
mosus; pedunculi parvales oppositi foliolum lineare obtusum ad basin
singuli, rami ramulose flores in capitulis glomerati, parvi

foliis subcuneiformibus ciliatis patentissimis, caule subcaespitose
thyrsifloro

an hinc pertinet Cotyledon sed ut apud saxatilis foliis sedi vulgaris in usum
exposuit vere compositis Moench. hort. lugd. 2. pag. 287. no. 24 herb. Mus.
Ved. et. Mus.

Cymosa Craspela foliis linearibus cartilagineo-dentulatis connatis vaginantibus cyma ter
minali

Craspela cymosa. foliis linearibus cartilagineo-ciliatis connatis vaginantibus, caule fruticeo
fo, cyma terminali Vesz. Pap. 24. Mart 222.

Habitat in P. b. pui 4

Caules spithamei, erecti, glabri, inferne ramofi vane flexuofi. Folia polli
ciana, densi numerofi parvi, glabra, ad apices ramorum. Cyma termi
nali parva. flores parvi

decumbens C. decumbens foliis subulatis Thunb. prodr. pag. 34
Habitat in Cap. b. pra

michi ignot

moschata Crasula foliis linearibus canaliculatis, pedunculis axillaribus unifloris, caule simpliciter
fimo erecto

Habitat ad fretum magellanicum.

Caulis in ferne radicans, palmatis, filiformes. Fol. glaberrimi uti tota planta
Folia subelliptica parva, basi obscure connata, obtusiuscula in florosa
remota, superiora confertiora. Pedunculi superne in caule alterni longitudi-
ne foliorum. ramenti capillaribus 1-2. in axillis folio duplo longioribus

planta Compositi gaudet floribus albis

H. de Tosten ad Crasulas refero

10/1

subulata Crasula: foliis linearibus carnosiss oblongis, caeruleo- ciliatis, spicis capitatis
et terminalibus

Crasula subulata Lin. Mant. pag. 361.

Habitat in Cap. b. p. nei

Caulis rectus vagini foliorum truncatis ciliatis. spicis suboppressis
involucrata.

Caulis alternatim ramosus rami tetragoni ^{angulis} ~~con~~ sub angulis. Solia un-
guicularia

Crasula subulata: foliis subulatis teretibus patentibus, caule herbaceo
Lin. P. V. pag. 305

Sedum africanum umbellatum album Herm. Lugd. 550. & 552.

Spica capensis comosa flore albo Pet. gar. 89. fig. 8.

Folius teret. subulatis recurvatis ciliatis, caule ramoso ramis tetragonis, flori-
bus capitatis

Sub hoc nomine plantam ex horto Uppalensi habeo, minus bene cum descr.
Q. subulata in mant. congruens optime vero cum hinc hermanni

Caulis palmatis fol. glaber. Solia ^{unguicularia} ~~resplia~~ glabra margine integro
nei ciliata acuta mucronata. Ped. unculus terminalis filifor-
mi se qui pollicari trichotomus pedunculis in flori pedicellatis
planta videtur distincta vaginis nulla

an Syn. herm potius ad fruticulosu-

Cineolata Crasula caule herbaceo, foliis cordatis sessilibus, pedunculis subterminalibus
axillaribus approximatis umbelliformibus Hort. Kew. 1. p. 391.
Habitat in Cap. bonae spei ♂.

non vidi.

Dentata C. foliis cordatis Dentatis Theob. prod. r. pag. 57.
Habitat in C. b. ppri

non ordi

Cordata Craspula foliis petiolatis cordatis, floribus solitariis Thunb. prod. pag.

57. Lin. Suppl. p. 189

Habitat. in cap. b. pra. 5

Cordata C. foliis petiolatis cordatis, obtusis integerrimis, cymis paniculae formibus

Forst. henn. 1. p. 396

non vidi

marginalis Pras fula caule fruticoso, foliis ¹⁰ cordatis ² perfoliatis ³ acuminatis ⁴ planis
tentibus intra marginem punctatis Hort. New. l. p. 396.
Habitat in Cap bono p. 5

marginata C. foliis ovatis margine membranaceo serratis pedunc
culis unisporis

non videt