

Cratogeomys

1. *gynandrus* Q. folioli ovatis acutis, floribus gynandrus, petalis lanceolatis
germine globoso
2. *Tapia* Q. folioli ovatis acuminatis, petalis ovatis obtusis, germine
globoso
3. *obovata* Q. folioli petalisque obovatis, germine oblongo.
4. *retuzosa* Q. folioli petalisque lanceolato ellipticis utraque
acutis, germine oblongo
5. *marmelos* Q. spinosa, foliis serratis (huc non pertinet).

Cratogeomys?

Habitat in Madagascaria herb. Masf.

Rami teretes, glabri, ciliati. Folia ternata: foliola petiolata, sesqui-pollicaris, oblongo-ovata, parum acuminata, subvenosa, glaberrima. Petioli longi sed non foliolo sim.
Peduncululi terminaliter quatuor, unguiculares, crassi, glabri. Pedicellus fructus pollicaris. Germe oblongum. Stamina receptaculo inserta.

Gynandra Cratava inermis, foliis ovatis integerrimis, floribus gynandris
Lin. Spec. pl. pag 636 & Sw. bot. pag 417
Arbor americana triphylla, numerosis staminibus purpureis apiculatis
proditis, flori umbellatum occurratibus Plin. Hist. 147
fig. 6.
Habitat in Jamaica &
diffusa Tapia petalis lanceolatis, pedunculo geminis
staminifero

Folus

petalis

lanceolatis

Rami & axes inaequales scabri, punctati, juniores herbacei, glaberrimi.
Folia petiolata alterna, profertim versus apices ramorum.
Petioli foliis longiores. Foliolela petiolata, ovata, acuta, integerrima
nervosa, venosa, glaberrima, tenuia saturate viridia.
Racemus terminalis, erectus strictus multiflorus. Flores
numerosi, majusculi purpurascens. pedunculi ebracteati.
Calyx cyathiformis, tetragonus. Foliolela 4. margine infera
ovata acuta. Petala 2. varice 4. ovata lanceolata, angustiuscula
filamentis 20-24. germen puberulum. Descentendum peritellum

5 marmelos *C. spinosa*, foliis serratis Pl. rayl 212. L. V

Cydonia excelsa Baob. jun 435.

Coralium Rhod. mal. 3. p. 3. 7. 157.

Belaos Rumph. amb. 1. p. 197. t. 81.

Cucurbitifera trifolia spinosa medica, fructu pulpa *Cydonii* omula

Plukin. alm. 125. t. 170. fig. 3.

Habitat in India & herb Herm.

Rami teretes, rigidi, glabri. Spino pollicares, rigida, apice nudaes-
ramuli vel folia ad latera spumant, saepe duo vel tres utraque. Ramuli
si fusis. Folia petiolata, glabra crenata, obtusa, terminali pollicaria
paucum attenuata. Lateralibus paucum minoribus. Racemus terminalis
ramorum, 7-9 flori. Pedicelli sparsi.

una hujus generis nec folia serrata videtur esse illa a Dr. Traut.

23 religiosa Cratogeomys foliis petalisque lanceolato ellipticis utrinque acutis.
Nierovala Rhed. Mal. 3. p. 49. Tab. 42

Cratogeomys religiosa, foliis subequalibus Forst. prodr. no 203. plant. escul.
pag 45.

Habitat in India orientali et societatis Insula.

Rami teretes; superne cortice olivaceo, junctis albidis adpressi.

Folia petiolata, sparsa, ad apices ramulorum ternata: foliola superiora
et altero lateri ramum angustiora
moa, lateralia parum minor, petiolata, attenuata, indurata
inferiora, tenera, nervosa.

Pedunculi ad apices ramulorum, alterni, tri pollicares, uni floriferi
ter

Calyx quadripartitus: laciniis linearilanceolatis, anguiculanibus
Petala sesqui pollicaria: unquibus petalis quadruplo brevioribus.

Stamenta longitudine petalorum

Germen oblongum.

Cratova

Tapia Cratova foliolis ovatis acuminatis, petalis ovato-subrotundis obtusis, germinibus globosis

Cratova Tapia: enervis, foliolis integerrimis, lateralibus basi antica breviori

huic Lin. Spici: pl.: pag. 637. ex clauso. Rheed. Mal.

Rami teretes, codice cinereo.

Folia ad apices ramorum origina, petiolata, alterna, ternata: foliola
petiolata, bipollicaria, subequalia, ovata, acuminata, glabra, integerrima,
nervosa: lateralia altero latere angustiora, basi obliqua.

Radunculi ad apices ramorum, plures, uni fiori, bipollicares.

Calycis laciniis breves, ovate.

Petala ovato-subrotunda, unguiculata: ungues longitudine laminae.

Filamenta petalis duplo longiora.

23

obovata Pratoza folioli petalisque obovatis, germine oblongo

Habitat in Madagascaria
Folia petiolata, ternata: ^{petiolata,} foliola sesquipolliciana, ^{caudicibus parum minor,} mucronata, glabra,
subtus venosa.

Pedunculi in apice congesti, bipollicares uniflori

Calyx quatuorpartitus: laciniis oblongis, mucronatis

Petala unguiculata, basi attenuata.

Filamenta 7 ad 9, bipolliciana, petalis triplo longiora

Stylus filamentis longior.

(An modo varietas C. tapia? in cassis, differet figura ^{lorum} foliorum & petalorum, folioli basi subaequalibus, petalis longis unguiculatis, calycis laciniis oblongis, filamentis longioribus, germine oblongo. Coeternum habitus reliquorum