

Prepis

endiviofolia Crepis foliis lanceolatis, radicalibus petiolatis, caulinis semiam-
plexicaulis basi dentatis, calycibus exterioribus in solvendi ^{membris} ^{membris}
naeis longitudine calycis

Hieracium creticum, endiviofolio Tournef. Cor. 35.

~~Habitat in Creta. Ex herbario Tournefortii~~

Hieracioides cretica, perennis, endivio folio Vaill. in Act. par. 1721.
n. 2.

Habitat in Creta. Ex herbario Tournefortii

Caulis crassitie fere pennis cygnis, ~~pubescente~~ angulatus; scaber,
superne ramosus; villosus: Rami alterni, subfastigiati. Folia
radicalia in petiolum attenuata, epithymosa, remota denticula-
ta, raris villosa: ramea remota: suprema margine membranacea.
Peduncululi versus apices ramorum, uti pedicelli villosi: pedicelli uni-
flori. Calyx exterior foliolis oblongis, membranaceis, circiter 8, et
glabris, dorso ferrugineis: interior villosus; foliolis lanceolatis. Pappus
stipitatus; simplex. Semina longitudinaliter striata

endiviofolia Crepis foliis lanceolatis radicalibus petiolatis, caulinis semiam-
plexicaulis basi dentatis, calycibus exterioribus in solvendi membris

ramosissima Centaurea

Centaurea orientalis calicis pro foliis flore minimo Tournef. Cord.

Habitat in oriente herb. Mus.

Caulis herboceus, erectus, rigidus, ramosissimus: rami angulati, scabri, subaercentes. Folia caulina bipollicaria, pennata, canescentia, penna pennatifida, laciniis terminalibus oblongis; ramea linearia vix semipollicaria, inferiora basi utrinque laciniis. Flores ex apice ramulorum, solitarii. Calyx oblongus, parvus. Spina medio, basi ciliata.

chondrilloides Crepis foliis radicalibus multinatis, cauliniis pinnatifidis;
laciniis inferne dentatis, calycibus tomentosis.

Chondrilloides perennis lutea Boerh. Lugdb. 1. p. 84.

Patria ignota. Ex herbario Vaillantii

Caulis herbaceus, erectus, ramosus, pubescens, superne canescens.

Folia radicalia petiolata, pedalia: laciniis ovato-lanceolatis, den-
te uno alterove notato, ope lentis margine villosa: caulina sessi-
lia, state glabra: suprema linearia. Flores copiosi, panicula-
ti, Crep. testonum. Calyx incano-tomentosus. Pappus sessilis, pi-
losus.

Centaurea

Centaurea orientalis centaureoides - fere purpureo odoratissimo Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Turc.

Caulis herbaceus; erectus; angulatus, simplex, ^{crassitie pennis cygne purpurea villosus} subvellosus. Folia ^{infractanea} inferiora petiolata, superiora sessilia, pithamida, villosula, pennatifida: ^{Plumae} ~~pinna~~ lanceolata, attenuata, integerrima, ^{intermedia} alterna, avenia, enervata, praeter costa, nulliaria, terminalis major, interioribus oblonga, ^{subtomentosa} obsolete remote dentata. Pedunculi ^{intermedia} superne, alterna; folio unico vel altero remoto, linearilanceolata, apice ulcato, uniflora. Calycis squama ^{cont. 8 foliis} ovata, ^{subtomentosa} villosa, exterior apice nigricante, ciliata, pinnula nigra breviterminata, interiores lanceolatae apice squamae membranacea, ciliata

nodosa

Crepis foliis fasciculatis linearibus pinnatifidis, caule calycibus in
sanis, caule fruticoso.

Habitat in Madera Rothae. 5

Caulis vit crassitie penno columbino, ramosus, glaber. Folia plurima
tuberculo tomentoso insidentia, pollicaria, ⁱⁿ ramulis ^{et superiore} ~~solitaria~~, ~~tertia~~ ~~et~~

ramulorum
et superiora raris

bimè solitaria

plerumque duo ad

sex

~~mularum et superiora rarissime solitaria~~ ~~suprema integerrima~~
Pedunculi laterales uniflori, terminales divisi: pedicelli squa-
mis minutis, aridis adspersi. Calyx exterior foliolis brevibus, ~~tricusis~~,
senosis subulatis calyculatus: interior foliolis linearibus pulverulentis
tomentosis. Pappus sessilis, ope lentis dentibus ulatus

parviflora Crepus foliis sagittato-lanceolatis amplexi caulibus basi
dentatis, utrinque villosis

Patria ignota. Ex herbario Desfontainii

Caulis herbaceus, paniculatus, sulcatus, angulatus, glaber. Folia
bi 3. Tripolli. ana, integerrima, excepto basi, attenuata, acuta,
suprema sub petioli subulata. Calyx tripli minor quam
in *C. pulchra*, subanescens: foliola linear lanceolata, dorso
sete duo vel tres patula. Semina longitudinaliter striata.

~~cuneifolia Cavata foliis sesquibus lineatis integerrimis, pedunculis axillaribus
terminalibusque trifloris~~

~~Habitat in India orientali herb. Guoj.~~

~~Caulis herbaceus, erectus, ramosis, striatus, vix pedalis. Folia infima subrotata,
reliqua sesquialtera, pollicaria vel parum ultra, glabra, crispis siculis, mi-
nuta. Pedunculi ex apice axillis, elongati, terni: pedicelli terni, uniflo-
ri. Bractea subulata ad basin. Calyx atrophyllus, semi-pollicaris, glaber, multi-
florus. Pappus simplex. Stili longi, bifidi.~~

pulverulenta Crepis foliis dentatis subpinnatifidisque glabris, calycibus pulve-
rulento subcanescentibus

Habitat in Oriente. Ex herbo Peltii

Caulis erectus, sesquipedalis, superne in ramos duos vel tres floriferos
divisus, teres, striatus, glaber. ~~folia radicalia sessilia, peti-~~
^{lata lanceolata attenuata, 4}

acuta

in petiolum attenuata, tri- vel quadri-pollicaria dentato-^{inferior}sinuata
vel dentato-subpinnatifida: caulicula sessilia, dentato-sinuata
vel extrosum dentato-subpinnatifida, introsum dentato-sinu-
ata, ^{semiamplexi-}suprema basi dentato-sinuata, extrosum integerrima.

semiamplexi
caulis

Pedunculi elongati, uniflori, superne squama una vel altera
adpressi, apice, ^{sub}pauci calyces pulverulento-canescens.

Calycis foliola exteriora linearia, ^{sub}inequalia, exterioris inaequalia
Corolla C. barbata parum major, flava. Pappus striatulus.
Semia longitudinaliter striata.

acanthifolia Presl

Thalictrum peregrinum acanthifolium

Habitat herb. Gusf.

Caulis erectus, foliatus, angulatus, glaber, superne in ramos floriferos divisis.

Folia radicalia petiolata, pedalia uncinato-pinnatifida: lacinae laciniolatae, margine villosa, dentato sinuata vel integerrima, acuta: extrema magna dentato sinuata; caulina sessilia, inferiora subbipinnatifida sp. thamesia.

Calyx calyculatus: foliola villosa, incana. Pappus videtur sessilis.

Specimen dubium.

vergata Crepis Desfont

Desfont.

Hieracium proaltum caule apophyllo Triumphetti Syllab. Bot. Razi hist. 3. 145 no. 100 et
146 no. 92.

Hieracium chondrilla^{is} ~~is~~ facie lanata folio glaucis dentato Hort. Cath. 95
Habitat in Italia.

Caulis erectus, vergatus, sulcatus, glaber. Folia radicalia lanceolata, pedalia, attenuata,
basi dentato-sinuata, villosa; subramis linearia. Pedunculi laterales, cuius alterum

Mathula to. Crpis

Habitat herb. La Manhu

Caulis ramosus, pedalis, inferne pilosiusculus. Solia radice alia cuneata, pin-
natisida, in petiolum attenuata: pinnae lineares vel oblongae, integerrimae vel
dente uno alterove, inferne sensim minores: caulinae sesquialtae lanceolatae
pinnatisida, suprema basi dentato-incisa omnia raris pilosa. Calyces
glabri lutes

^{omnibus}
brenni C. foliis uncinato-pinnatifidis pabris: basi superne dentatis, calycibus uncinatis

Gen. Spec. pl. pag. 1136 & L. V. pag. 714

Hieracium maximum, Chondillo folio, asperum. Bauh. prod. 64. p. 127
Morf. hist. 3. & 4. p. 46.

Hieracium, Emico folio, hirsutum Bauh. hist. 2. p. 1025.

~~Habitat in Europa praevalens~~

Hall. n. 30.

15. *Hieracium majus erectum latifolium* caule aspero Bauh. p. n.
Hieracium alis cithorium caulem hirsutum Bauh. hist. 2. p. 1024.

taraxacifolium
Theobaldus
o brenni differ
herb. Thonon

Hall. n. 31.

Habitat in Europa

Caule erecto, sulcato angulato; herbis pabris simplex superne
divisus. Folia radicalia, herba ^{in tendum glabrata} ^{caulis et pabris}
laciniis linearibus dentato basi saepe lacinulatis termi
natis canaliculato-hastata. Pedunculis albis saepe
catendum versus apicem subumbellatis; elongati uni 2. 3. 4. flori
subtomentosi pilisque nigri adpressi. Soleola calycina lacinis
herba nigra antea margine albo subtomentosi uncinatis
folia superiora basi lacinulata

varietatem hujus dedit Dr. La Chenal ^{ut Hal. n. 30.} caule pene nudo foliis radice
libus petiolatis nec ad basin usque foliosus ut in altero, laciniis oblongis
dentato-angulatis. Et floribus paniculato corymbosis caule lanisulis
So foliis fere glabris, foliis sub pedunculis infimis etiam diversis
figuris in Bauh. hist. ad var. β . haud bene congruunt

calyx # calyculatus-filiatus mucronatus longitudinaliter acri
leis mollibus Lin

Secundum Herb. Tuspani hinc pertinet

Hic minimum orientale albispermum folio Cichorii sylvestris, odore Castorei
flores magno Tournef. Cor. 34.

Caulis erectus ramosus, sulcatus, angulatus, pilosus. Folia infima pedalia,
Cichorii, lyrato renicinato: lacinae integrae, vel dente uno alterove, lacinae
interdum lanceolatae, terminalis oblonga dentata, angulata. Caulium superiorum
pinnatifido, terminalis lacinae reliquis major, omnia pilis raris adpressa.
Calyces magni, vallesi, uniani. Pappus simplex, stipitatus.

sepicaria Crepis involucri scarisps longitudine calycis, floribus conjungatis, bracteis ovatis
L. J. V. pag. 714

Thesaurum montanum rapifolium Bauh. prod 749 Pin. 120. Bauh. h. 237. Monj.

Crepis sepicaria:
involucri ovatis
concurvis obtusis
patentibus h. spec.
p. 1132 *

h. 3. p. 65. t. 24. f. 19.

Cichorium sylvestre sepicarium pratense. Col. Ephr. 1. p. 230. V. 237.

Cichorium pratense hirsutum sepicarium Bauh. Pin. 126.

Habitat in Helvetia in Apulia

Planta a Radice crassa. Folia lyrata, angulata, dentata, scabra. Caulis
brevis. Rami longi, nudi, bifidi s. trifidi, uniflori, pedunculorum.
Bracteis ovatis, solitariis, concavis, integris, pallidis. Flores lutei. Calycis
singuli cuncti involucri longitudine calycis, ex foliolis s. f. 6. patentibus
ovatis, obtusis, concavis membranaceis, pallidis. Planta β . Folia a
priori manifeste differt, flores vero conjungunt utrumque. L. p. 113. l.

Folia plerumque radicalia, bipollicaria, cuneata, villosa, scabra, dentata. Caulis
sulcatus, angulatus, scaber. Folia per se nulla in caule, nisi parva sub
ramis lanceolata. Pappus septatus villosus. Semina sonata

Folia radicalia lyrata. Laciniis dentatis, glabris, lora, folium unum
cum in caule amplexu caule dentato sinuatum lanceolatum flores
minoris an priori diversa? videtur.

bursifolia Crepis foliis pennatifidis crenatis, capsulo nudo paucifloro L.S.V. 719
Hieracium minus panormitanum, cichorei folio Cup. hort. Path. 95. suppl. 3.
Hieracium ficulum, bursa pastoris folio Boiss. musc. 2. p. 147. t. 106. et. 112. Rari suppl.
142.
Habitat in Sicilia &
Caules plures digitales. folia radicalia, pollicana Leob. Mus

hemisphaerica Chondrilla foliis ^{recurvis pinnatis} ~~pinnatis~~ laciniis lineariibus, caly-
cis basi tomentosis

Chondrilla hemisphaerica P

Poth

Habitat.

Caulis erectus striatus glaber ramosus. folia caulina
retrofoliata ~~pinnatis~~ laciniis lineariibus obtusis saepe
inferne versus latere exteriori lacinula aucta. Flores
paniculati Calycis incanum

Subspinosa Denti solus lanceolati acuti dentati; Subspinosa dentati: Denti spinosi, 6. v. 6. orbiculati acuti, Dentato spinosi Cavan. For. vol 3. pag. 5. Tab. 209
Habitat in Hispania 5

Coronopifolia Crepis glaberrima, foliis pennatifidis: foliulis linearibus
caule erecto paniculato, pedunculis filiformibus, calycibus fornicatis
Desfont. in Act. f. h. n. P. 1. pag. 30. Tab. 9.
Habitat in Canariis

rugata Crespi glabra, caule superne nudo, pedunculis lateralibus paucis,
centrali longioribus, foliis dentatis petiolatis, inferioribus lato-canaliculatis.
t. s. Desfont. in Act. f. h. n. par. 1. pag. 37. Tab. 8.
Habitat Panet. & alyino C

albida C. foliis reniformiter dentatis subincanis, pedunculis nudis unifloris, fycamis
calycinis margine albicantibus Hort. kew. 3. p. 127.

Crepis albida All. fl. ped.

Habitat in Gallia, Italia 4

albida Crepis

Crepis albida Gaeyn. coll. t. pag. 81.

Habitat 2

Tota inflorescentia pilis brevissimis albidis capitata, ^{parum} Caules sesquipedales ramif.
Venter striati, asperiusculi. Folia radicalia plura, longe spatulata
obtusula, denticulata vel magis incisiva. Caulina subamplexicaulea acut
ovata, vel oblonga denticulata. Rami in pedunculo longior aphylos-
desinenter. Calyces ovati, squamis marginatis breviter ciliatis
Corolla supra flava subter sulphurea Pappi pilosissimi scissili Gaeyn.

pulehrab. foliis sagittatis denticulatis, caule paniculato, floribus pyramidatis glabris
Linn. Spec. pl. pag. 1134 + L. V. p. 700

Heracleum montanum ~~his futum minus~~ pulchrum Bauh. hist. 2. p. 1025

Heracleoides annua glutinosa, floribus parvis Vahl. act. 1721

B. *Heracleum montanum alterum* ~~Septocaulon~~ alicuius caulon Col. Ephr. 1 p. 240.

+ 249

Heracleum annuum montanum, caule canaliculato Mon. hist. 3. p. 68. f. 7.

Tab. 5. fig. 37

Habitat in Gallia, Italia

neglecta P. foliis amplexicaulebus multinatis dentatis subpilosis, caule paniculato,
calycibus inermi subpilosiss Lin. Mant. 107 * S. V. p. 720.
Habitat in Italia O

filiformis P. foliis linearibus filiformibus integerrimis glabris, proppis sessilibus Hort. Kew

3. 11. 128.

Habitat in Madaga

Succulentia C. foliis pinnatifidis dentatisve subcarneis lobatis, calycibus subtomentosis
pappo festivo. Hort. kew. 3. p. 120
Habitat in Madera C

alpina Q. involvens ^{solitaria,} planis longitudine calycis, floribus corymbosis, bracteis ovatis

Lin. L. V. pag 719

Hieracium alpinum se orzonera folii Tournef. inft. 472.

Leontodon calyce toto erecto: inferiore squamis fissis, foliis amplexicaulibus

Gmel. hb. 2. p. 16. t. 5.

Habitat in alpebus Italiae Q.

aspera Crepis foliis dentatis: inferioribus ovatis ~~dentatis~~ auriculatis, superioribus
sagittatis, caule setis rigidis sparsis L. Spec. pl. p. 1132. * S. V. p. 719
Hieracioides sicula, cucurbi folio, flore parvo flavescente Vaill. act.

714.
Habitat in Oriente, Palestina, Sicilia

Caulis nudus, ramosus, apertus: setis subulatis rigidis, sparsis, patentibus. Flores
fere cymosi pedicellis rigidis, subsimplicibus, alternis, excepto ultimo. Calyx
parvus, ovatus, tonlophus, hispides: exterior brevior foliolis ovatis, membrana
eius deciduis L. Spec. l. c.

nuba Q. foliis uncinatis amplexicaulis lyrato-uncinatis Spec. pl. p. 1133. J. V. p. 819

Chondrilla purpurascens foetida Bauh. prod. t. 68. v. 68. Pin. 130

Acerasium dentis leonis foliis, flore fuscis rubente Bauh. pin. 127. Morf

h. 3. v. 4. p. 3.

Habitat in Apulia ☉

Veronica Q. foliis lanceolato-mucronatis sessilibus lobatis, inferioribus dentatis lan.
S. v. p. 119 Pl. Dan. tab. 501. Spec. pl. pag. 1135. x

Veronica 2. Tabern. hist. 491.

Veronica chondillo foliis hirsutum Bauh. pin. 127.

Veronica chondillo foliis, glabro Bauh. pin. 127

Cuscuta proserpice lutea Bauh. pin. 126

Habitat in Europa arida, siccis O

Dentato

ngeni C. foliis oblongis duplicato serratis flosis, caule nudo ramofo, floribus panicu-
latis, calycibus cylindricis glabris, pappo festi Hort. Kew. 3. p. 127.

Habitat in Aroci 4

Folium pet in petiolum attenuata supra rigida, margine grosse
dentato serrata serraturis dentibus dentatis denticulis serris
vixim apice seta rigida terminatis. supra glabra subus setis
rigidis adpersa scabra petiolum ciliatum planum medio
canaliculatum ~~caulis~~ pedunculi in alio preeminere hispida
Robur folio lanceolato sesqui pollicare dentato-nisum
flores corymbosi foliolo subulato ad basin pedicellorum
tomento tenui ad apicem pedicellorum et basin calycis
state evanescent

~~pygmaea~~ ~~pumila~~ ~~floribus subumbellatis~~
+ ~~pygmaea~~ ~~pumila~~ ~~floribus subumbellatis~~ foliis ovatis integris villosis petiolatis, caule prostrato len. S. V. pag.
Heracium alpinum inaequalum, saxatile parv. bracteol. foliis integris 130
mus. 2. p. 33. t. 24

Leontodon dentatum: foliis ovatis, petiolis dentatis, capite nudo unifloro len. Mart
pag. 107 *

+ Heracium pumilum capite subumbellato, foliis ovatis petiolis dilatatis
denticulatis len. Mart. 279 * S. V. pag. 716

Heracium prunellofolium caule ramoso multifloro, foliis ovatis tomen
tosis, pedunculis unifloris Gouan. fillyst. pag. 57. tab. 22. fig. 3 +
all. fl. Pedemont. n. 2784 tab. 19. fig. 2 *

Habitat in alpebus Italiae, Helvetiae

Sibinica C. foliis amplexicaulibus oblongis rugosis inferne dentatis, caule hirsuto, caly-
cibus carina ciliatis Lin. Spec. pl. p. 1135. t. V. 719

Hieracium caule ramoso, foliis inferioribus petiolatis, reliquis ex ovo-
to lanceolatis: omnibus serratis, petiolorum inferius dentatis Gmel.

Tab. 2. p. 26. t. 10
Arenis foliis ovatis ^{is alatis} dentatis, petiolatis amplexicaulibus dentatis Hort

2397
Habitat in Sibinia alpina 7

virens. P. foliis mucronatis glabris amplexicaulis; calycibus subtomentosis hinc.

Spec. pl. p. 1134. x P. V. p. 119

Acerasium minus glabrum, foliis eleganter virentibus Bauh. pinod. 63. pin.

127.

Habitat in Helvetia, Italia agris

Diopsideis C. foliis radicalibus nuncinatis; caulinis hastatis, calycibus subtomentosis

Lin. Spec. pl. pag. 1133 et S. V. p. 720

Heracium s. Tabern. hist. 491.

Heracium majus erectum angustifolium, caule lavi Bauh. pin. 127.

Habitat in gallia &