

Crescentia

1. *Cyathus* C. foliis cuneato-lanceolatis confertis
2. *Cucurbitina* C. foliis ovatis subcordatis distinctis, fructibus ovatis acuminatis

Cucurbita *foliis cuneato-lanceolatis* Lin. V. Jacq. bot. 1. 111.

Cucurbita *foliis oblongis et angustis, magnifruita ovato* Plum. gen. 23
n. 109.

Arbor americana cucurbitifera, foliis longe mucronato fructu oblongo
Comm. bot. 1. p. 137. T. 71

13. *Cucurbita* *angustifolia, fructu minor globoso aut ovato* Plum. gen. 23

14. *Cucurbita* *minima fructu duro* Plum. gen. 23.

Habitat in Virginia, permauribus, Brasiliae apricis.

Arbor vixenti pedalis rami subhorizontalis. Folia plura ex eodem
tuberculo, basi adnata, brevisime petiolata, acuta, integra
reticulata venosa, eodem viridia, s. polliciana. Pediculi uniflori
solitarii in ramis senonibus passim, saepe ex ipso truncis ad truncum
superiorem pollicum altitudinem nascentis. Flos magnus
rubendum viridis, saepe e purpureo rubro flavoque variegatus
nuda respuer non manifestans, odore cadaverinis, non manifestans.
Jacq.

conferti acuminati

Cucurbitina P foliis lanceolato-ovatis len Mant. 250 P.V. 565

Cucurbita latifolia, fructu pedamine fragili Plum. Gen. 23. t. 109

Cucurbiti fera arbor, subrotundis foliis conferti, fructu ovali Pluk. alm. 124. t. 171. fig. 2.

Habitat in America calidior

Experientia cucurbitae d. len. Spec. pag. 272

Rami subdivisi erecti striati angulati. Loci. Folia petiolata opposita alterna, sparsa majora, lato ovata, cum acumine brevi, integerrima nervosa, subcoriacea, glaberrima, supra nitida, inferne pallidiora. petioli breves, crassi glabri. Pedunculis 2-5 terminatis, foliis brevioribus pediculis longioribus unifloris. Corolla mutantis magnitudinis procedentis sed magis fufus Lw. ubi descriptio uberior fructi scilicet habitus

oblongo

sub ovato subcoriacei distincti, fructibus ovatis

acuminatis Lw. obs. p. 234

non vidi.

mea. vix Lin:

Rami tomentosi. Folia cuneata emarginata trinervia
coriacea. sed absque flore Deoque ignoro unde quis
petit ches

pinnata Prosciantia

Prosciantia pinnata Gaertn. Coll. 3. pag. 203. Tab. 10.

Habitat in Mozambique &

arbor vasta. Folia alterno pinnata cum impari pedale
Foliola utroque eq. oblonga obtusa cum acumine, rose serrata
undulata coracea rigida, subtus venosa, glabra tactu rudiuscula
superiore mollia, brevissime petiolata basi interne paulo breviora
inferiore opposita, summa fere semipedalia inferiora decrescen-
tia. Perianth. subbilabratum squisidum laciniis ovatis. Corolla am-
plexima intus saturata rubra. Stamina sive stum brevissimum
filamenta basi hispida. Germen basi glandulosum sive. Stigma bi-
lacellatum. Bala magnitudine capiti Gaertn.

non vid.