

Prithmum

1. mantinum P. foliis carnosis lanceolatis mucronatis
2. pyrenaicum P. foliis lateralibus trifidis  
foliis pennatis
3. latifolium P. foliis cuneiformibus sessis

*Centium*

*Apium gracium fastidiale* *Chithmiifolia* Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. mus.

Paulis craspiis penna cygnea, striata, villosa, canescens. Folia bipinnata, crassa, penna opposita, lineares, sesqui pollicares, integro, bifida sive trifida. ~~Folia~~ infero ra glabra, superiora minus composita, villosa. Umbella terminalis multi radiata, villosa, incana. Involucrum monophyllum? involuella polyphylla, longitudine umbellula. Flofculi fertiles. Semina oblonga  
an *Castore*



mantimum & foliolis lanceolatis carnosis Lin. L. V.  
2. 4. 1772.

mant. 353. Haëqu hort.

Toniculum marinum f. empetrum f. cali. fragu Rob. ic. 392.

Ornithum, Toniculum ornithium minus Bauh. pin. 200.

Habitat ad Oceanum Europaei littora <sup>subdespina</sup>

Tota glauca. Caulis pedales, teretes striati glabri sim-  
plicissimi folia petiolata remota <sup>inter</sup>ternata  
medio sepe pentaphyllo linearia <sup>attenuata</sup> mucronata supra  
planiuscula <sup>vagina</sup> subtus <sup>operti</sup> convexa crispata nervo colum-  
bino. Umbellae laterales et terminales - involucra  
5-7 phylla.

Catifolium *Orithimum* foliis pinnatis: foliolis sessilibus obovatis, lobatis: lobis dentatis  
Lin. suppl. p. 180\* L.V. p. 280.

Habitat in maritimis Teneriffa et Salvages

Planta sesquipedalis, glaberrima. Caulis teres, sulcatus, erectus: Folia petiolata  
pinnata: foliolis oppositis, bi- ad trijugis, sessilibus, margine exteriori decur-  
rentibus, sensim dilatatis, lobatis et dentatis. Petioli basi dilatati, amplexi  
caules. Involucrum foliolis b. f. d., lanceolatis. Involucella figura et  
numero foliolorum involucri. Flores lutei. Semina glabra, sulcata, margine  
elevato lavi. Lin. l. c.

Catifolium *C.* foliolis careiformibus sessi Hort. kew. 1. p. 342



pyrenaicum Crithmum foliolis lateralibus bis trifidis. Len. I. V. p. 280

Apium pyrenaicum thapsia facie Tournef. J. R. H. 305

Habitat in Pyrenis

Athamantam Libanotem senescentem esse putat Haller. ut: et in Ca. Marti

Folia bipinnata pedalis. Soliola opposita subsessili  
basi ambiculata. pinnis oppositis sessilibus pinnatis ped  
glatro linearibus acuta laciniis alternis. Umbello radii  
copiosi. involucrio subulato margine membranacea  
involucella umbellula longiore

bipinnates foliolis cunctis

whet. Basii plantam descriptam sub nom. Chanthi pyre  
naici habes cuius fide <sup>descripta</sup> sed <sup>est</sup> sub hoc nomine descripta