

Procus⁷

94. Procus. Cor. 6-partita, aequalis. Stigmata convoluta

pativus 1 Procus ~~Stigmata~~ exserto tripartito: segmentis linearibus
Smith. Fl. angl. 39.

Procus ~~Bursif.~~ Buchs. hist. 441.

Procus ~~autumnalis~~ Procus Math. 62. 63. Procus ~~autumnalis~~ Procus Best. hort. exot. autumn. ord. 3. t. 5. p. 3.

English. bot. t. 343.

Procus ~~pativus~~ autumnalis; foliis angustioribus margine
revolutis Lin. syst. veg. 84.

Habitat in Oriente &

Folia Spithamea et ultra, linearia, margine parum revolu-
ta, puberulis medio albida, una cum ~~flora~~ ^{bari} flora membranis
caudis inclusa, staminibus radice essentia absque stigma. ^{staminibus} stami-
na corolla brevis. Stylus longitudine corollae, profunde
trifidus; Stigmata inter lacinas corollae exserta
et Taurina misit Dr Haquet Procum bulbo conico, ^{reticulato} flora
quaduplo minore, cruxi coloris: lacinis tribus extus fusis
dorso fusis; Stigmata et in pativo, forte vix specie di-
versis.

Schoenus Inceps, Culmo triquetris folioso, pedunculis axillaribus terminalibusque,
capitulis globosis subterranei: intermediis sessili:

1. holoschanoides, #
act. sci. par. sed.
hol. La Mant

Habitat in America meridionali von Rohr.

Schoenus

Culmi erecti, striati, ad vaginas articulati.

holoschanoides:

Colica inferiori elongata, superiora culmo breviora, carinata, glabra,
capitulis compositis
globosis, subnatis: Vagina bipollicares, remota, striata,
marginis vix decora.

capitulis compositis
globosis, subnatis:

glabra.

unossesili uno sessili
Pedunculi a vagina foliorum;

semi compressi: inferiores: solitarii
terminales, ter min. Capitula tria, raro quatuor, globosa,
gemini vel

ti; coequis peduncu
latis act. sci. hist. nat
Paris. P. 1. pag. 106:

riso duplo majora, intermedium sessile, reliqua pedunculata.
Pedicelli patentissimi, pollicares vel minores. Involucra se-
tacea capitulo duplo breviora.

Spicula copiosa, sessiles, lanceolata. gluma lanceolata, carinata,
ferruginea, nitida.

genus distinctum

ferruginea, nitida.

Richardo ei Trifarium

Lequis mucronatus La Mant
Emig. alt. hist.

♂ Stamina 3. stipite com muni
insidentia. ♀ germina satis tribus.
candum, filamenta 3 castrata loco
♀. Stamina. Stigma 1. stigma sui vel bifidum Richan

Lat. P. 5

Vernus 2 Procus Stigmate incluso trifido: lobis unceiformibus incisus Smith
fl. angl. 40

Procus Rube 2-121.

Procus vernus Plin. hist. 203 Besl. bot. syst. aest. ord. 3. t. 10. f. 3.

Jacqu. austr. app. 47 t. 36. # Eng Smith. engl. bot. t. 334.

Andis mag.
t. 45

Procus sativus vernalis foliis latioribus. margine petalo lin

Syst. veg. 114

Habitat in alpidibus Helveticis Pyrenaeis, Lusitanicis, Thracicis,
Carniolicis &

Folia latiora minusque revoluta quam in precedente, procer-
pue vero differt stigmate incluso, erecto, minus profunde
trifido, pallido, inodoro; laciniis cuneatis margine involutis,
apice inaequaliter incisus et erosus Smith l. c.

Varia colore florum *

Cephalotes l. Culmo Inquieto nudo capitulo ovato pycnanop, involucrio triphyllis

Longo

Jaegeri bot. 1. 2. 97.

~~Schenus cephalotes culmo foliosus Inquieto; involucrio tetraphyllo, deflexo
capitulo oblongo terminali Rottb. Gram. 61. tab. 20.~~

Habitat in India

quoniam inter Schenos

nudiflorus 3 Crocus Stigmate incluso trifido, lobis multifido laciniatis
penicilli formibus, flore aphylo Smith. fl. angl. 41.

Crocum pyrenaeum autumnale Clus. cur. post. 23. et app. alt.

Crocus nudiflorus Smith. engl. bot. t. 491.

Crocus multifidus; flore aphylo, Stigmatibus capillares
multifidis Ramond in diar. Soc. philom. Tom. vol. 2. n. 41. p.
129. t. 0.

Habitat in Pyrenaeis et

4

Flores omnino aphylli, purpureo-violacei. Stigma saturate
fulvum. Folia erectiora, pallidiora, vix revoluta, nec apice
emarcida Smith. l. c.

Locus

Specimen mecum a Dr. Ramond communicatum gaudet et involuta
tubo fere pedali, limbo majore quam in inferne vaginae
tribus tecto, limbo majore quam in reliquis.

forte quod huc spectat Crocus speciosus; spatha radicali
uniflora, foliis tardis pimis, staminibus Stigmate tripartito
ramoso brevioribus Marsch. in Diar. Schrad. t. vol. 1. p. 455.

Satureia Croci L. V

officinalis a. *Crocus sativus* Bauh. pin. 65. Cordi hist.

Crocus: Best. autumn *Crocus autumnalis sativus* Motif. hist. 2. p. 33 5. f. 4.
autum ord. 3. + 5. 8. 3. tab. 2. fig. 1. Cordi hist. p. f. 163.

vernus β . *Crocus vernus latifolius* Bauh. pin. t. XI. 21. VI. Bauh

Crocus Best. aesta γ pen. 65. 66. *Crocus* Cate n. 121. Tupper nat. 441
vernus ord. 3. + 10 9 7

Habitat in alpebus Helveticis, Pyrenaeis, Lusitanicis Tracis
Liburni &

Spatha radicali univalvi

Folia linearia angusta flore altiora plura angusta
in vaginis membranaceis involuta. Caecium ^{ovello} oblongo

β . folia parva latera breviora

Stachys. *Rosa bulbosa*. Est in ipso radice gessidi fore abque ulla pum
culo. *Solanum lanceum*: vaginac membranaceae simul cum flore involuente
revelata