

Crotalaria

** foliis ternatis

hab. C. Mar. (Cot. folia varietas ramis sulphureo villosis, folioli triplo majoribus
cuneiformis la. Martii foliis simplicibus obovatis. Copenhi

longioribus) 22 Oct. Thunberg
117 Da

Guianensis Rhombilobum pro distinctum Rich

lineato vel fusc. Syst. per volacius Aubl.
est Crotalaria del Guianae e Guiana.

Phorolobos La Mart

Hyacinthe per es humilis Guianensis Legumina de per me

Gramineus
Gentifolia

Crotalaria ~~glabra~~ glaber foliis simplicibus ^{sesquifolius, lineari lanceolatis sessilibus} ~~lineari lanceolatis~~; Pedunculis lateralibus
unifloris

Habitat in Andia ~~et~~ Vionia

Totus glaber Radix lignosa teretes laxes filiformes erecti

Folia sessilia, linearia lanceolata, angusta erecta, sesquipollicaria
Altipula nulla

Pedunculus ~~est~~ oppositifolius ~~in~~ vel terminalis, patens, solitarius
uniflorus, folio duplo brevior

Bractea una pubulata in versus apicem pedunculi

Legumen oblongum pollicare

21-22 microphylla Crotalaria foliis ternatis oblongis, pedunculis laterali bus bifloris, caule
fili formi decumbente.

Habitat in Antiochia. In herbario Dioscoridi inveni absque ullo nomine nec
in Descript. ulla planta commemoratur cui referri potest.

Caulis lignosus, decumbens, fili formis, teres, ramosus, glaber, pedalis.

Folia petiolata, remota, ternata: foliola oblonga, subsessilia, glabra, crassius
cula, bilinearia; lateralia minor, sub mucronata.

Petiolus longitudine foliorum.

Stipula setacea, patulo, petiolo duplo brevioris.

Pedunculi ~~ternati~~ ^{perimphali}, sed cum ramus excrescit laterales fiunt, oppositi foliis,
biflori: floribus pedicellatis.

Bractea teres, subulata ad divisuram pedunculi.

Caecina Calycis pelosuscula, lanceolata

Corolla flava, calyce duplo longior.

Legumen oblongum, glabrum, pedicellatum; pedicello brevissimo

Protalaria pubera, foliis ternatis, foliolis oblongis obtusis subtus leguminibusque
racemosis ^{villosis} ~~pubescentibus~~.

Habitat ad St. Matham von Rohr.

Rami lignosi, teretes, filiformes, ope lentis subvillosi.

Folia petiolata, ternata: foliola brevissime petiolata, subobovata,
basi acuta, avenia, enervia, pallide viridia, mucronata, supra
glabra, subtus villis adpressis frequentibus, ^{sublinearibus} unguiculata: la-
teralia parva minora.

Petioles universales semi pollicares, teretes.

Stipula subulata, minuta, decidua

Racemi axillares et terminales, foliis longiores. Flores parvi
remoti, ope lentis extus villosi. Bractea minuta, setacea

Calycis lobis lanceolatis

Legumina oblonga, pendula, vix unguiculata.

Thombei folius
pubescens.

Femina serrulata
Cuscus pubescens folius Ternatis intermedio rhombeo ovato late
vulgaris femina ovata
Habitat in insula Ternatati s. Roko Ne S.
Rami angulati villosi uti petioli pedunculi et Cerni
Folia latera tria sessilia bipollicaria Ternatati et triosum
latera basi sessilia ut inter medium petiolatum tripollicare
ovatum utrinque acutum. omnia venosa pubescentia acuta
serrulata, ut venosa Ternatati femina nervosa

Crotalaria

Crotalaria latifolia, foliis ternatis: foliolis cuneiformibus emarginatis, subtus villosis.
Subsessilibus, pedunculis axillaribus subsolitariis unifloris

Crotalaria trifolia fruticosa, foliis glabris flore & luteo viridi mi
nora Stoan. hist. 2. pag. 33. tab. 176. fig. 1. 2.

Crotalaria latifolia, flore parvo variegato Dill. Eth. 121. tab. 102.
fig. 121.

Crotalaria latifolia: foliis ternatis obovatis, floribus lateralibus
subracemosis Lin. Syst. Veget. pag. 650.

Est insula St. Crucis misit Pflug et von Rohr &

Fruet. Rami & parti, teretes, inferne glabri, superne & villis minutis
si adpressis flavescentibus subsessilibus.

Folia petiolata, ternata: foliola subsessilia, unguiculata,
lateralis parum ^{minora} supra glabra, subtus & villis flavescentibus adpressis subsessilibus,
avenia, enervi

Petioles foliis parum longiores.

Stipulae utrinque minuta, lineari, demum evanescentes

Pedunculi axillares, petiolo quadruplo vel triplo breviores, filiformes,
mer, uniflori. Flores nuntantes.

Calyx laciniis lanceolatis, attenuatis, orculo armato villosis.

Corolla unguicularis.

Legumina juncea villosa cinerea.

(Nomen Triviale a Dillenio absque dubio mutuavit Linnæus ideoque non
latifolia sed latifolia dicenda. Quod Caulis fruticosus est et peduncul
li uniflori, ex Tribus Speciminibus optime conservatis Didi.

Spinescens P foliolis cuneatis minutis ramulis pedunculatisque pinnatifidis, floribus
racemosis caule fruticoso

Habitat in cap. b. sprei de Dahl &

Rami glabri usculi, uti pedunculati in pinnam deferentes ramuli an-
gustati ^{angustati} ~~angustati~~ ^{angustati} ~~angustati~~
folia petiolata, ternata, crassiuscula minut, ferite v. p. peti. rarisimè ad
m. ^{metr.} ~~metr.~~ ^{metr.} ~~metr.~~
Racemi laterales multiflori. Flores parvi

pernula Costalana foliis obovatis emarginatis subcarnosi, pedun-
culis oppositis foliis, Leguminibus subflexilibus. Ortega Des
pag 23.

Habitat in Insula Cuba ☉

Folia ternata. Stipula subulata. Pedunculi racemosis. Flori
Corolla lutea. Legumen pubescens subflexile

non vidi

heterophylla *Crotalaria* foliis simplicibus ternatisque emarginatis, racemis terminali

3
Senecio ^{oblongo ~~parto~~ ^{obovatis} ^{parto} ^{subtus} ^{senecio}}

Crotalaria foliis ternatis oblongis, ^{retruncatis} floribus lateralibus bifloris, caule fruticoso
erecto.

Habitat Amer. Barbae 7

Caulis fruticosus villosus; teres erectus, ramulis ^{senecio}
Folia petiolata ternata. foliola ^{oblonga} ~~oblonga~~ ^{oblonga} breviter petiolata, basi paucum
~~angustata~~ supra glabra subtus ^{senecio}
Petiolum longitudine folii. Anthera ^{senecio}
Pedunculis lateralibus bifloris brevissimis, bractea lanicolata
Calycis campanulati ^{fruticoso villosis}
~~adest folia dissecta, caule folisque ^{subtus}~~

Lunani *Protalaria foliis ternatis ovatis acutis, stipulis semicordatis*
Lunati Spei. pl. p. 1005. t. v. 650.

Protalaria foliis ternatis: folioli septibus, petioli stipula dupli-
acutis. Hort. Cliff. 357.

Habitat in Africa

Pauli fruticosus, filiformis, ramis, 9 labe, teres, tenuis: Rami aqueo albo
virescenti. folia petiolata, ternata: foliola 3, ovata oblonga, basi acuta,
obtusissima, unguicularia vel minor, glabra, arenia. Petioli longior
vix foliorum. Stipula semiovata, acuta, ab tero latere convexior alte
vix lunata, vix seminguiculari. Pedunculi axillares, solitarii, folio
longior, capillares, cinerei, uniflori, versus calycem bractea parva
ovata. Calycis lacinae sulcata herb. Roxb.

~~glaberrima~~
C. foliis alternatis oblongis utraque acutis stipulis & lobis
Caburnifolia stipulis nullis, racemo elongato
Habitat in India orientali Burmif.
Pauis herbaceus erectus superne ramosis & teres glaber
Folius petiolata ternata. foliola polliciana petiolata mucro
nata tenera arena tenuissime nervosa. Pedunculus
semipedalis flores femoti majari. bractea subulata ad
basin. Legumen Calyx glaber pedunculus legumini
lesquipolliciani legumen polliciare teres glabrum styli
curvato sesquipolliciani ternatum.

nella Tardale Cott. Rhed Mal 9. pag 47. tab 27.

Protalana apatica frutescens trifolia floribus luteis amplis
Herm. Legob. 146. t. 197.

Protalana Caburnifolia foliis ternatis ovatis acuminatis
stipulis nullis leguminibus pedicellatis Lin. Fl. Zeyl.
pag. 270. t. 1. v. pag. 650

hoc contentit una figuram Rhedii quod Caburnifolia.

ad basin. Calyx villosulus lacinis duobus superioribus tubulatis.

floribunda C foliis ternatis, cuneiformibus; ramis pubescentibus leu-
minibus pedicellatis glabris rugosis compressis cavinatis Hort. kew.

3. p. 14.

Habitat ad Cap. b. p. 5

mibi ignota

incana ^{herbacea} Protalaria villosa herb. foliis ternatis ovalibus, racemis terminalibus
Legumibus hispitis.

□ Protalaria trifolia fruticosa, foliis rotundis incanis, floribus spicatis et
viridiluteis, fructu pubescente Sloan ^{herb.} Jamaica. 2. p. 34. tab. 179. fig. 1.

Protalaria foliis incana foliis ternatis ovatis acuminatis, stipulis
setaceis, leguminibus hispitis S. V. p. 650. Sp. pl. p. 1005. Martia p. 440

Protalaria foliis ternatis, petiolo nudis Hort. Cliff. 350

Habitat in Jamaica, Barbis, Aps. O.

Caulis herbaceus, villosus, striatus, teres

Folia petiolata, ternata. Foliola ovalia brevissime petiolata, supra glabra
subtus pubescentia, pollicaria lateralia minorum

Petioli villosi foliis ^{trijugis} duplo longior. Stipula setacea decidua

Racemus terminalis erectus. Pedicelli breves, bracteae setaceae

Calycis villosi foliolis lanceatis

Floribus flavis

Anoni americanae foliis labori subrotundo Tournef. Fr. h. herb. Mus
habitat quoque in Perou Sec. herb. Quil.

□ Denotat Synon: in ipso autore confus. verisim.

La maritima non differt

Habitat in Madagascar

Caulis purpurascens uti petioli stipulae etc. e pilis flavis hirsutus. Petiolum
sesquipedalicum vel minus foliola petiolata apice subtransversis, obtusa
sa emarginata, semipedalicum. Stipulae ut unguiculatae. Racemi bi
p. 3 pedalicum. Flores mediores. Legumina teretia, bipedalicum hirs
Hus/.

iniana Protallana foliis ternatis ovatis acuminatis, stipulis setaceis, floribus racemosis
leguminibus hirsutis

violacea. P. foliis obcordatis glabris, racemis terminalibus; caule fruticulosos

Habitat in C. b. p. 5

Rami teretes glabri.

Folia petiolata unguiculata; subtus oribus armatis peli raris

Petiolus ^{li. liformis}
longitudine folio
comum

Stipulae nulla

Floris violaceo purpurei

alopeuroidea ^{tomentosa} Protalaia foliis ternatis ^{cordatis} ~~obovatis~~ ^{argenteo} ~~sericeis~~ ^{sericeis} spicis terminalibus
elongatis imbricatis

Habitat ad Cap. b. p. i. ~~Thunberg~~

Caulis tomentosus mollis pinus; Vires prostrati perno anferno erectus;
Folia petiolata, ternata. Foliola obcordata tomentoso-sericea, sessilia
semipollicaria

Petiolus longitudine foliorum. Stipula nulla.

Racemus terminalis erectus elongatus, ciliatissimus 4-5 pollicaris totus
Lethus floribus subsessilibus. Bractea fetacea ~~subflora~~ ^{subflora} hirsuta subflora

~~Calycis~~ Calyx hirsutus

Stylus filarius

Legumen ~~germen~~ brevis hirsutum; semina solita vel tria glabra

medicaginea
sphaerocarpa

*Protalaria foliis ternatis obcordatis, racemis lateralibus; leguminibus
globosis, caule filiformi glabro.*

Habitat in India Orientali Ca. Mark. 7

Trichiopteris Rami. Vertices filiformes glabri laces, ex parte ope lentis
folia ^{foliis minutis} petiolata, ternata. Coliola obcordata, sessilis, glabra parva
bilinearia.

Petiolus folio brevior. Anthera minutissima setacea

Racemus oppositifolius, pollicaris, versus apicem floribus quatuor
vel quinque parvis

Pedunculis brevis ^{capillaris} glabris

Legumen globosum ^{monosperum} mucosum, stylo filiformi germine longior
posturatur

Prot. medicaginea

pellida C. foliis ternatis lanceolatis glabris, racemis terminalibus
pinniformibus: Hort. Kew. 3. p. 20
Habitat in Africa C.

non vid.

elongata
3537

C. foliolis linear lanceolatis subtus villosis, caecis lateralibus elongatis paucifloris, caulibus suffruticosis

Habitat in P. b. p. p. p.

Caulis basi ^{remotus} ramosus; tenues per perascent ^{er} rami minuti depressi ramis ^{remotus} ~~caecis~~

~~foliolis~~
Folia petiolata alterna, ternata. foliola subsessilia, inferiora minora subtriangularia formis, superiora longiora, subpollicaria lateralibus minoribus, basi acuta obtuse cuspidata.

Stipulae minores ~~ovatae~~ subulatae

Pedunculis lateralibus ^{sub}hamosis superne floris tribus vel ^{quatuor}

saevius remotis. Bracteis foliaceis
Pappo flavo striato

Cyrtoides *Crotalaria* *frut.* foliis ternatis linearibus, mucronatis, ^{oblongis} ~~oblongis~~ ^{stipulis lanceolatis mucronatis} ~~stipulis lanceolatis mucronatis~~
caulis ^{stipulis lanceolatis mucronatis} ~~stipulis lanceolatis mucronatis~~
Habitat in India ^{bonis} ~~bonis~~ ^{angulatis, interne}
Indicofus, Rami pubescentes teretes

Folia longa, petiola ^{ter} erecto patentia, ternata. Folia la linearia, sessiliteria
obtusissima supra glabra, subtus pallidiora costa marginibus subpelosa.
Sesqui pollicaria, lateraliter breviora. juniora villosa, ^{sericea}

Petiolis folio longior. Stipula lanceolata, mucronata, uagueticularis
Racemus terminalis flores ^{approximati} ~~approximati~~ ^{conferti}
pedicellorum mucronatus. Pedicelli breves Bractea subulata ad basin
Calyx villosus laciniis lanceolatis

Alcam ex *Honigio* habui huius in omnibus simillimum, debet solummodo
foliis oblongis quadruplo triplo latioribus deoque ~~et~~ ~~varietas~~ ~~trunc~~
varietatem huius credo

guanensis. C. folioli oblongis lanceolatis; leguminibus qua
Draculambus Aubl. fl. Guian. p. 761 tab. 305.
Habitat in Guiana

non vidi

quinquefolia Protoborari foliis quinatis L. S. V. pag. 656 Sp. 1006.

Welligia Sandale-cotti Rheed. Mal. 9. p. 51. T. 28.

Habitat in Andia

Caulis herbaceus ^{erectus} ramosus, glaber ^{scabellus} falcatus

Folia petiolata, patentia quinata. ^{scabellus} ~~lobata~~ ^{lobata} canaliculata glabra
apice rotundata, emarginata lateralibus minoribus.

Stipula subulata

Bractea terminalis pauciflora 8. 10 floris. Flores magni bractea
canaliculata ad basin pedicellorum et bino setaceo in medio. Pedicelli

filiiformes unguiculares

Calyx glaber campanulatus

Protalaria alcomum
auctonim

obovata foliis simplicibus obovatis acutiusculis basi attenuatis, subtus
sericeis, stipulis latis lanceolatis an pubescentibus nostris
Ind. Orient.

floribunda foliis ternatis cuneiformibus, ramis pubescentibus, legu-
minibus pedicellatis glabris nigosis, compressis carnatis

Cap. b. p. p.

axillaris foliis ternatis ovatis ellipticis subtus pilosis, stipulis pubulatis
minutis, pedunculis axillaribus geminis unifloris

Africa equinoctiali

pallida foliis ternatis lanceolatis glabris, racemis terminalibus spici-
formibus
abyssinica t

Protalaria sericea foliis simplicibus lanceolatis ovalibus subsessili-
bus tomentosis, floribus spicatis terminalibus Burm. fl. ind. 158
tab. 40. fig. 1. *

Protalaria genitofolia et plura sermynia, Tanachide Malabarum
Plukn. mant. 50. Raii h. 3. p. 464. habitat in India

Mant
p.

Stipulae gaudent omnes in aliis ^{vani} magis vel minus deciduis, ab his excipi species proci-
flores semper cernui plenique flavis, foliis omnibus simplicibus vel ternatis